



М. А. ЛЕВЧЕНКО

ВРАЧЕБНЫЕ
ПРОПИСИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ

W

М. А. ЛЕВЧЕНКО
доктор медицинских наук

615.1

Л-38

ВРАЧЕБНЫЕ
ПРОПИСИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МЕДГИЗ — 1961 — МОСКВА

узн

АННОТАЦИЯ

Издание рассчитано на широкий круг врачей различных специальностей. В книге — справочнике приведены прописи лекарственных веществ, применяемых в СССР, с кратким указанием их терапевтического действия. Внесены также прописи, составленные клиницистами 1-го Московского Ордена Ленина Медицинского института им. И. М. Сеченова, и прописи сывороток и вакцин.

Левченко Мария Абрамовна

Врачебные прописи лекарственных средств

Редактор *Б. Н. Антонов*

Техн. редактор *Н. К. Зуева*

Корректор *Л. С. Верещагина*

Переплет художника *Л. С. Эрмана*

Сдано в набор 1/II 1961 г. Подписано к печати 22/VI 1961 г. Формат бумаги 84×108^{1/32} = 8,75 печ. л. (условных 14,35 л.) 10,70 уч.-изд. л. Тираж 30 000 экз.
Т06650 МН-79

Медгиз, Москва, Петровка, 12
Заказ 61. 1-я типография Медгиза, Москва, Ногатинское шоссе, д. 1
Цена 74 коп.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга «Врачебные прописи лекарственных средств» является пособием для врачей.

В книгу внесены рецептурные прописи средств выдающихся советских ученых, известных клиницистов, практически проверивших действие лекарственных средств в условиях клиник I Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова, а также прописи рецептов как важнейших и новых, так и менее часто употребляемых, но используемых современной медициной лекарственных препаратов, с кратким указанием на их врачебное применение.

Наряду с этим составлены и введены прописи ряда импортных препаратов, поступающих в нашу аптечную сеть.

В тексте ядовитые лекарственные средства согласно VIII Государственной фармакопее СССР обозначены буквой А, а сильнодействующие — буквой Б. Препараты, которые не входят в эти группы, обозначений не имеют. Для лекарственных средств, дозы которых установлены VIII изданием Государственной фармакопеи, сначала указаны высшие разовые дозы, а в скобках — высшие суточные для взрослых. Для всех остальных препаратов указаны средние лечебные дозы. В рецептах даны средние лечебные дозы для взрослых.

Учитывая пожелания врачей, нами приводятся в настоящем пособии, главным образом по материалам VIII Государственной фармакопеи, наиболее часто употребляемые сыворотки и вакцины в виде рецептурных прописей на латинском языке.

Одновременно представлена таблица разовых доз ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для детей, таблица содержания витаминов в некоторых пищевых продуктах и краткий терапевтический указатель.

Доктор медицинских наук
М. А. Левченко

I. ПРОПИСИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВЛИЯЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

I. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ И НЕИНГАЛЯЦИОННЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Aether pro narcosi. Эфир для наркоза (Б).

Выпускается во флаконах оранжевого стекла по 100,0
(легко воспламеняющаяся летучая жидкость).

Rp. Aetheris pro narcosi 100,0

D. t. d. N. 10

S. Для ингаляционного наркоза

Эфир противопоказан при катарах верхних дыхательных путей,
туберкулезе легких.

Spiritus aethereus. Эфир со спиртом. Капли эфирные
(1 ч. эфира и 2 ч. спирта).

Rp. Spiritus aetherei 30,0

DS. По 20 капель на рюмку воды

Применяют при болях в животе, кардиальгиях.

Rp. Aetheris 100,0

DS. Смоченным ватным тампоном протереть кожу локтевого сгиба — место прокола кожи для внутривенного введения растворов

Применяют как дезинфицирующее и притупляющее кратковременно болевую чувствительность.

Chloroformium pro narcosi. Хлороформ для наркоза (Б).

Выпускается во флаконах оранжевого стекла по 50,0.

Rp. Chloroformii pro narcosi 50,0

D. t. d. N. 10

S. Для ингаляционного наркоза (хлороформ значительно ядовитее, чем эфир)

- Употребляется как противоядие, при отравлениях стрихнином и другими ядами; в виде ингаляции как противосудорожное.

При передозировке эфира или хлороформа вводят под кожу кофеин, камфару, стрихнин, адреналин в вену, производят искусственное дыхание, согревание тела.

Rp. Chloroformii 10,0

DS. Ввести на вате в кариозную полость зуба

Применяют при зубной боли.

Rp. Chloroformii 2,0

T-rae Valerianae 20,0

MDS. По 20—30 капель на прием

Применяют при рвоте, сердечной слабости.

Rp. Chloroformii

Ol. Hyoscyami $\bar{a}\bar{a}$ 40,0

M. f. linimentum

DS. Для втирания (при ревматизме, невралгии)

Aethylum chloratum (Chloroethylum). Хлорэтил (Б).

Rp. Aethylii chlorati 30,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Для кратковременного наркоза и для местного обезболивания

Hexenatum (s. Evipan-natrium). Гексенал (Б) 1,0 в вену.

Rp. Hexenali 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Содержимое ампулы растворить в 10 мл дважды дистиллированной, свежестерилизованной воды или в стерильном изотоническом растворе хлорида натрия

Вводят внутривенно (для основного наркоза и как противосудорожное средство; готовить раствор ex tempore).

При однократном введении в указанной дозе наркоз длится приблизительно 20 минут.

Противопоказания: шок, резко выраженные болезни сердца, печени, тяжелая форма тиреотоксикоза, тяжелый туберкулез легких.

Thiopentalum. Тиопентал-натрий (Б) 0,5—1,0.

Rp. Thiopentali 1,0 (0,5)
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Для внутривенного наркоза, в 5% растворе

Способ приготовления раствора, показания и противопоказания см. Гексенал.

Intranarconum. Интранаркон (Б).

Выпускается в ампулах емкостью по 10 мл с содержанием 0,1 сухого препарата.

Растворы готовят в асептических условиях всегда непосредственно перед применением.

Rp. Intranarconi 0,1
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Для кратковременного наркоза. Содержимое ампулы растворить в 10 мл дважды дистиллированной воды

Ввести в вену медленно в течение 2—3 минут (из расчета 10—12 мг сухого препарата на 1 кг веса тела). В случае необходимости вводят дополнительно дробными дозами.

Назначают для кратковременного наркоза, начиная с 8—10 лет и выше без дальнейшего предела.

При однократной дозе наркоз длится 10—20 минут.

Противопоказания см. Гексенал.

Magnesium sulfuricum. Магний сернокислый, сульфат магния.

Rp. Sol. Magnesii sulfurici 25% 10,0 (20,0)
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 5—10—20 мл в мышцы

Применяется при гипертонической болезни, гипертонических кризах эклампсии, для обезболивания родов.

Narcolanum. Нарколан (Б). 0,075—0,1 на 1 кг веса. Вводят в прямую кишку в 2,5—3% водном растворе, приготовляемом ex tempore (для основного наркоза).

2. ЭТИЛОВЫЙ АЛКОГОЛЬ

Spiritus vini. Спирт винный. *Alcohol aethylicus*, спирт этиловый 40—70—95°.

Rp. *Spiritus vini* 95° 200,0

DS. 1. Для дезинфекции инструментария.

2. Слизать с ложки 10 капель при стенокардии

Rp. *Spiritus vini* 70° 200,0

DS. Для дезинфекции рук хирурга перед операцией

Rp. *Spiritus vini* 40° (70°) 100,0

DS. Для компресса

Применяется при ангине, невралгиях, артритах, начинающихся инфильтратах, отморожениях, укусах насекомых.

Rp. *Spiritus vini* 90° 200,0

DS. 1. Обожженную поверхность при ожогах I и II степени покрыть стерильной, смоченной в алкоголе марлей с последующим тугим бинтованием по типу компресса — алкогольный компресс

2. Для обтирания кожи при пролежнях

Rp. *Spiritus vini* 70°

Aetheris aa 50,0

MDS. Смоченным ватным тампоном обмыть кожу — место подкожных и внутримышечных инъекций лекарств

Употребляют как дезинфицирующее и притупляющее болевую чувствительность.

3. СНОТВОРНЫЕ, НЕЙРОПЛЕГИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ СРЕДСТВА

Aethaminalum (Nembutal-natrium). Этаминал-натрий. Нембутал (Б). 0,5 (1,0).

Rp. *Aethaminali* 0,1

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке на ночь

Применяют при бессоннице.

Для лечения удлиненным или длительно-прерывистым сном, по 1 таблетке 2 раза в день: во второй половине дня и перед сном.

Barbamylium (Amytal-natrium). Барбамил (амитал-натрий). (Б). 0,5 (1,0).

Rp. Barbamyli 0,2
D. t. d. N. 6 in oblatiis
S. По 1 облатке на прием на ночь

Применяется при бессоннице.

Rp. Sol. Barbamyli 10% 10,0
Sterilisetur!
DS. По 5 мл в мышцу

Назначается при психическом возбуждении и для лечения удлиненным сном.

Rp. Barbamyli 1,0
Sol. Natrii chlorati isotonicae 100,0
MDS. По 30 мл для клизмы

Показания те же.

Veronalium. Веронал (Б). 0,75 (1,5).

Rp. Veronali 0,25
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. По 1 таблетке перед сном, запивая горячим чаем

Rp. Veronali 0,15
Pyramidoni 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Назначается при бессоннице, мигрени.

Medinalium. Мединал (Б). 1,0 (2,0).

Rp. Medinali 0,5
D. t. d. N. 6 in oblatiis
S. По 1 таблетке вечером перед сном

Rp. Sol. Medinali 10% 20,0
Sterilisetur!

DS. По 5—10 мл подкожно или внутримышечно

Применяют при невралгиях, нервном возбуждении.

Rp. Medinali 0,5
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече на ночь в прямую кишку

Назначают при неукротимой рвоте.

Luminalum. Люминал (Б). 0,3 (0,6).

Rp. Luminali 0,1 (0,05)
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке на прием 1—2 раза в день

Назначают при гипертонической болезни.

Rp. Luminali 0,02 (0,05)
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза в день

Назначают при эпилепсии.

Rp. Luminali 0,025
Antipyridini (или Pyramidoni) 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3—5 раз в день

Назначают при бессоннице, головных болях.

Rp. Luminali
Barbituly
Nembutali $\bar{a}\bar{a}$ 0,1
M. f. pulvis. D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 2 раза в день — во второй половине дня и перед отходом ко сну

Применяют для лечения удлиненным или длительно-прерывистым сном, при шизофрении.

Rp. Luminali 0,05
Aspirini 0,25

Extr. Belladonnae
Codeini phosphorici \overline{aa} 0,015
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку на ночь

Применяют при длительной, упорной бессоннице. Пропись М. А. Аксянцева.

Quietalum. Квиэтал (Б). По 0,1—0,3 на прием.

Rp. Quietali 0,1
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1—2 таблетки за полчаса до сна

При назначении снотворных производных барбитуровой кислоты: этаминала, барбамила, веронала, мединала, люминала и др. сон наступает через 30—50 минут, протекает ровно и длится примерно 4—6 часов почти без последствий. Но такие препараты, как веронал, мединал и люминал, выделяются из организма сравнительно медленно, кумулируются, в связи с чем при длительном их применении может появляться сонливость днем, слабость, потеря аппетита, тошнота, малокровие. Поэтому барбитураты не рекомендуют принимать без перерыва более 1—2 недель. При передозировке—промывание желудка, солевые слабительные, мочегонные, щелочные минеральные воды, ванны; свежесваренный крутой горячий чай, кофе. Противопоказания: болезни печени.

Paraldehydum. Паральдегид (Б). 5,0—(10,0), летучая жидкость с резким запахом.

Rp. Paraldehydi 2,0 (5,0)
Sirupi simplicis 10,0
Mucilaginis Salep
Aquae destillatae \overline{aa} 20,0
MDS. На 1 прием на ночь внутрь или в виде клизмы

Применяют как снотворное с противосудорожным действием.

Chloralum hydratum. Хлоралгидрат (Б). 2,0 (6,0).

Rp. Chlorali hydrati 1,0
Mucilaginis Gummi arabici
Aquae destillatae \overline{aa} 20,0
Sirupi simplicis 10,0
MDS. На один прием

Применяют как снотворное с противосудорожным действием.

Rp. Chlorali hydrati 1,0—(1,5)
Mucilaginis Amyli

Aquae destillatae \overline{aa} 30,0
MDS. На одну клизму

Применяют при судорогах.

Rp. Chlorali hydrati 3,0
Mucilaginis Amyli 40,0
Aquae destillatae ad 100,0
MDS. По 1 столовой ложке перед отходом
ко сну

Rp. Chlorali hydrati 3,0
Papaverini hydrochlorici 0,9
Extr. Valerianae et pulveris
Liquiritiae \overline{aa} q. s.
Ut f. pilulae N. 30
S. По 1 пилюле 2 раза в день — во второй
половине дня и перед сном

Применяют при гипертонической болезни.

Хлоралгидрат противопоказан при выраженных болезнях сердца, малокровии, инфекциях.

При отравлении хлоралгидратом до наступления сна — промывание желудка, рвотное; далее камфара, кофеин, стрихнин, искусственное дыхание, согревание.

Chloretonum. Хлорэтон. Как седативное по 0,3—0,5; как снотворное по 0,5—1,0.

Rp. Chloretoni 0,5
D. t. d. N. 6 in capsulis gelatinosis
S. По 1 капсуле на ночь

Назначают как общеуспокаивающее, снотворное. В. 0,1% водном растворе для примочек как антисептическое.

Tetridinum. Тетридин (Б) 0,5 (1,5).

Rp. Tetridini 0,1 (0,2)
D. t. d. in tabulettis
S. По 1 таблетке за 30 минут до сна (при бессоннице)

Противопоказан при артериосклерозе, паркинсонизме.

Noxugonum. Ноксирон. **Dogidenum.** Дориден (Б).
Выпускается в таблетках по 0,25.

Rp. Noxugoni 0,25
D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. Принимать по 1—2 таблетки за 30 минут до сна (сон длится 4—5 часов)

Adalinum. Адалин (Б). 1,0 (2,0).

Rp. Adalini 0,5

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке на ночь, запивая стаканом горячего чая

Назначают при бессоннице, неврастении.

Bromuralum. Бромурал (Б). 0,6 (1,0).

Rp. Bromurali 0,3 —

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке на ночь

Показания те же.

Aminazinum. Аминазин (**Largactilum.** Ларгактил) (Б).

Выпускается в порошках и таблетках по 0,025, в ампулах по 5 мл 0,5% раствора — для введения в мышцы; по 2 мл 2,5% раствора — для введения в вену. Разовая доза 0,025—0,05; суточная 0,1—0,3.

Rp. Aminazini 0,025

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. Принимать по 1—2 таблетки 2—3 раза в день после еды

Назначают при шизофрении, вводят как внутрь, так и парентерально. Курс длится 1½—2 месяца и более, также применяют при параноидных состояниях, пресенильных психозах—с возбуждениями; при хроническом алкоголизме; при упорной бессоннице назначают в сочетании со снотворными; при тошноте, рвоте, зудящих дерматозах, лучевой болезни.

Rp. Aminazini 1,25

Sol. Novocaini 0,5% 50,0

MD. Sterilisetur!

S. Вводить по 2 мл внутримышечно

Показания те же, а также при рвоте.

Rp. Sol. Aminazini 2,5% 2,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить внутривенно медленно повторно по 1—2 мл в 10 мл 20% раствора глюкозы

При шизофрении чередуют приемы аминазина внутрь с парентеральными его введениями. Курс длится 1—2 месяца и более. Применяют аминазин для усиления действия наркотиков—потенцированный наркоз; для получения состояния гипотермии. При передозировке аминазина назначают кофеин, стрихнин, эфедрин. Аминазин противопоказан при болезнях крови, почек, печени, миокардиосклерозе.

Propazinum. Пропазин (Б).

Выпускается в таблетках и драже по 0,025—0,050 и в ампулах по 2 мл 2,5% раствора для внутривенных и внутримышечных введений.

Rp. Propasini 0,025

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. Принимать после еды по 2—4 таблетки 2—3 раза в день

Показания и противопоказания см. Аминазин.

Plegomasinum (P) (s. Chlopropomasinum, s. Aminazinum). Плегوماзин (P) (Хлорпромазин) (Б). Выпускается в виде драже по 0,025 и в ампулах по 2 мл.

Rp. Plegomasini 0,025

D. t. d. N. 20 in dragee

S. Принимать во время еды, запивая жидкостью по 0,5 драже 3 раза в день — 2 дня подряд: далее $\frac{1}{2}$ — 1 драже 3 раза в день; максимум — 2 драже 3 раза в день

Применяют при подготовке к анестезии, искусственной гибернации, для предотвращения шока, а также при эклампсии, рвоте, бессоннице, остром зуде.

Лечение проводится под постоянным врачебным контролем.

Dinezinum. Динезин (Б).

Выпускается в таблетках по 0,05—0,1—0,2. Динезин иногда вводят в состав литических смесей. Близок к аминазину.

Rp. Dinezini 0,05

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3—5 раз в день

Применяют при паркинсонизме, болезни Паркинсона, торсионной дистонии. Противопоказан при нарушении функций печени и почек, выраженном артериосклерозе и расстройствах мозгового кровообращения.

Reserpinum. Резерпин (s. Serpasilum. Серпазил). По 0,0001 (0,00025) в таблетках.

Rp. Reserpini 0,00025
D. t. d. N. 50 in tabulettis
S. По 1 таблетке на ночь

На 2-й день принять 1 таблетку во второй половине дня и вторую — на ночь. Далее по 1 таблетке 3—4 раза в день (увеличение числа приемов до 6 раз в день не всегда способствует усилению эффекта, но ускоряет появление побочного действия: отеки слизистых оболочек, ночные кошмары, эйфория или сонливость, нервозность, тошнота, дрожание конечностей) в течение 3—6 недель подряд (до наступления понижения кровяного давления); затем дозу снижают до 1 таблетки в день или через день и употребляют ее на ночь в течение ряда недель или даже месяцев для сохранения артериального давления на пониженном уровне; с прекращением лечения через 3—6 недель артериальное давление нередко снова повышается и тогда лечение резерпином возобновляют.

Применяют резерпин при гипертонической болезни—лучше в ранних стадиях заболевания, при тахикардии, гиперфункции щитовидной железы, при поздних токсикозах беременным как гипотензивное и седативное средство.

Резерпин назначают на продолжительные сроки при шизофрении, при приступах страха, меланхолии с эмоциональным напряжением, при психомоторных беспокойствах, старческом слабоумии и для усиления действия снотворных.

Противопоказания: при тяжелых болезнях сердца, гипотонии, болезнях обмена веществ, при язве желудка и при отравлении снотворными. Лечение резерпином проводится под систематическим наблюдением врача.

Gendonum. Гендон (таблетки, содержащие 1—2 мг смеси алкалоидов растения раувольфия серпентина).

Rp. Tabulettarum Gendoni N. 50
DS. Принимать по 1 таблетке 2—3 раза в день (до 6 таблеток в сутки) после еды, не разжевывая

Применение гендона см. Резерпин, но действие его проявляется более мягко и через продолжительные сроки, примерно через 10—14 дней после начала лечения и полный эффект наступает лишь к 3—4-му месяцу. Применение гендона допустимо и у больных с явлениями склероза мозговых сосудов.

Dipheninum (Dilantinum). Дифенин (Дилантин)
(Б). 0,1.

Rp. Diphenini 0,1
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды

Назначают при судорогах.

Rp. Dilantini
Luminali
Dibazoli \overline{aa} 0,02
Coffeini natrio-benzoici 0,05
Acidi ascorbinici 0,2
Pyramidoni 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Назначают при начальных явлениях гипертонической болезни; при эпилептиформных припадках. Пропись С. А. Мельникова.

Дифенин противопоказан при болезнях печени, почек, декомпенсации сердца.

Hexamidinum. Гексамидин (Mysolinum. Мизолин) (Б).
По 0,25 на прием (суточная доза 0,5—1,5).

Rp. Hexamidini 0,25
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку на прием

Назначают при эпилепсии. Лечение производится длительно. Гексамидин противопоказан при болезнях печени, почек и кроветворной системы.

Trimetinum. Триметин (Б).

Rp. Trimetini 0,2 (0,3)
D. t. d. N. 10 in charta cerata
S. По 1 порошку 2—3 раза в день за едой

Назначают при легких формах эпилепсии.

Триметин противопоказан при болезнях печени, кроветворных органов и зрительного нерва.

Chlogasopum. Хлоракон (Б).

Rp. Chlogasoni 0,25 (0,5)
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Применяют при сильных судорожных припадках, при психомоторном возбуждении.

Лечение проводится длительно.

4. ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГРУППЫ ОПИЯ, МОРФИН И ЕГО ЗАМЕНИТЕЛИ

Opium purum. Opium pulveratum. Опий (А). Порошок темно-бурого цвета 0,1 (0,3).

Rp. *Opii pulverati* 0,05
Sacchari albi 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Назначают при болях в животе, поносах неинфекционного характера.

Rp. *Opii pulverati* 0,01
D. t. d. N. 10 in *tabulettis*
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Показания те же.

Extractum Opii siccum. Экстракт опия сухой (А). 0,05 (0,3).

Rp. *Extr. Opii* 0,015
Sacchari albi 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2 раза в день


Показания см. Порошок опия.

Rp. *Extr. Opii* 0,015
Ol. Cacao 2,0
M. f. *suppositorium*
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече в прямую кишку на ночь

T-ga Opii simplex. Настойка опия простая (А) 20 (50) капель.

Rp. *T-gae Opii simplicis* 5,0
DS. По 5—8 капель на прием

Применяют при болях в животе, поносах неинфекционного характера.



Rp. T-rae Opii simplicis
T-rae Menthae piperitae \overline{aa} 1,5
T-rae Valerianae 7,0
MDS. По 10—15 капель на прием

Показания те же.

Rp. T-rae Opii simplicis 8,0
DS. По 3—5 капель на кусок сахара — со-
сать

Применяют при кашле.

Pulvis Doveri (Pulvis Ipecacuinhae oriatus). Доверов порошок (Б). 0,5 (1,5).

Rp. Pulveris Doveri 0,25
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при кашле.

Rp. Pulveris Doveri
Natrii bicarbonici \overline{aa} 0,25
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при кашле, отхаркивающее.

Guttae Inosemzovi. Капли Иноземцева 20—30 капель на прием.

В состав капель Иноземцева входит опий.

Rp. Guttae Inosemzovi 20,0
DS. По 20 капель на прием

Показан при болях в животе, поносах неинфекционного характера.

Omnoponum (Pantoponum). Омнопон (Пантопон) (А). 0,03—(0,1). В омнопоне содержится около 50% морфина.

Rp. Sol. Omnoponi 1% (2%) 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 1 мл подкожно

Применяют как болеутоляющее в послеоперационном периоде, болях в сердце, спазмолитическое, см. Морфин.

Rp. Sol. Omnoponi 1% 10,0
Sterilisetur!
DS. По 1—2 мл подкожно

Назначается при стенокардии, инфаркте миокарда.

Rp. Omnoponi 0,01
Sacchari albi 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2 раза в день (болеуто-
ляющее)

Rp. Omnoponi 0,02
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече в прямую кишку

Показания те же.

Morphinum hydrochloricum. Морфин хлористоводород-
ный (А). 0,03 (0,1).

Rp. Solutionis Morphini hydrochlorici 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Ввести под кожу 1 мл за 30 минут пе-
ред операцией

Применяют при сильных резких болях; при остром инфаркте миокарда, ранениях, переломах, ушибах, желчных и почечных коликах, перитоните, остром плеврите, сухом сильном кашле, одышке, упорной рвоте, бессоннице, связанной с сильными болями; при отравлении атропином.

Во избежание привыкания к морфину и развития особо тяжелого заболевания (морфинизм) морфин назначают, как правило, одно-двукратно; как исключение не более одной недели и ни в коем случае не поручают делать впрыскивание препарата самому больному. Не рекомендуют детям до 2—5 лет. При отравлении морфином, опионом, препаратами опия вводят под кожу атропин, промывают желудок и прямую кишку (высокие клизмы) 0,02% раствором перманганата калия, карбоген.

Rp. Morphini hydrochlorici 0,1
Aquaе Amygdalagum amagalum 10,0
MDS. По 10—20 капель на ночь

Показание см. выше.

Rp. Morphini hydrochlorici 0,01
Sacchari albi 0,3

M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку на ночь

Применяют при злокачественных новообразованиях, инфаркте миокарда.

Rp. Morphini hydrochlorici 0,01
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. Вводить по 1 свече в прямую кишку на ночь

Показания те же.

Codeinum. Кодеин (Б) 0,05—(0,2).

Rp. Codeini 0,02
Sacchari albi 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку на прием 2—4 раза в день

Назначают при кашле.

Rp. Codeini 0,015
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. По 1 таблетке на ночь

Показания те же.

Rp. Codeini 0,02
Natrii bicarbonici 0,3
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Назначают при кашле, как отхаркивающее.

Codeinum phosphoricum. Фосфат кодеина. Кодеин фосфорнокислый (Б). 0,1 (0,3).

Rp. Codeini phosphorici 1,0
Aquaе destillatae 20,0
MDS. По 10—15 капель на прием

Назначают при сухом плеврите, кашле.

Hydrocodonum phosphoricum. Гидрокодон фосфорнокислый (А). Доза 0,005—0,01—0,02 (0,06).

Rp. Hydrocodoni phosphorici 0,005
Sacchari albi 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Назначают при кашле как успокаивающее.

Dioninum. Дионин (А). 0,03 (0,1).

Rp. Dionini 0,01
Natrii bicarbonici 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Назначают при кашле.

Paraverinum hydrochloricum. Папаверин хлористоводородный (Б). 0,1 (0,2).

Rp. Paraverini hydrochlorici 0,03
Sacchari albi 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Назначают при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов—бронхиальной астме, гипертонической болезни, стенокардии.

Rp. Paraverini hydrochlorici
Luminali $\bar{a}\bar{a}$ 0,05
Sacchari albi 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день

Назначают при стенокардии, гипертонической болезни, мигрени.

Rp. Paraverini hydrochlorici 0,03
Diuretini 0,4
Luminali 0,02
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12 in oblatiis
S. По 1 облатке 3 раза в день

Назначают при стенокардии, гипертонической болезни, мигрени.

Rp. Paraverini hydrochlorici 0,04
Euphyllini 0,2

Analgini 0,25 (или Promedoli 0,02)
Barbamyli 0,05 (0,08)
M. f. pulvis
D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза в день в течение
7—10 дней

Лечение повторить после 2—3-недельного перерыва (при гипертонической болезни, коронарокардиосклерозе, стенокардии).

Rp. Papaverini hydrochlorici 0,25
Atropini sulfurici 0,005
Aquae destillatae 10,0
M. Sterilisetur!
DS. По 1 мл под кожу

Применяют при бронхиальной астме, желчной колике.

Rp. Papaverini hydrochlorici 0,04
Extr. Belladonnae 0,015
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече в прямую кишку

Применяют при болях в животе спастического характера.

Rp. Papaverini hydrochlorici 0,02
Extr. Belladonnae 0,015
Sacchari albi 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяют при стенокардии, спастических колитах.

Promedolum. Промедол (А). Внутрь 0,075 (0,15), подкожно 0,04—(0,08).

Rp. Promedoli 0,025
Sacchari 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Назначают как болеутоляющее, сосудорасширяющее — при стенокардии, инфаркте миокарда.

Rp. Sol. Promedoli 2% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 1 мл подкожно

Применяют для обезболивания родов, а также при стенокардии, почечных коликах, травмах, в послеоперационном периоде.

Escodolum. Эскодол (А). Выпускается в ампулах.

В 1 мл препарата содержится: скополамина бромистоводородного 0,0005, промедола 0,02 и эфедрина хлористоводородного 0,025.

Rp. Escodoli 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Ввести 1 мл за 30 минут перед операцией для базисного наркоза

Применяют при сильных болях, при невралгиях, коликах, артритических болях.

Isopromedolum. Изопромедол (А). Выпускается в ампулах по 1 мл 1 и 2% раствора и в таблетках по 0,025. Высшая разовая доза под кожу 0,03 (0,06). Для употребления внутрь — 0,06 (0,12).

Rp. Sol. Isopromedoli 1% (2%) 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Ввести 1 мл под кожу

Назначают при острых болях, для обезболивания родов. Изопромедол эффективнее промедола при сходных токсических свойствах.

Возможные осложнения—головокружения, тошнота, состояние опьянения.

Anadolum. Анадол (А).

Выпускается в порошках, в таблетках по 0,025 и в ампулах по 1 мл — 1—2% раствора.

Rp. Anadoli 0,025 (0,05)
D. t. d. N. 10 in tabl.
S. По 1 таблетке на прием

Назначают при острых болях, стенокардии.

Phenadonum. Фенадон. **Dolamidum,** Доламид (А). 0,01 (0,02).

Rp. Phenadoni 0,005
Sacchari 0,25

M. f. pilvis

D. t. d. N. 6

S. По 1 порошку 2 раза в день

Применяют как болеутоляющее, спазмолитическое.

Thecodinum. Текодин (**Dinacopum.** Динаркон. **Eucodolum,** Эукодал) (А). Выпускается в таблетках по 0,005 препарата. Высшая разовая доза 2 таблетки (6 таблеток).

Rp. Thecodini 0,005

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке 1—2 раза в день

Применяют при острых болях различного характера, бессоннице, связанной с сильными болями, упорном кашле, инфаркте миокарда, стенокардии.

Противопоказан при состоянии угнетения дыхательного центра, отравлении судорожными ядами и в возрасте до 5 лет.

5. АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ, ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ. САЛИЦИЛАТЫ. АТОФАН. УРОДАН

Antipyginum. Антипирин (Б). 1,0 (3,0).

Rp. Antipygini 0,25 (0,5)

D. t. d. N. 6

S. По 1 порошку 2 раза в день

Назначается как жаропонижающее, анальгетическое при невралгиях, артрите.

Rp. Antipygini

Phenacetini \overline{aa} 0,25

M. f. pulvis

D. t. d. N. 6

S. По 1 порошку на прием

Назначают при головных болях и как жаропонижающее.

Rp. Sol. Antipygini 10% 50,0

DS. Для смачивания тампонов

Назначают при кровотечении из носа.

Rp. Antipygini 0,5

Paraverini hydrochlorici 0,04

M. d. pulvis

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяют как антиспастическое при стенокардии, гипертонической болезни, болеутоляющее.

Rp. Antipygini 0,3
Omnoponi 0,01
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium

D. t. d. N. 10

S. По 1 свече в прямую кишку

Применяется для обезболивания родов.

Rheopyrinum. Реопирин (Б). Выпускается в дражированных таблетках по 0,6 и в ампулах по 5 мл.

Rp. Rheopygini 0,6

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке 3—4—6 раз в день

Применяют при гриппе, ревматизме, невралгиях.

Rp. Sol. Rheopygini 5,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить в мышцы медленно по 5 мл.

Вводят в лежащем положении больного внутримышечно в ягодичную область длинной иглой ежедневно или через день. В промежутках между инъекциями принимают реопирин по 3—6 таблеток в сутки.

Применяют при ревматизме, артритях, спондилартритах, люмбаго, остром ревматическом перикардите, мышечном ревматизме и как анальгетическое средство. Противопоказан при столбняке, эпилепсии, выраженных заболеваниях сердца, почек, печени,

Во избежание лейкопении и агранулоцитоза у больного следует постоянно контролировать состав крови.

Pyramidonum. Пирамидон (Б). 0,5 (1,5).

Rp. Pyramidoni 0,25 (0,5)

D. t. d. N. 10

S. По 1 порошку на прием

Применяют при головных болях, невралгиях, ревматизме.

Rp. Pyramidoni 0,25

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке на прием

Показания те же.

Таблетки пирамидона с кофеином — «Пирамеин».

Rp. Pyramidoni 0,3
Coffeini 0,03
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пирамеин — показания те же.

Таблетки пирамидона с люминалом — «Пираминал».

Rp. Pyramidoni 0,25
Luminali 0,02
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Пираминал показан при мигрени, гипертонической болезни.

Таблетки пирамидона с фенацетином — «Пирафен».

Rp. Pyramidoni
Phenacetini āā 0,25
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Пирафен — показания те же.

Rp. Pyramidoni
Analgini āā 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Применяют при головных болях, ишиалгии, миозите.

При длительном применении пирамидона может наступить гранулоцитопения.

Analginum. Анальгин (Б). 1,0 (3,0).

Rp. Analgini 0,5
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке на прием

Назначают при невралгиях, радикулите, стенокардии.

Rp. Sol. Analgini 50% 10,0
Sterilisetur!
DS. По 1 мл 2—3 раза в день в мышцу

Показания те же.

Rp. Analgini
Pyramidoni āā 0,25
Pachicarpini 0,05
Nembutali 0,1
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. Принимать по 1 порошку 2—3 раза в день

Назначают при гипертонических кризах, эндартеритах.

Butadionum. Бутадион (Б). По 0,1—0,15 суточная = 0,6 на прием.

Rp. Butadioni 0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 4—6 раз в день за едой

Применяют при ревматизме, артритах, подагре — под контролем состава крови.

Бутадион противопоказан при язвенной болезни, болезнях печени, декомпенсации сердца.

Pygabutum. Пирабутол (**Irgapyrinum.** Иргапирин. **Реопирин**) (Б). Выпускается в ампулах по 5 мл.

Rp. Sol. Pygabutoli 5,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводить медленно по 3—5 мл 1 раз в день или 2—3 раза в неделю в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы при лежащем положении больного. При введении под кожу может образоваться абсцесс

Назначают при спондилартритах, остром ревматическом полиартрите, мышечном ревматизме; противопоказан при сердечной недостаточности, декомпенсированном ревматическом эндокардите, геморрагическом диатезе, лейкопении, диабете, в пожилом возрасте. Лечение проводится под контролем картины крови.

Phenacetinum. Фенацетин 0,2—0,5.

Rp. Phenacetini 0,25
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку на прием

Показан при головных болях и как жаропонижающее.

Rp. Phenacetini
Pyramidoni āā 0,25
Coffeini 0,05
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Назначают при головных болях, невралгиях.

Aspirinum. Аспирин 0,25—0,5.

Rp. Aspirini 0,25 (0,5)
D. t. d. N. 6 in tabulettis

Показан при стенокардии или грудной жабе гипертонических кризах как надежное сосудорасширяющее и уменьшающее свертываемость крови.

По 0,25 на ночь (при гипертонической болезни, сопровождающейся головными болями); при ревматизме доза увеличивается до 3,0—5,0 в сутки.

Таблетки аспирина с фенацетином — «асфен».

Rp. Aspirini
Phenacetini āā 0,25
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. По 1 таблетке на прием

Применяют как болеутоляющее, жаропонижающее.

Rp. Aspirini
Phenacetini āā 0,25
Coffeini patrio-benzoici 0,1
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Применяют при невралгиях, головных болях.

Таблетки аспирина с фенацетином и кофеином — «аскофен».

Rp. Aspirini
Phenacetini āā 0,2
Coffeini 0,04
D. t. d. N. 6 in tabulettis
S. Принимать по 1 таблетке

Применяют при головных болях.

Natrium salicylicum. Салицилат натрия 0,3—1,0 до 6,0—10,0 в сутки.

Rp. Natrii salicylici 0,5 (1,0)
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку через 4 часа

Применяют при остром суставном ревматизме.

Rp. Natrii salicylici 1,0
Natrii bicarbonici 0,5
M. f. pulvis
D. t. d. N. 24
S. По 1 порошку 4—6 раз в день

Показания те же.

Rp. Sol. Natrii salicylici 10% 20,0
Sterilisetur!
DS. Вводить внутривенно медленно, по 5—10 мл ежедневно

Применяют при ревматизме.

В случае передозировки препарата и наступления сердечной слабости вводят кофеин или же профилактически дают свежезаваренный первосортный крепкий горячий чай или кофе.

Methylum salicylicum. Метилловый эфир салициловой кислоты, желтоватая, пахучая жидкость.

Rp. Methylii salicylici
Chloroformii
Ol. Hyoscyami \overline{aa} 30,0
M. f. linimentum
DS. Для растирания с последующим теплым укутыванием

Применяют при суставном или мышечном ревматизме, артритах.

Rp. Methylii salicylici
Linimenti volatilii \overline{aa} 30,0
M. f. linimentum
DS. Для втирания в области суставов

Показания те же.

Rp. Methylii salicylici 21,0
Mentholi 4,0
Vaselini 75,0
M. f. unguentum
DS. Растирание

Выпускается в готовом виде в тюбиках под названием «Бом-Бенге»

Показания те же.

Acidum salicylicum. Салициловая кислота.

Rp. Acidi salicylici
Acidi lactici $\bar{a}\bar{a}$ 2,0
Collodii elastici ad 10,0
MDS. Мозольная жидкость (повторное смазывание мозоли чередовать с теплыми ваннами)

Rp. Acidi salicylici 1,0
Spiritus vini 70° 50,0
MDS. Протирать кожу при зуде

Rp. Acidi salicylici
Resorcini $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
Spiritus vini 80° ad 100,0
MDS. Наружное

Назначается при себорее головы, грибковых поражениях кожи.

Atophanum. Атофан 0,25—0,5.

Rp. Atophani 0,5
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день, запивая 2% раствором двууглекислой соды или щелочной минеральной водой

Назначают при подагре.

Rp. Atophani
Pyramidoni $\bar{a}\bar{a}$ 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 15 in oblatis
S. По 1 облатке 3 раза в день

Показания те же.

Urodanum. Уродан.

Состав: пиперазина фосфорнокислого 2,5 ч., уротропина 8 ч., бензоата натрия 25 ч., бензоата лития 2 ч., двузамещенного фосфорнокислого натрия 10 ч., двууглекислого натрия 37,5 ч., виннокаменной кислоты — 37,5 ч.

Rp. Urodani 100,0

DS. По 1 чайной ложке в $\frac{1}{2}$ стакана воды
3—4 раза в день

Назначают при подагре, почечных камнях, спондилартритах.

Urosinum. Урозин.

Выпускается в таблетках, состоящих из 0,22 фосфата пиперазина, 0,1 бензоата лития, 0,25 уротропина.

Rp. Tabulettae Urosini N. 20

DS. Принимать по 1—2 таблетки 3—4 раза в день перед едой

Показания см. Уродан.

6. БРОМИДЫ

Natrium bromatum. Бромид натрия. 0,01—1,0 на прием.

Rp. Sol. Natrii bromati 1% (2—3%) 200,0

DS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Назначают при неврастении, истерии.

Rp. Natrii bromati 12,0

Aquae destillatae 200,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Назначают при эпилепсии.

Rp. Natrii bromati 1,5 (2,0)

Coffeini natrio-benzoici 0,15 (0,2)

Aquae destillatae 200,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Назначают при неврозах.

Применение брома в сочетании с кофеином при неврозах предложено И. П. Павловым и М. К. Петровой.

Rp. Natrii bromati

Adonisidi \overline{aa} 5,0 (2,0)

Omnoponi 0,08

Aquae Menthae 200,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Назначают при неврозах.

Пропись Е. К. Сеппа.

Kalium bromatum. Бромид калия. 0,01—1,0 на прием.

Rp. Sol. Kalii bromati 3,0 (6,0) : 180,0

DS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Показан при неврастении.

Camphora monobromata. Камфара бромистая. 0,1—0,5.

Rp. Camphorae monobromatae 0,25

D. t. d. N. 12 in capsulis gelatinosis

S. По 1 капсуле 2—3 раза в день

Показана при неврастении.

Длительное применение бромидов—более двух недель—и в больших дозах не рекомендуется: при высоком кровяном давлении, выраженном атеросклерозе и гиперхолестеринемии. В отдельных случаях при систематическом употреблении брома могут развиваться явления бромизма—кожные сыпи (аспе), катар дыхательных путей, угнетенное состояние, ухудшение памяти и другие признаки его кумулятивных свойств. С отменой препарата все эти явления постепенно с течением времени проходят сами по себе. Поваренная соль, хлориды ускоряют выделение брома из организма.

7. ГРУППА КОФЕИНА

Coffeinum. Кофеин (Б). 0,3 (1,0).

Rp. Coffeini 0,05

Sacchari albi 0,25

M. f. pulvis

D. t. d. N. 10

S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Применяют при физической и психической усталости, сонливости, гипотонии, при неврозах вместе с бромом, при головных болях—вместе с жаропонижающими.

Rp. Coffeini 0,1 (0,05)

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке на прием

Показания те же.

Rp. Coffeini 0,05

Aspirini 0,25 (0,5)

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при головных болях, мигрени.

Coffeinum natrio-benzoicum. Кофеин-бензоат натрия (Б). 0,5 (2,0).

Rp. Sol. Coffeini natrio-benzoici 10% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить по 1 мл под кожу

Применяют при остром ослаблении сердечной деятельности, расстройствах дыхания, отравлении алкоголем, наркотиками.

Rp. Sol. Coffeini natrio-benzoici 10% 20,0

Sterilisetur!

DS. По 1 мл под кожу

Показания те же

Rp. Coffeini natrio-benzoici 0,1

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке на прием по мере необходимости

Назначают для усиления умственной и физической работы, при гипотонии, остром ослаблении сердечной деятельности.

В отдельных случаях вместо кофеина рекомендуют свежесваренный, первосортный крутой, горячий чай (в листьях чая содержится 2—3% кофеина) или кофе.

Methylcoffeinum. Метилкофеин (Б). 0,1—0,2.

Rp. Methylcoffeini 0,05

Sacchari 0,25

M. f. pulvis

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Применяют при сердечной слабости.

Extractum Colae fluidum. Жидкий экстракт колы (содержит кофеин). 10—15 капель на прием.

Rp. Extr. Colae fluidi 20,0

DS. По 15 капель 2 раза в день

Стимулятор центральной нервной системы.

Кофеин противопоказан при повышенной возбудимости, бессоннице, выраженном миокардиосклерозе, коронарной недостаточности.

При передозировке препаратов кофеина развивается сердцебиение, слабость, дрожь.

Theobrominum. Теобромин (Б). 0,5 (2,0).

Rp. Theobromini 0,15

Luminali 0,05

M. f. pulvis

D. t. d. N. 15

S. По 1 порошку после еды 2 раза в день

Применяют при стенокардии, гипертонической болезни.

Diuretinum (Theobrominum natrio-salicylicum). Диуретин (теобромин салицилат натрия). 1,0 (6,0).

Rp. Diuretini 0,5

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Применяют при гипертонической болезни, стенокардии и как мочегонное.

Rp. Diuretini 0,5

Luminali 0,02

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при стенокардии, гипертонической болезни.

Rp. Diuretini 0,5 (или Euphyllini 0,2)

Papaverini hydrochlorici 0,03 (0,04)

Barbamyli 0,08

Analgini 0,5

M. f. pulvis

D. t. d. N. 12 in oblatiis

S. По 1 облатке 3 раза в день после еды

Применяют при гипертонической болезни, стенокардии.

Rp. Diuretini 0,5

Ephedrini hydrochlorici 0,025

Atropini sulfurici 0,0003

Dionini 0,01 (или Codeini phosphorici 0,015)

Luminali 0,03 (или Barbamyli 0,08)

M. f. pulvis

D. t. d. N. 12 in oblatiis

S. По 1 облатке 3 раза в день

Назначают при бронхиальной астме. Пропись В. Н. Виноградова.

Rp. Diuretini 4,0
Aquae Menthae
Aquae destillatae \overline{aa} 90,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Назначают при гипертонической болезни.

Rp. Diuretini
Antipyricini \overline{aa} 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 15
S. По 1 порошку 3 раза в день

Назначают при гипертонической болезни, головных болях.

Theophyllum (Theocin). Теофиллин (теоцин) (Б).
0,3 (1,0):

Rp. Theophyllini 0,1
Sacchari 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день

Показан как сосудорасширяющее, мочегонное, при коронарной недостаточности.

Rp. Theophyllini 0,2
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 10
S. По 1 свече 2 раза в день в прямую кишку

Показания те же.

Euphyllum. Эуфиллин (Б). 0,1—0,2 (1,0).

Rp. Euphyllini 0,1 (0,2)
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют как сосудорасширяющее при гипертонической болезни, стенокардии и как мочегонное.

Rp. Sol. Euphyllini 20% 2,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1—2 мл в мышцы

Показания те же.

Rp. Euphyllini 0,24 (0,48)
Sol. Glucosae 10% 20,0
M. Sterilisetur!
DS. Вводить внутривенно медленно по
10—20 мл на ночь

Назначают при бронхиальной астме.

Rp. Euphyllini 0,3
Olei Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 10
S. Вводить по 1 свече 2 раза в день в
прямую кишку

Назначают при бронхиальной астме.

Rp. Euphyllini 0,1
Platyphyllini bitartarici 0,003
Analgini 0,2
Ephedrini hydrochlorici 0,015
Luminali 0,015
Dimedroli 0,02
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяют при бронхиальной астме. Пропись Б. Б. Когана.

Rp. Euphyllini 0,2
Tirpheni 0,03
Analgini 0,25
Barbamyli 0,08
M. f. pilvis
D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза в день после еды
в течение 7—10 дней каждый месяц

Применяют при гипертонической болезни, кардиосклерозе, стенокардии.

Syntophyllum. Синтофиллин (Б).

Синтофиллин является диуретическим средством пуринового ряда. Выпускается в ампулах для внутримышечных инъекций по 2 мл 24% раствора и в ампулах для внутривенных введений по 10 мл 2,4% раствора. Высшая доза 0,5 (1,5).

Rp. Sol. Syntophyllini 24% 2,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить внутримышечно медленно по 1—2 мл

В случае необходимости инъекцию можно повторить

Назначают при отеках сердечного и почечного происхождения, бронхиальной астме.

Противопоказан при остром нефрите, язвенной болезни.

8. СТРИХНИН, СЕКУРИНИН, КОРАЗОЛ, КОРДИАМИН, ЦИТИТОН, ЛОБЕЛИН, КАРБОГЕН

Strychninum nitricum. Стрихнин азотнокислый (А). 0,002 (0,005).

Rp. Sol. Strychnini nitrici 0,1% 1,0

D. t. d. N. 20 in ampullis

S. Вводить под кожу по 1 мл 1—2—3 раза в день

Показан при острой сердечной слабости, гипотонии, аритмии, дилатации сердца, расстройствах дыхания, при пневмонии и других инфекциях; при парезах и параличах, понижении моторной и секреторной функции желудочно-кишечного тракта; при понижении обмена веществ и функций органов чувств, при недержании мочи, импотенции, отравлении наркотиками, хроническом алкоголизме.

При отравлении стрихнином—при попадании его внутрь—тотчас же промыть желудок или ввести под кожу апоморфин, дать принять 2 столовые ложки животного угля, размешанного в стакане воды, принять солевое слабительное. При судорогах дают вдыхать хлороформ или вводят в прямую кишку хлоралгидрат в виде клизмы. Искусственное дыхание.

Rp. Strychnini nitrici 0,03

Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s.

ut. f. pilulae N. 30

DS. По 1.пилюле 2 раза в день

Показания те же.

Rp. Strychnini nitrici

Acidi arsenicosi \overline{aa} 0,03

Ferri lactici 6,0

Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s.

ut. f. pilulae N. 60

DS. Принимать по 1—2 пилюле 2—3 раза
в день

Назначают при гипотонии, малокровии.

Extractum Strychni siccum (s. Extr. Nucis vomicae siccum).

Экстракт чилибухи, экстракт рвотного ореха сухой (Б).
0,012 (0,05).

Rp. Extr. Strychni 0,3
Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s.
ut f. pilulae N. 30
DS. По 1 пилюле 2 раза в день

Показания см. Стрихнина.

T-га Strychni (s. T-га Nucis vomicae). Настойка рвотного ореха (Б). 15 (30) капель.

Rp. T-гае Nucis vomicae 10,0
DS. По 7—10 капель на прием

Применяют как тонизирующее, улучшающее аппетит.

Rp. T-гае Strychni 5,0
T-гае Valerianaе 10,0 (s. T-гае Convallariae majalis)
MDS. По 10—20 капель на прием

Применяют при сердечной слабости.

Securininum nitricum. Секуринин азотнокислый (А).

Rp. Sol. Securinini nitrici 0,2% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводить по 1 мл под кожу ежедневно

Применяют при астении, парезах, параличах, сердечной слабости, полиомиелите.

Rp. Securinini nitrici 0,4% 15,0
DS. По 15 капель на прием

Показания те же.

Echinopsinum. Эхинопсин (А). Эхинопсин — алкалоид, по действию близок к стрихнину.

Rp. Sol. Echinopsini 1% 20,0
DS. По 10—20 капель на прием 2 раза в день (до 20—30 дней)

Применяют при параличах и парезах, при астенических состояниях, гипотонии.

Rp. Sol. Echinopsini 1 : 250 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводить по 1 мл под кожу ежедневно

Показания те же.

Corazolium. Коразол (Б). 0,1 (0,3).

Rp. Sol. Corazoli 10% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводить под кожу 1 мл

Назначают при упадке сердечной и дыхательной деятельности, при отравлении наркотиками.

Rp. Corazoli 0,1
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Показания те же.

Cordiaminum. Кордиамин (Б). 30 (90) капель.

Rp. Cordiamini 1,0 (2,0)
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл под кожу

Применяют как стимулятор сердечной и дыхательной деятельности.

Rp. Cordiamini 10,0 (30,0)
DS. По 20 капель на прием

Показания те же.

Cytitonium. Цититон 0,15% раствор цитизина по 1 мл (2 мл).

Rp. Cytitoni 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Ввести под кожу 0,5—1 мл

Применяют при асфиксии новорожденных и расстройствах дыхания.

Lobelinum hydrochloricum. Лобелин хлористоводородный (Б). 0,01 (0,02).

Rp. Sol. Lobelini hydrochlorici 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Ввести под кожу 0,5—1 мл

Показания см. Цититон.

Acidum carbonicum. Углекислота. **Carbogenum.** Карбоген (смесь: углекислоты 5—7% и кислорода 95—93%). Хранится в баллонах.

Вдыхают углекислоту в смеси с кислородом при упадке дыхания, при асфиксии новорожденных, при отравлении наркотиками, окисью углерода, сероводородом. При вдыхании же больших концентраций развиваются одышка, судороги, паралич дыхания.

9. ФЕНАМИН, ПЕРВИТИН, ФЕНАТИН, КИТАЙСКИЙ ЛИМОННИК, ЖЕНЬШЕНЬ, ПАНТОКРИН

Phenaminitum. Фенамин (А). 0,01 (0,02).

Rp. Phenamini 0,005 (0,01)
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1/2—1 таблетке на прием

Применяют при умственной и физической усталости, депрессивных состояниях, общей вялости, отравлении наркотиками, снотворными, алкоголем.

Rp. Phenamini 0,002 (0,005)
Sacchari albi 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку на прием

Показания те же.

Pergvitinum. Первитин (А). По 0,001—0,003 на прием

Rp. Pergvitini 0,003
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Показан при утомлении, депрессивных состояниях.

Phenatinum. Фенатин (А). 0,05—0,15.

Rp. Phenatini 0,05
Sacchari 0,2
M. f. pulvis

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку на прием

Показан при утомлении, общей слабости.

Pyridrolum. Пиридрол (А). Выпускается в таблетках по 0,001 и 0,0025. По своим свойствам близок к фенамину.

Rp. Pyridroli 0,001

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. Принимать по 1—2 таблетки в первой половине дня

Показан при депрессивных состояниях, нарколепсии, астении. при вяло протекающей форме шизофрении.

Pulvis Schizandrae chinensis. Порошок китайского лимонника.

Rp. Pulveris Schizandrae chinensis 0,5

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку по утрам

Применяют при гипотонии, переутомлении.

Tinctura Schizandrae chinensis. Настойка китайского лимонника.

Rp. T-ae Schizandrae chinensis 25,0

DS. По 20—30 капель 2 раза в день

Показания те же.

Rp. T-ae Schizandrae chinensis 20,0

T-ae Strychni 5,0

MDS. По 25 капель 2 раза в день

Применяют при гипотонии, для улучшения аппетита.

T-га Ginsengi. Настойка женьшеня по 15—25 капель на прием.

Rp. T-ae Ginsengi 20,0

DS. По 20 капель на прием

Применяют при гипотонии, общем упадке сил, переутомлении.

Pantocrinum. Пантокрин.

Rp. Pantocrini 40,0

DS. По 40 капель 3 раза в день до еды

Применяют при переутомлении, астении, при сердечной слабости, связанной с инфекцией.

Rp. Pantocrini 1,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. По 2 мл под кожу ежедневно

Показания те же.

Tinctura Agalii mandschurici. Настойка аралии маньчжурской. Выпускается в склянках по 50 мл.

Rp. T-гае Agalii mandschurici 50,0
DS. По 30—40 капель 2—3 раза в день

Применяют при астенических и неврастенических состояниях.

Tinctura Sterculia platanifoliae. Настойка стеркулии платанолистной. Выпускается в склянках по 50 мл.

Rp. T-гае Sterculiae platanifoliae 50,0
DS. По 15—20 капель 2—3 раза в день

Применяют при астениях различной этиологии, гипотонии.

Tinctura Echinopanax elati. Настойка заманихи.

Rp. T-гае Echinopanax elati 25,0
DS. Принимать по 30—40 капель 3 раза в день

Применяют при астенических и депрессивных состояниях, при гипотонии — как стимулятор центральной нервной системы.

Стрихнин и другие стимуляторы центральной нервной системы противопоказаны: при повышенной возбудимости, базедовой болезни, высоком кровяном давлении, при выраженной форме атеросклероза.

II. ПРОПИСИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ ОКОНЧАНИЙ ЭФФЕРЕНТНЫХ НЕРВОВ

1. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА М- И Н-ХОЛИНОРЕАКТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ

(м-мускарино- и н-никотиночувствительные
холинореактивные структуры)

Acetylcholinum chloratum. Ацетилхолин хлористый
(Б). 0,2 (0,6) в ампулах, кристаллы, расплывающиеся на
воздухе.

Rp. *Acetylcholini chlorati* 0,2

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Содержимое ампулы растворить в 2 мл
стерильной дистиллированной воды и
вводить под кожу по 0,3—0,5—1 мл под
наблюдением врача

Раствор готовят *ex tempore*.

Применяют при эндартеритах, атонии кишок, при пароксиз-
мальной тахикардии.

Carbocholinum. Карбохолин (А). Внутрь 0,001 (0,003),
под кожу 0,0005 (0,001).

Rp. *Carbocholini* 0,001

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Назначают при эндартерите, пароксизмальной тахикардии,
атонии кишок, матки и ранних проявлениях гипертонической болез-
ни, полиомиелите.

Rp. Sol. Carbocholini 0,01% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл под кожу

Показания те же.

Rp. Sol. Carbocholini 0,5% 5,0
DS. По 2 капли в больной глаз 2 раза в
день

Применяется при глаукоме.

Eserinum (s. Physostigminum) salicylicum. Эзерин
(физостигмин) салициловокислый (А), 0,001 (0,003).

Rp. Sol. Eserini salicylici 0,25% 5,0
DS. По 2 капли в больной глаз 2 раза
в день

Применяется при глаукоме.

Proserinum. Прозерин (А). 0,015 (0,045) внутрь и
0,0005 (0,001) под кожу.

Rp. Proserini 0,015
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Применяется при вялой родовой деятельности, полиомиелите.

Rp. Sol. Proserini 0,05% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 1 мл под кожу

Применяется при атонии кишок, миастении, невритах.

Rp. Sol. Proserini 0,5% 5,0
DS. Глазные капли

Применяется при глаукоме.

Galanthaminum hydrobromicum. Галантамин бромистоводородный (А). По 0,01 (0,02) на прием.

Rp. Galanthamini 0,002 (0,005)
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку на прием

Назначают при миастении, полиневритах, полиомиелите.

Rp. Sol. Galanthamini 0,5% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 0,5—1 мл под кожу 1—2 раза в день

Показания те же.

Phosphacolum. Фосфакол (А), маслянистая жидкость.
1 : 5000; 1 : 10 000.

Rp. Sol. Phosphacoli 1 : 5000 10,0
DS. По 2 капли в оба глаза 2 раза в день

Назначают при глаукоме.

Argentum. Армин (А).

Rp. Sol. Argini 0,005% 10,0
DS. По 1—2 капли в больной глаз 2 раза
в день

Назначают при глаукоме.

2. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА М-ХОЛИНОРЕАКТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ

а) М-холиномиметические средства

Pilocarpinum hydrochloricum. Пилокарпин хлористово-
дородный (А). 0,01 (0,02).

Rp. Sol. Pilocarpini hydrochlorici 1% 5,0
DS. По 2 капли в больной глаз 2 раза в
день

Показан при глаукоме.

Rp. Pilocarpini hydrochlorici 0,05
Dionini 0,1
Aquaе destillatae 5,0
MDS. Глазные капли

Показан при глаукоме.

Benzamonum. Бензамон (А).

Rp. Sol. Benzamoni 3% (10%) 10,0
DS. По 2 капли в больной глаз

Показан при глаукоме.

б) М-холинолитические средства

Atropinum sulfuricum. Атропин сернокислый (А).
0,001 (0,003).

Rp. Sol. Atropini sulfurici 0,1%
(0,25—0,5%) 10,0
DS. По 2 капли в больной глаз

Применяют в целях расширения зрачка при осмотре глазного дна, при ранениях глаза и при иритах.

Rp. Atropini sulfurici 0,05
Dionini 0,3
Aquae destillatae 10,0
MDS. По 2 капли в больной глаз 2 раза
в день

Применяют при травме глаза.

Rp. Sol. Atropini sulfurici 0,1% 1,0
D. t. d. N 20 in ampullis
S. По 1 мл подкожно

Показан для поддержания дыхательной деятельности; перед эфирным или хлороформным наркозом; при брадикардии, стенокардии, бронхиальной астме, язвенной болезни, желчнокаменной болезни, при болях в животе спастического характера; при отравлении морфином, ацетилхолином, карбохолином, пилокарпином, грибами мухоморами.

При передозировке атропина и его препаратов наступает беспокойство, сухость во рту, сиплый голос, жажда, расширение зрачка, частый пульс, красная кожа, вздутие живота, задержка мочи.

Врачебная помощь: промывание желудка, внутрь 1—2 столовые ложки животного угля, размешанного в стакане воды; морфин под кожу 2 мл 1% раствора (взрослому человеку), кофеин.

Rp. Atropini sulfurici 0,1% 15,0
DS. По 10 капель на прием 2 раза в день

Показания те же.

Rp. Atropini sulfurici 0,015
Papaverini hydrochlorici 0,6
Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s.
ut f. pilulae N. 30
DS. По 1—2 пилюли 2 раза в день

Применяют при стенокардии, бронхиальной астме, желчнокаменной болезни.

Rp. Atropini sulfurici 0,0003
Euphyllini 0,2 (Diuretini 0,5)
Ephedrini hydrochlorici 0,025
Papaverini hydrochlorici 0,04
Codeini phosphorici 0,015
Luminali 0,075
M. f. pulv.
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяют при бронхиальной астме.

Rp. Atropini sulfurici 0,001
Olei Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече в прямую кишку на ночь

Применяют при тенезмах, геморрое.

Scopolaminum hydrobromicum. Скополамин бромистоводородный (А). 0,0005 (0,0015).

Rp. Sol. Scopolamini hydrobromici 0,05% 10,0
Sterilisetur!
DS. По 0,5 мл подкожно

Назначают как обезболивающее, снотворное.

Rp. Scopolamini hydrobromici 0,0005
Luminali 0,15
Sacchari albi 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1—2 порошка на прием

Применяют при бессоннице, психическом возбуждении.

Homatropinum hydrobromicum. Гоматропин бромистоводородный (А). 0,001 (0,003).

Rp. Homatropini hydrobromici 0,1
Aquaе destillatae 10,0
MDS. Глазные капли

Применяют для расширения зрачка с диагностическими целями при иритах.

Extractum Belladonnae siccum. Экстракт красавки сухой (содержит атропин, скополамин) (Б). 0,05 (0,15).

Rp. Extr. Belladonnae 0,015
Natrii bicarbonici 0,3
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке на прием

Применяют при остром гастрите.

Rp. Extr. Belladonnae 0,02
Papaverini hydrochlorici 0,03
Opnoponi 0,01
Sacchari albi 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 2 раза в день

Применяют при гастральгии, бронхальной астме, спазмах гладкой мускулатуры.

Rp. Extr. Belladonnae
Opnoponi $\bar{a}\bar{a}$ 0,02
Pyramidoni 0,3
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече при родовых болях однократно

Назначают в период раскрытия.

Rp. Extr. Belladonnae 0,015
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече в прямую кишку

Назначают при тенезмах, геморрое.

Tinctura Belladonnae. Настойка красавки (Б). 20 (60) капель.

Rp. T-гае Belladonnae 10,0
DS. По 7—10 капель 2—3 раза в день

Показания см. Атропин.

Rp. T-гае Belladonnae 5,0
T-гае Menthae piperitae 10,0
MDS. По 15 капель на прием

Применяют при поносах неинфекционного характера; другие показания см. Атропин.

Belloidum. Беллоид (Б). Выпускается в виде дражированных таблеток по 0,12 каждая, в состав которых входит алкалоид белладонны, эрготоксин и бутилэтилбарбитуровая кислота.

Rp. Tabulettae Belloidi N. 50

DS. Принимать по 1 таблетке 3—6 раз в день

Применяют при бронхиальной астме, вегетативной дистонии, гипертиреозе, чрезмерном потоотделении, аллергических состояниях.

Solutanum. Солутан (Б). Выпускается в виде капель во флаконах по 50 мл.

Состав: экстракта дурмана жидкого 0,8, экстракта красавки жидкого 0,5, экстракта примулы жидкого 1,0, экстракта толутанского бальзама жидкого 0,25, эфедрина хлористоводородного 0,87, йодистого натрия — 5,0, прокаина хлористого 0,2. Глицерин, винный спирт, дистиллированная вода до 50 мл.

Rp. Solutani 50,0

DS. По 10—30 капель 3 раза в день после еды

Применяют при астматических припадках до 60 капель на прием при бронхиальной астме, кишечных коликах.

Aëgonum. Аэрон (Б). 2 таблетки (4 таблетки).

Rp. Tabulettarum Aëgoni N. 10

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при морской и воздушной болезни, а профилактически принимают за 30 минут до отъезда.

Oleum Hyoscyami. Масло беленное.

Rp. Ol. Hyoscyami

Liquoris Ammonii caustici

Methylis salicylici \overline{aa} 30,0

M. f. linimentum

DS. Для втирания

Назначают при невралгии, ревматизме, артритях.

Tropacinum. Тропацин 0,03 (0,1).

Rp. Tropacini 0,01

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке 1—2 раза в день

Назначают при спастических парезах, паркинсонизме, язвенной болезни, бронхиальной астме.

Platyphyllum bitartaricum. Платифиллин виннокислый (битартрат) (Б). 0,01 (0,03).

Rp. Platyphyllini bitartarici 0,005
Sacchari albi 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Назначают при острых кишечных спазмах, холецистите, бронхиальной астме.

Rp. Sol. Platyphyllini bitartarici 0,2% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл под кожу 2 раза в день

Показания те же.

Benzacium. Бензацин (А). Разовая доза 0,002 (0,003) внутрь; 0,001 под кожу.

Rp. Benzacini 0,002
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Применяют при спастических колитах, холециститах, почечных и печеночных коликах, язвенной болезни.

Rp. Sol. Benzacini 0,1% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл под кожу

Показания те же.

Merpanitum. Мерпанит (Б). Выпускается в ампулах по 1 мл в 2% растворе.

Rp. Sol. Merpaniti 2% 1,0
D. t. d. N. 30 in ampullis
S. По 1 мл под кожу 2—3 раза в день

Применяют при язвенной болезни, бронхиальной астме, при приступах почечных, печеночных и кишечных коликов. При передозировке вводят под кожу 0,5—1 мл 0,1% раствора прозерина.

Metacinum. Метацин (А). Выпускается в таблетках по 0,002—0,003 и в ампулах по 1 мл 0,1% раствора.

Rp. Metacini 0,002
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при бронхиальной астме, для уменьшения салива-
ции и секреции бронхиальных желез.

Rp. Metacini 0,1% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 0,5—1 мл под кожу

Показания те же.

Perulsanum. Пепульсан (Б). Выпускается в таблетках по 0,05.

Rp. Perulsani 0,05
D. t. d. N. 25 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день

С получением эффекта дозу уменьшают до 2—1 таб-
летки в день.

Показан при язвенной болезни, хроническом гиперацидном га-
стрите при одновременном соблюдении режима питания. Противо-
показан при глаукоме, гипертрофии простаты.

Атропин и его аналоги действия противопоказаны при глауко-
ме и выраженных болезнях сердца.

3. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА Н-ХОЛИНОРЕАКТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ

а) Ганглиоблокирующие или ганглионарные средства

Tetamonum. Тетамон. Срок годности 2 года.

Rp. Sol. Tetamoni 10% 1,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. По 1—2 мл в мышцы ежедневно

Показан при облитерирующем эндартериите, язвенной болезни.
Во время введения препарата и некоторое время после—боль-
ной должен находиться в лежачем положении.

Hexonium. Гексоний (Б). По 0,1—0,25 внутрь.

Rp. Hexonii 0,1
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. По 1 таблетке на прием

Применяют при гипертонической болезни, энцефалопатии, язвенной болезни, эклампсии.

Rp. Sol. Hexonii 2% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводить по 1 мл внутримышечно 2 раза в сутки

Применяют для создания гипотонии при операциях, связанных с большими кровопотерями, при систематическом наблюдении врача.

**Benzohexonium. Бензогексоний (гексоний Б). Hexaben-
zatum. Гексабензат.** Выпускается в порошках, таблетках по 0,01; 0,1; 0,25 в ампулах 1—2 мл 2% водного раствора. Срок годности 3 года.

Rp. Benzohexonii 0,01
D. t. d. N. 30 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Показан при гипертонической болезни, язвенной болезни; после приема препарата рекомендуется находиться в постели 2—3 часа. Противопоказан при недостаточности функции сердца, печени, почек. При передозировке назначают адреналин, эфедрин.

Rp. Sol. Benzohexonii 2% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл в мышцы 1—3 раза в день
3—4 недели подряд

Показания те же. В хирургической практике для снижения артериального давления вводят в мышцы 2—3 мл.

Pentaminum. Пентамин (Б). По 20—100 мг в мышцу.

Rp. Sol. Pentamini 5% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводить по 0,4 мл в мышцы, увеличивая дозу до 2 мл

Применяют при гипертонической болезни, язвенной болезни, бронхиальной астме, эклампсии.

Hexamethonium. Гексаметон (Хлорид) (Б). Гексоний. Выпускается в виде драже, содержащих по 0,25 чистого препарата.

Rp. Dragée Hexamethonii N. 50

DS. Принимать по 1 драже 2—3—6 раз в день за час до еды

Назначают при гипертонической болезни, язвенной болезни желудка. Противопоказан при аритмии, коронарной недостаточности, гипотонии. При резком падении кровяного давления назначают эфедрин, адреналин.

Лечение гексаметоном рекомендуется проводить в условиях стационара.

Diochinum. Дийохин (Б). Выпускается в таблетках по 0,05—0,1 и 0,2.

Rp. Diochini 0,05

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке 3 раза в день через час после еды

Показан при гипертонической болезни в ранних ее стадиях, язвенной болезни, бронхиальной астме, при желчной и кишечных коликах, мочекаменной болезни. Курс лечения 4—5 недель.

После приема больной должен находиться в постели в течение 1½—2 часов.

Противопоказан лицам пожилого возраста, при выраженных заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Gangleronum. Ганглерон. Разовая доза 0,04—0,06. Суточная 0,12—0,18 на прием.

Для подкожных и внутримышечных инъекций назначают 1,5% по 2—4 мл раствора.

Rp. Sol. Gangleroni 1,5% 2,0

D. t. d. N. 15 in ampullis

S. Вводить под кожу по 1—2 мл ежедневно в течение 12—15 дней

Подкожные введения заменяются приемом внутрь. Назначают при стенокардии, коронарной недостаточности, ангиоспазмах.

Rp. Gangleroni 0,04

D. t. d. N. 20 in capsulis gelatinosis

S. По 1 капсуле 1—3 раза в день в течение 4—5 недель

Показания те же.

Pachycarpinum hydrojodicum. Пахикарпин йодгидрат (Б). 0,2 (0,6).

Rp. Pachycarpini hydrojodici 0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2 раза в день

Показан при облитерирующем эндартериите, миопатии, слабой родовой деятельности.

Rp. Sol. Pachycarpini hydrojodici 3% 5,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 2—5 мл в мышцу

Применяют как стимулятор родовой деятельности.

Напорфунит. Нанофин (Б). Выпускается в таблетках по 0,1 и в ампулах по 1 мл 2—5% раствора.

Rp. Nanophyni 0,1
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. Принимать по $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при гипертонической болезни в начальных стадиях в течение 2—3 недель, а также при экземе и нейродермитах.

Rp. Sol. Nanophyni 2% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Вводит по 1 мл под кожу 1—2 раза в день

Показания те же.

Ганглиоблокирующие, ганглионарные средства противопоказаны при гипотонии, коронарной недостаточности.

б) Курареподобные средства, миорелаксанты¹
Diplacinit. Диплацин (А).

Rp. Sol. Diplacini 2% 5,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводит медленно по 5 мл внутривенно в среднем 1,5—2 мг на 1 кг веса больного в смеси с тиопенталом натрия

При необходимости ослабить действие диплацина вводят в вену 0,5—1 мл 0,05% раствора прозерина.

¹ Подробности см. в соответствующих руководствах.

Применяют при интубационном наркозе, для расслабления скелетной мускулатуры с «управляемым дыханием».
Диплацин противопоказан при болезнях печени, почек.

Paramionum. Парамиион (А).

Rp. Sol. Paramioni 0,1% 20,0
D. Sterilisetur!
S. Вводить медленно по 3—5 мл внутривенно

Показания и противопоказания см. Диплацин.

Condelphinum. Кондельфин (А).

Rp. Condelphini 0,025
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Назначают при повышенном тоне мускулатуры, гиперкинезах.

Elatinum. Элатин (А).

Rp. Elatini 0,01
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1—2 таблетке 2—5 раз в день

Показан при повышенном тоне мышц, гиперкинезах.

Mellictinum. Мелликтин (А). Выпускается в таблетках по 0,02.

Rp. Mellictini 0,02
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 1 раз в день за час до еды; далее количество приемов постепенно увеличивается до 5 в день

Показан при болезни Паркинсона, постэнцефалитическом паркинсонизме, арахноэнцефалите и спинальном арахноидите. При передозировке вводят в вену 0,5—1 мл 0,05% раствора прозерина. Противопоказан при миастении.

Delseminum. Дельсемин (А). Срок годности 1 год. Выпускается в виде раствора уксуснокислого дельсемина в ампулах по 2—5 мл.

Rp. Sol. Delsemini acetici 5% 2,0
cum Ephedrini hydrochlorici 0,002
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Ввести 2 мл в 10 мл стерильного физиологического раствора внутривенно

Сначала вводят $\frac{1}{5}$ дозы, а спустя 3—4 минуты, при отсутствии осложнений вводят всю дозу из расчета 0,5—2 мг на 1 кг. От этой дозы наступает расслабление скелетной мускулатуры; при 5—6 мг на 1 кг выключается самостоятельное дыхание. При передозировке вводят 1 мл 0,05% раствора прозерина вместе с 1 мл 0,1% раствора атропина.

Применяется при операциях в области сердца и легких и при интратрахеальном наркозе. Действие наступает вскоре и длится 15—40 минут.

При декомпенсации сердца, болезнях печени, почек и миастении— применение дельсемина не рекомендуется.

Ditilinum. Дитилин (*Sigacitum*. Курацит) (А). Срок годности в ампулах 2 года.

Rp. Sol. Ditilini 1% 2,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить медленно по 1—1,5 мл внутривенно

Действует в течение 4—7 минут, поэтому применяют при кратковременных операциях—бронхо- и эзофагоскопии и других. Для удлинения эффекта (до 10—20 минут) вводят дополнительно 10—20 мл 1% раствора дитилина при искусственном дыхании.

Дитилин антагонистов не имеет, а поэтому при применении его нужно соблюдать осторожность.

4. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА АДРЕНОРЕАКТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ

а) Адреналин и адреномиметические средства

Sol. Adrenalini hydrochlorici. Адреналин хлористоводородный (Б). 0,1% 1 мл под кожу.

Rp. Sol. Adrenalini hydrochlorici 0,1% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Ввести внутривенно 0,2 мл в 10 мл стерильного физиологического раствора

Показан при остром упадке сердечной деятельности.

Rp. Sol. Adrenalini hydrochlorici 0,1% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 1 мл под кожу

Показан при бронхиальной астме, гипогликемии, сывороточной болезни, при нитритидных кризах, связанных с введением новарсенола.

Rp. Sol. Adrenalini hydrochlorici 0,1% 0,5
Sol. Natrii chlorati isotonicae sterilisat
tae 200,0

MDS. Вводить внутривенно медленно

Применяют при кровопотерях, резком снижении кровяного давл
ения.

Rp. Sol. Adrenalini hydrochlorici 1 : 1000 30,0
DS. Для поликлиники. Наружное

Использует для приготовления слабых растворов в отоларинго
логии и гинекологической практике.

Mesatonum. Мезатон (Sympatolum. Симпатол) (Б).
0,01—0,25.

Rp. Mesatoni 0,01
Sacchari 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку на прием

Показан при пониженном кровяном давлении.

Rp. Sol. Mesatoni 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 0,5—1 мл под кожу

Показания те же.

Rp. Sol. Mesatoni 0,25% 10,0
DS. Для смазывания слизистой оболочки
носа

Показан при насморке.

**Ephedrinum hydrochloricum. Эфедрин хлористоводо
родный (Б). 0,05 (0,15).**

Rp. Sol. Ephedrini hydrochlorici 5% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл под кожу

Применяют при упадке сердечной деятельности, шоке, бронхи
альной астме.

Rp. Ephedrini hydrochlorici 0,025—(0,05)
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при бронхиальной астме, гипотонии.

Rp. Ephedrini hydrochlorici 0,015 (0,025)
Euphyllini 0,02
Barbamyli 0,08
Promedoli 0,015 (или Dionini 0,015)
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t: d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяют при бронхиальной астме.

Rp. Sol. Ephedrini hydrochlorici 3% 10,0
DS. По 5 капель 2 раза в день в каждую
половину носа

Применяют при насморке.

Rp. Sol. Ephedrini hydrochlorici 2% 10,0
Sol. Adrenalini hydrochlorici 1 : 1000 gtt. X
MDS. По 5 капель в каждую половину
носа 2—3 раза в день

Показания те же.

Theophedrinum. Теофедрин. Выпускается в таблетках. Таблетки содержат 0,05 теофиллина, 0,05 теобромина, 0,05 кофеина, 0,2 пирамидона, 0,2 фенацетина, 0,02 хлоргидрата эфедрина, 0,02 люминала, 0,02 листьев красавки в порошке, 0,0002 хлоргидрата лобелина или 0,0001 цитизина.

Rp. Tabulettarum Theophedrini N. 10
DS. По 1—2 таблетки в день

Показан для профилактики и лечения бронхиальной астмы.

Antasthman. Антастман. Выпускается в таблетках, содержащих: теофиллина и экстракта красавки по 0,1, кофеина 0,05, пирамидона и фенацетина по 0,2, эфедрина и люминала по 0,02 и порошка из листьев лобелина 0,09. Высшая доза для взрослых 2 таблетки на прием.

Применяется при бронхиальной астме в лечебных и профилактических целях по $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 1—2 раза в день.

Isadrinum. Изадрин (Б). Выпускается в виде 0,5% раствора во флаконах по 10—25 мл.

Rp. Sol. Isadrin 0,5% 10,0

DS. Для ингаляции по 0,5—1 мл 2—3 раза в день

Применяется для купирования приступов бронхиальной астмы и при эмфизематозных бронхитах.

Euspiranum. Эуспиран близок к изадрину, гомолог адреналина. Выпускается в таблетках по 0,02 и в растворе по 0,01 в 1 мл.

Rp. Sol. Euspirani 1% 25,0

DS. Наливают в ингалятор 0,5—1 мл и распыленный раствор вдыхают. После каждого вдоха больной на мгновение должен задержать дыхание

Показан при приступах бронхиальной астмы.

Rp. Euspirani 0,02

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. Принимать (положить на язык) по $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2—3 раза в день — слюну проглатывать не рекомендуется

Показания те же.

Адреномиметические средства противопоказаны при гипертонической болезни, выраженном атеросклерозе, тиреотоксикозе, сахарной болезни, беременности.

б) Аденолитические средства

Ergotoxinum. Эрготоксин (Б). Выпускается в ампулах по 1 мл. Сохраняется в прохладном темном месте.

Rp. Sol. Ergotoxini 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 0,3—0,5 до 1 мл под кожу или в мышцы в сутки; через день или один раз в неделю

Показан при гипертонической болезни, стенокардии, облитерирующем артериосклерозе.

Dihydroergotaminum. Дигидроэрготамин (Б). Выпускается в ампулах по 1 мл 0,1% раствора.

Rp. Sol. Dihydroergotamini 0,1% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить подкожно или в мышцу по 0,5—1 мл

Показан при гипертонической болезни, периферических спазмах сосудов. Противопоказан при болезнях печени и почек.

Rp. Sol. Dihydroergotamini 0,2% 10,0
DS. По 10—20 капель на прием 1—2 раза
в день

Показания и противопоказания те же.

D. G. Ergotoxinum (Dihydroergotoxinum). Д. Г. Эрготоксин (дигидроэрготоксин) (Б). Выпускается в виде капель для приема внутрь. В 1 мл 0,001 метансульфонат дигидроэрготоксина.

Rp. Sol. D. G. Ergotoxini 10,0
DS. Принимать по 5 капель 3 раза в день; количество капель постепенно увеличивают до 10—20—30 капель на прием

Показан при гипертонической болезни, стенокардии. Применение проводится под наблюдением врача.

Redergam. Редергам. Выпускается в виде раствора для приема внутрь с содержанием дигидрированных алкалоидов спорыньи (эргокристина, эргокорнина и эргокриптина) в 1 мл 0,001; в ампулах по 1 мл с содержанием 0,0003 алкалоидов.

Rp. Redergam. 25,0 (50,0)
DS. Принимать по 10 капель 3 раза в день. Дозу увеличивают на 2—3 капли на прием до 20—40 капель

Показан при гипертонической болезни в ранних ее стадиях, стенокардии, эндартериитах, болезни Рейно. Противопоказан при гипотонии, выраженных болезнях сердца, болезнях почек.

Apressinum. Апрессин (Б). По 0,01—0,025 на прием, до 0,2—0,4 в сутки.

Rp. Apressini 0,01
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день после еды

Применяют при гипертонической болезни.

III. ПРОПИСИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ. МАТОЧНЫЕ, КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

I. СЕРДЕЧНЫЕ ГЛЮКОЗИДЫ. НАПЕРСТЯНКА

Pulvis folii Digitalis. Порошок из листьев наперстян-
ки (Б). 0,1 (0,5).

Rp. *Pulveris folii Digitalis* 0,05 (0,1)

Sacchari albi 0,3

M. f. pulvis

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Применяется наперстянка при декомпенсации сердца (при строго постельном режиме), при ослаблении сердечной деятельности, при тяжелых инфекциях—пневмония, тиф; при неврозах сердца, аритмии.

Действие наперстянки наступает через 12—24 часа от начала ее применения; поэтому в случае необходимости в первые сутки больной получает одновременно камфару, адонизид.

Под влиянием наперстянки несколько повышается кровяное давление, если оно до этого было понижено; наступает урежение ритма, усиление сердечной деятельности, увеличение диуреза. В случае передозировки ускоряется ритм сердца, развивается экстрасистолия, повышается кровяное давление, развивается угрожающее состояние, при котором некоторую пользу может дать камфара. Учитывая это, чаще препарат назначают сроком на 7—10 дней, тем более что действие наперстянки продолжается и после ее отмены еще в течение 1—2 недель—за счет задержки—кумуляции ее (глюкозида дигитоксина) в организме.

Относительные противопоказания к применению наперстянки: компенсированные пороки сердца, повышенное артериальное кровяное давление, тяжелый артериосклероз.

Rp. Pulv. folii Digitalis 0,05 (0,1)
Diuretini 0,5
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день

Показания те же.

Rp. Pulv. folii Digitalis 0,05
Chinini hydrochlorici 0,1
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12 in capsulis gelatinosis
S. По 1 капсуле 3 раза в день

Назначают при декомпенсации сердца, аритмии.

Rp. Pulv. folii Digitalis 0,05 (0,1)
Olei Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 12
S. По 1 свече в прямую кишку

Назначают при декомпенсации сердца.

Rp. Inf. folii Digitalis 0,5 (1,0) : 180,0
DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Показания те же.

Rp. Inf. folii Digitalis 0,6 : 180,0
Diuretini 6,0
MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в
день
Показания те же.

Gitalenum. Гитален (Б). 25 (50) капель.

Rp. Gitaleni 15,0
DS. По 15 капель на прием

Применяют при ослаблении сердечной деятельности.

Digalen-нео. Дигален-нео (Б). 20 (60) капель.

Rp. Digalen-нео 15,0
DS. По 15 капель на прием

Применяют при ослаблении сердечной деятельности, декомпен-

Rp. Digalen-neo 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. По 1 мл под кожу 1 раз в день

Показания те же.

Digitoxinum. Дигитоксин (Б) назначается внутрь по 0,0001—0,0002 с уменьшением дозы в последующие дни.

Rp. Digitoxini 0,0001

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Назначается при сердечно-сосудистой недостаточности II и III степени и в тех случаях, когда показано применение препаратов наперстянки. Обладает кумулятивным свойством.

Gitoxinum. Гитоксин (Б) назначается внутрь по 0,0003—0,0004 в сутки с уменьшением дозы в последующие дни до 0,0002—0,0001.

Rp. Gitoxini 0,0002

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1/2 таблетки 2—3 раза в день

Назначается при сердечно-сосудистой недостаточности II и III степени. Длительность приема определяется индивидуально. Препарат обладает кумулятивным действием.

Digicilenum. Дигицилен (Б). Выпускается в ампулах по 1 мл.

Rp. Digicileni 1,0

D. t. d. N. 12 in ampullis

S. По 0,5—2 мл под кожу 1 раз в день в течение 7—10 дней

Назначается при сердечно-сосудистой недостаточности II и III степени наряду с препаратами наперстянки.

Препарат кумулируется в организме.

Isolanidum. Изоланид (Б). Препарат наперстянки шерстистой. Выпускается в таблетках по 0,25 мг глюкозида и в ампулах по 1—2 мл 0,02% и 0,1% раствора и во флаконах по 10 мл. Срок годности 2 года.

Rp. Sol. Isolanidi 0,02% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить в мышцы по 1—2 мл ежедневно

Применяют при сердечной недостаточности, мерцании (фибрилляция) предсердий пароксизмальной тахикардии.

Carditoxinum. Кардитоксин (Б). Глюкозид наперстянки пурпурной. Выпускается в виде драже, содержащих по 0,1 мг препарата. Срок годности 2 года.

Rp. Carditoxini 0,0001

D. t. d. N. 40 in dragée

S. Принимать по 1 драже 2—3—5 раз в день

С наступлением эффекта для поддержания терапевтического действия достаточно примерно 1—2 драже в сутки.

Применяют при декомпенсации сердечной деятельности, пароксизмальной тахикардии, сопровождающейся аритмией. Противопоказан в свежих случаях инфаркта миокарда, при блокаде предсердно-желудочковой передачи. Препарат сильно кумулируется в организме.

Digipurenum. Дигипурен (Б).

Rp. Digipureni 15,0

DS. По 15 капель на прием

Применяют при сердечной слабости.

Digitasidum. Дигитазид (Б). Выпускается в ампулах.

Rp. Digitasidi 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить внутривенно медленно по 0,5—1 мл в 10 мл 20% раствора глюкозы

Назначают при расстройствах сердечной деятельности.

Lantosidum. Лантозид (Б).

Rp. Lantosidi 15,0

DS. По 10—15 капель 2—3 раза в день

Назначают при сердечной недостаточности.

Cordigitum. Кордигит (Б).

Rp. Tabulettarum Cordigiti N. 10

DS. По 1/2—1 таблетке на прием

Назначают при ослаблении сердечной деятельности.

Dilansidum. Диланизид (Б).

Rp. Dilansidi 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить внутривенно медленно по 0,2—0,5—1 мл в 10 мл 20% раствора глюкозы

Назначают при сердечной слабости.

Herba Adonidis vernalis. Горицвет, трава черногорки (Б) — 0,8 (10,0).

Rp. Inf. herbae Adonidis vernalis 5,0 : 180,0

DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

Назначают при субкомпенсированных пороках сердца, аритмии, при декомпенсации сердца, см. Наперстянка. Влияние на сердце горицвета наступает через 6—8 часов и в основном сходно с действием наперстянки. Кроме того, отмечается ее успокаивающее действие на центральную нервную систему. Препарат не кумулируется, в отдельных случаях может раздражать желудочно-кишечный тракт.

Rp. Inf. herbae Adonidis vernalis 6,0 : 180,0

Diuretini 6,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Показания те же.

Rp. Inf. herbae Adonidis vernalis 6,0 : 180,0

Theophyllini 2,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Применяют при декомпенсации сердца.

Rp. Inf. herbae Adonidis vernalis 6,0 : 180,0

Natrii bromati 4,0 (6,0)

Codeini phosphorici 0,2

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Применяют при неврастении, сердечной слабости. Микстура В. М. Бехтерева.

Rp. Herbae Adonidis vernalis 8,0

Folii Menthae piperitae 1,0

M. f. species

D. t. d. N. 3 in sacculis chartaceis

S. Содержимое пакета залить стаканом кипяченой охлажденной воды; поставить на 15 минут на кипящий чайник и по охлаждении процедить; принимать по столовой ложке 3—4 раза в день

Adonisidum. Адонизид (Б). 30 (60) капель внутрь,
1 (2) мл под кожу.

Rp. Adonisi 15,0
DS. По 15 капель 2 раза в день

Показан при ослаблении сердечной деятельности.

Rp. Adonisi 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 1 мл под кожу или 0,5 мл в 10 мл
20% раствора глюкозы внутривенно

Показания те же.

Rp. Adonisi 6,0 (8,0)
Natrii bromati 2,0 (4,0—6,0)
Codeini phosphorici 0,2
Aquae destillatae 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Показан при неврозах, ослаблении сердечной деятельности.

Strophanthinum. Строфантин (А). От 0,00025 до
0,0005 в вену.

Rp. Sol. Strophanthini 0,05% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Ввести внутривенно медленно 0,2 мл
в 10 мл стерильного физиологического
раствора

Показан при острой сердечной недостаточности.

Rp. Sol. Glucosi sterilisatae 10% 10,0
Adde aseptice t-rae Strophanthi gtt. II (III)
MDS. Ввести внутривенно медленно

Показания те же.

Строфантин не следует назначать вслед за приемом
наперстянки, а только спустя 3—4 дня.

Tinctura Strophanti. Настойка строфанта (А), 10
(20) капель.

Rp. T-rae Strophanthi 5,0
DS. По 5—7 капель на прием 2—3 раза в
день

Применяют при сердечной слабости.

Rp. T-rae Strophanthi 5,0
T-rae Convallariae majalis
T-rae Valerianae \overline{aa} 10,0
MDS. По 25 капель на прием

Показания те же.

Rp. T-rae Strophanthi
T-rae Nucis vomicae \overline{aa} 5,0
MDS. По 10 капель на прием

Показания те же.

Tinctura Convallariae majalis. Настойка ландыша (Б). 30 (90) капель.

Rp. T-rae Convallariae majalis 20,0
DS. По 20 капель на прием

Применяют при неврозах сердца.

Rp. T-rae Convallariae majalis
T-rae Valerianae \overline{aa} 7,5
MDS. По 20 капель на прием

Применяют при неврозах сердца и как общеуспокаивающее.

Rp. T-rae Convallariae majalis
T-rae Valerianae simplicis
Adonisidi \overline{aa} 10,0
MDS. По 20 капель на прием

Применяют при сердечной слабости.

Rp. T-rae Convallariae majalis
T-rae Valerianae \overline{aa} 10,0
T-rae Belladonnae 5,0
Mentholi 0,2
MDS. По 15 капель на прием

Применяют при стенокардии, брадикардии. Капли В. Ф. Зеленина.

Rp. T-rae Convallariae majalis
T-rae Valerianae \overline{aa} 10,0
T-rae Belladonnae 5,0
Nitroglycerini soluti 2,0
Mentholi 0,2
MDS. По 15—20 капель 3 раза в день

Применяют при стенокардии.

Extractum Convallariae majalis siccum. Экстракт ландыша сухой.

Rp. Extr. Convallariae majalis sicci 0,1
D. t. d. N. 15 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при неврозах сердца.

Convallatoxinum. Конваллатоксин (А).

Rp. Sol. Convallatoxini 0,03% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Вводить внутривенно медленно по 0,5 мл в 10 мл 20% раствора глюкозы

Применяют при острой сердечной недостаточности.
Не применять одновременно с препаратами маперстянки.

Convassidum. Конвазид (Б). Под кожу 1 мл (2 мл);
в вену 0,5 (1 мл).

Rp. Convassidi 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 0,2 мл вводить медленно внутривенно в 10 мл физиологического раствора или 5% раствора глюкозы

Назначают при сердечной слабости.

Rp. Convassidi 15,0
DS. По 15 капель 3 раза в день

Показания те же.

Corglyconum. Коргликон (Б).

Rp. Sol. Corglyconi 0,06% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Вводить медленно внутривенно по 0,5 мл в 10—20 мл стерильного физиологического раствора или в 5% растворе глюкозы

Назначают при ослаблении сердечной деятельности.

Ergysidum. Эризид (Б), 0,5—1 мл в вену.

Rp. Erysiidi 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Ввести внутривенно, медленно 0,5 мл в 10 мл стерильного физиологического раствора 1 раз в день

Назначают при сердечной недостаточности.

Erysiminum. Эризимин (А). В ампулах по 1 мл раствора 1 : 3000.

Rp. Sol. Erysimini 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить внутривенно медленно по 0,5 мл раствора в 10 мл 20% раствора глюкозы

Назначают при сердечной слабости.

Cardiovalenum. Кардиовален (Б).

Состав: сок свежей травы желтушника серого, адонизид, жидкий экстракт боярышника, камфара и сок из свежих корней валерьяны; бромид натрия и хлорэтон.

Rp. Cardiovaleni 15,0

DS. Принимать по 15—20 капель 2—3 раза в день

Назначают при стенокардии и явлениях сердечной недостаточности.

Сутагинум. Цимарин (А). 0,05% (1,5) мл в вену в сутки.

Rp. Sol. Sutaagini 0,05% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить внутривенно медленно по 0,5 мл в 10 мл 20% раствора глюкозы

Назначают при острой недостаточности кровообращения.

Kendosidum. Кендозид (А). По 1 мл в ампулах.

Rp. Kendosidi 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить внутривенно медленно по 0,5 мл в 10 мл 20% раствора глюкозы

Применяют при расстройствах сердечной деятельности.

Neriolinum. Нериолин (А).

Rp. Neriolini 0,0001
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Применяют при декомпенсации сердца, аритмии.

Rp. Sol. Neriolini spirituosae 0,02% 20,0
DS. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Показания те же.

Periplocinum. Периплоцин (А). 0,025% 0,5—1 мл в вену.

Rp. Sol. Periplocini 0,025% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Ввести внутривенно медленно 0,5 мл в 10 мл стерильного физиологического раствора

Применяют при ослаблении сердечной деятельности. Периплоцин не назначают после приема препаратов наперстянки.

Tinctura Periplocae. Настойка обвойника.

Rp. T-rae Periplocae 15,0
DS. По 8—10 капель 2—3 раза в день

Показания те же.

Pulvis bulbus Scillae. Порошок морского лука (Б). 0,3 (1,5).

Rp. Pulveris Scillae 0,06
Sacchari 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Применяют при сердечной слабости и как мочегонное.

Corelborinum. Корельборин (А).

Rp. Corelborini 0,0002
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при декомпенсации сердца.

Rp. Sol. Corelborini 0,025% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить внутривенно медленно по 0,5 мл в 10 мл 20% раствора глюкозы

Показания те же.

Полное действие на сердце человека препаратов: дигален-нео, гитален, адонизид, настойки строфанта, настойки майского ландыша, настойки обвойника, порошка морского лука—при приеме внутрь наступает примерно через 15—30 минут.

Лечение сердечными глюкозидами должно проводиться под строгим и систематическим врачебным наблюдением.

2. КАМФАРА, ВАЛЕРЬЯНА. ВАЛИДОЛ

Solutio Camphorae oleosa 20% in ampullis. Масло камфары 20% в ампулах или 20% раствор камфары в персиковом масле.

Rp. Sol. Camphorae oleosae 20% 1,0 (2,0)

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 1 мл под кожу через 2—3 часа

При введении камфары под кожу появляется чувство жжения, умеренная боль—рефлекторно-тонизирующее действие. Для ускорения общего действия на организм, которое наступает через 7—10 минут, слегка массируют место введения камфары. Камфару применяют как стимулятор всей деятельности центральной нервной системы; для усиления деятельности сердца за счет увеличения энергии сердечных сокращений. Одновременно усиливается и углубляется дыхание, расширяются коронарные сосуды; улучшается общее состояние больных. Особенно камфара показана: при сердечной слабости с нитевидным пульсом, поверхностном дыхании, при длительном наркозе, при отравлениях наркотиками и снотворными, при стенокардии, при интоксикациях, для предупреждения коллапса при инфекциях, пневмонии и как отхаркивающее и антисептическое средство. Не рекомендуют вводить камфару в отечные ткани—при декомпенсации сердца, а также повторно в одно и то же место во избежание образования инфильтратов, абсцессов.

Camphora trita. Растертая камфара.

Rp. Camphorae tritae 0,1 (0,2)

Sacchari 0,25

M. f. pulvis

D. t. d. N. 10 in charta cerata

S. По 1 порошку 3—4 раза в день (рефлекторно-тонизирующее).

Rp. Camphorae tritae 2,0
T-rae Valerianae aethereae 20,0
MDS. По 20 капель 2—3 раза в день

Принимать в горячей воде после еды, показания те же.
При смешении камфары с хлоралгидратом и ментолом образуется маслянистая жидкость.

Rp. Camphorae tritae
Chlorali hydrati
Mentholi $\bar{a}\bar{a}$ 2,0
MDS. На вату в дупло зуба

После кратковременного раздражения наступает притупление чувствительности, анестезия, девитализация нерва.

Oleum camphoratum ad usum externum. Масло камфарное для наружного применения; 10% раствор камфары в подсолнечном масле.

Rp. Ol. camphorati
Ol. Hyoscyami
Chloroformii $\bar{a}\bar{a}$ 30,0
M. f. linimentum
DS. Растирание

Назначают при ревматизме, невралгии.

Spiritus camphoratus. Спирт камфарный (состав: камфары 1 ч., спирта 7 ч. и воды 2 ч).

Rp. Spiritus camphorati 50,0
DS. Для растирания

Назначают при пролежнях.

Tinctura Valerianae. Валерьяновая настойка по 20—30 капель.

Tinctura Valerianae aetherea. Эфирно-валерьяновая настойка по 20—30 капель.

Rp. T-rae Valerianae 20,0
DS. По 20 капель на прием

Применяют при расстройствах сердечной деятельности, мигрени, неврозах, бессоннице.

Rp. T-rae Valerianae aethereae 20,0
DS. По 20 капель на прием

Применяют при ослаблении сердечной деятельности.

Rp. Inf. radicis Valerianae 6,0 (8,0) : 200,0
Natrii bromati 2,0 (4—6,0)
Codeini phosphorici 0,2

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Назначают как успокаивающее, при неврастении, неврозах.

Validolum. Валидол (25—30% раствор ментола в изо-валерьяново-ментиловом эфире), маслянистая летучая жидкость 5—10 капель на прием.

Rp. Validoli 5,0

DS. По 3—5 капель на кусочек сахара под язык

Назначают при стенокардии, неврозах, мигрени.

3. СОСУДОРАСШИРЯЮЩИЕ СРЕДСТВА

Amylium nitrosum. Амилнитрит (Б), летучая жидкость. По 5 (30) капель.

Rp. Amylii nitrosi 0,5

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Разломить ампулу в носовом платке и вдыхать (осторожно) во время приступа стенокардии

Rp. Amylii nitrosi 2,0

Spiritus vini 96° 6,0

MDS. По 3—5 капель на платок для вдыхания

Применяют при стенокардии, мигрени.

Nitroglycerinum solutum. Нитроглицерин (Б). 4 (10 капель), спиртовой раствор.

Rp. Nitroglycerini soluti 5,0

DS. По 2 капли на кусочек сахара или слизать с пробки 4—5 раз, каждый раз опрокидывая флакон

Применяют при angina pectoris.

Rp. Nitroglycerini soluti 1,0

T-rae Valerianae 10,0

MDS. По 15 капель на прием

Применяют при стенокардии, гипертонической болезни.

Rp. Nitroglycerini 0,0005
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке на прием (под язык)

Показания те же.

Natrium nitrosum (натрий азотистокислый). Нитрит натрия (Б). 0,3 (1,0).

Rp. Natrii nitrosi 2,0
Aquae destillatae 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Применяют при гипертонической болезни.

Rp. Sol. Natrii nitrosi 1% 50,0
Sterilisetur!
DS. Ввести 25 мл внутривенно

Назначают при отравлении цианидами.

Nitranolum. Нитранол (Praenitrona. Пренитрона) (Б). Выпускается в таблетках по 0,001—0,002.

Rp. Nitranoli 0,002
D. t. d. N. 40 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день после еды

Применяют для предупреждения приступов стенокардии. Противопоказан при глаукоме.

Natrium adenosintriphosphoricum. Динатриевая соль аденозинтрифосфорной кислоты.

Rp. Sol. Natrii adenosintriphosphorici 1% 1,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Применяют при инфаркте миокарда, стенокардии, мышечной дистрофии.

Acidum Adenosintriphosphoricum. Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).

Rp. Sol. Acidi Adenosintriphosphorici 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводить по 1 мл внутримышечно

Применяют при мышечной дистрофии, стенокардии, эндартеритах.

Acidum Adenilicum. Мышечная адениловая кислота.
МАР (МАП).

Rp. Ac. Adenilici 50,0

DS. Принимать по $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке
2—3 раза в день

Применение см. Аденозинтрифосфорная кислота.

Tirphenum. Тифен (Б). 0,03—0,1.

Rp. Tirpheni 0,03

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при стенокардии, гипертонической болезни I и II стадии, бронхиальной астме.

Angiotrophinum. Ангиотрофин. Применяется по 1—2 мл подкожно (аналог падутина). Срок годности 1 год.

Rp. Angiotrophini 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить под кожу по 1 мл 1—2 раза в день

Назначают при гипертонической болезни, эндартериите, коронарной недостаточности.

Argorphenum. Апрофен (Б). Выпускается в таблетках по 0,025 и в ампулах по 1 мл 1% раствора.

Rp. Argorpheni 0,025

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—4 раза в день после еды

Назначают при гипертонической болезни, стенокардии, эндартериите.

Diporphenum. Дипрофен (Б).

Rp. Diporpheni 0,025 (0,05)

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяется как спазмолитик при эндартериитах.

Dibazolium. Дибазол (Б). 0,005 (0,1—0,15).

Rp. Dibazoli 0,005

Sacchari 0,2

M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку 1 раз в день

Назначают при гипертонической болезни, стенокардии, полиневритах, полиомиелите.

Rp. Sol. Dibazoli 1% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл под кожу ежедневно

Показания те же.

Rp. Dibazoli 0,03
Luminali 0,1
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Применяют при гипертонической болезни, стенокардии.

Rp. Dibazoli 0,02
Barbamyli 0,1
Coffeini natrio-benzoici 0,05
Sacchari 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 15
S. Принимать по 1 порошку 2 раза в день
в течение 1—2 недель

Применяют при церебральном артериосклерозе.

**Spasmolytinum. Спазмолитин. (s. Diphacilum. Дифа-
цил).** По 0,1—0,25 на прием.

Rp. Spasmolytini 0,1
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Применяют при стенокардии, эндартериите, спастических коликах, почечных коликах, язвенной болезни.

**Extractum Crataegi fluidum. Жидкий экстракт боярыш-
ника.** По 20—30 капель.

Rp. Extr. Crataegi fluidi 30,0
DS. По 20 капель на прием

Применяют при ангионеврозах, аритмии.

Rp. T-rae Crataegi 20,0

DS. По 20 капель 3—4 раза в день

Показания те же.

Padutinum. Падутин получен из поджелудочной железы. Выпускается в виде драже (активностью 10 ЕД), а также в ампулах и во флаконах — для парентеральных введений.

Rp. Dragée Padutini N. 50

DS. По 1 драже 3 раза в день натошак в течение 6—10 дней, далее дозу уменьшают

Применяется как сосудорасширяющее при артериосклерозе, стенокардии, а также при климактерии, склеродермии.

Противопоказания: злокачественные новообразования, декомпенсация сердца и при повышенном внутричерепном давлении.

Khellinum. Келлин (Б). Выпускается в таблетках по 0,02.

Rp. Khellini 0,02

D. t. d. N. 25 in tabulettis

S. Принимать по 1—2 таблетки 2—3 раза в день после еды

Терапевтический эффект наблюдается спустя 5—7 дней от начала приема препарата при стенокардии—после предварительного приема нитроглицерина; при бронхиальной астме—после применения адреналина, эфедрина.

При значительном расстройстве сердечной деятельности келлин не назначают.

Myolum. Миоль. По 1—2 мл подкожно; 30—40 капель внутрь.

Rp. Myoli 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. По 1 мл под кожу ежедневно

Назначают при гипертонической болезни, стенокардии.

Rp. Myoli 50,0

DS. По 30 капель 3 раза в день

Показания те же.

Salsolinum hydrochloricum. Сальсолин хлористоводородный (Б). 0,1 (0,3).

Rp. Salsolini hydrochlorici 0,03
Sacchari 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день

Назначают при гипертонической болезни.

Rp. Salsolini hydrochlorici
Papaverini hydrochlorici
Luminali \overline{aa} 0,03
M. f. pulvis
D. t. d. N. 15
S. По 1 порошку 3 раза в день

Показания те же.

Tinctura Eucommiae. Настойка эвкоммии 15—30 капель на прием.

Rp. T-гае Eucommiae 25,0
DS. По 20 капель 2—3 раза в день

Применяют при гипертонической болезни.

Daucaginum. Даукарин (Б). Суммарный очищенный экстракт, получаемый из плодов моркови.

Rp. Daucagini 0,02
D. t. d. N. 50 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3—5 раз в день за полчаса до еды

Применяют при стенокардии, коронарной недостаточности; эффект наступает через 3—5 дней после начала приема препарата; лечение длится 2—4 недели.

Tinctura Scutellariae. Настойка шлемника байкальского.

Rp. T-гае Scutellariae 30,0
DS. По 20—30 капель 2—3 раза в день

Применяют при гипертонической болезни в ранних стадиях.

Tinctura Allii sativi. Настойка чеснока.

Rp. T-гае Allii sativi 15,0
DS. По 15—20 капель 3 раза в день перед едой

Назначают при атонии кишок, гипертонической болезни.

Herba Gnaphalii uliginosi. Трава сушеницы болотной.

Rp. Inf. herbae Gnaphalii uliginosi 30,0 : 200,0
DS. По 1 столовой ложке 3—5 раз в день
перед едой

Назначают при легких формах гипертонической болезни.

Rp. Extr. Gnaphalii uliginosi 50,0
DS. Для смазывания ран

Назначают при трудно заживающих ранах, ожогах.

Infusum Astragali pubiflori. Настой астрагала пуши-
стоцветкового.

Rp. Inf. Astragali pubiflorii 15,0 : 150,0
DS. По 1 столовой ложке 3—6 раз в день

Назначают при гипертонической болезни, стенокардии.

Omelenum. Омелен (Б). Выпускается в таблетках по
0,2 (густой экстракт из листьев белой омелы).

Rp. Omeleni 0,2
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Назначают при гипертонической болезни в ранних стадиях,
при стенокардии.

Extractum Magnoliae grandiflorae fluidi. Экстракт
магнолии крупноцветной жидкий. Выпускается во флако-
нах по 50 мл. Срок годности 1 год.

Rp. Extr. Magnoliae grandiflorae fluidi 50,0
DS. По 20—30 капель 3 раза в день

Показан при ранних стадиях гипертонической болезни.

4. ГИСТАМИН И ПРОТИВОГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА

Histaminum. Гистамин 0,1% 0,25—0,5 мл.

Rp. Sol. Histamini hydrochlorici 0,1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 0,5 мл в мышцы

Применяют для определения секреторной способности желу-
дочных желез.

Antihistaminum. Антигистамин (Б). Выпускается по
0,05 в драже.

Rp. Antihistamini 0,05

D. t. d. N. 30 in dragée

S. Принимать по 1 драже 2—3 раза в день

Применяют при крапивнице, лекарственных экзантемах, ангио-невротическом отеке, зудящих дерматозах, также при желтухе, сы-вороточной болезни, бронхиальной астме.

Dimedrolum. Димедрол (Б). 0,03—0,05 внутрь; 1% рас-твор по 1—2—3 мл в мышцы.

Rp. Dimedroli 0,05

Sacchari 0,25

M. f. pulvis

D. t. d. N. 10

S. По 1 порошку 2 раза в день

Применяют при крапивнице, сенной лихорадке, сывороточной болезни, зудящих дерматозах, паркинсонизме, лучевой болезни; ал-лергических осложнениях, вызванных пенициллином, стрептомици-ном; морской болезни, хореи, рвоте беременных.

Rp. Sol. Dimedroli 1% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Показания те же.

Rp. Dimedroli

Ephedrini hydrochlorici \overline{aa} 0,025

Sacchari 0,3

M. f. pulvis

D. t. d. N. 12 in capsulis gelatinosis

S. По 1 капсуле 2—3 раза в день

Применяют при бронхиальной астме.

Aethyzinum. Этизин (Б).

Rp. Aethyzini 0,025

D. t. d. N. 12 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применение см. Димедрол.

Rp. Sol. Aethyzini 0,5% 5,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить по 5 мл внутримышечно или внутривенно

Показания см. Димедрол.

Diprazinum. Дипразин (Б).

Rp. Diprazini 0,025

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Назначается для усиления действия наркотиков, снотворных средств, для снижения температуры тела, а также см. применение димедрола.

Rp. Sol. Diprazini 2,5% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. По 1 мл в мышцы

Показания те же.

Alphadrilum. Альфадрил (Б). Выпускается по 0,05 в драже.

Rp. Alphadrili 0,05

D. t. d. N. 30 in dragée

S. Принимать по 1 драже 2—3 раза в день

Применяют при крапивнице, зуде (также при желтухе, сопровождающейся зудом), сывороточной болезни, бронхиальной астме, псориазе, эритеме узловатой; противопоказан при хроническом нефрите.

Diazolinum. Диазолин (Б). Выпускается в порошке и в дражированных таблетках по 0,05.

Rp. Diazolini 0,05

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке 1—2 раза в день после еды

Применяют при крапивнице, сывороточной болезни, ангионевротическом отеке, сенной лихорадке, зуде, аллергических реакциях, связанных с применением антибиотиков.

Противопоказан при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Deparginum. Депаркин (Б).

Драже «Мите» по 0,05 г 50 штук.

Драже «Форте» по 0,25 г 20 штук.

Rp. Dragée Depargini N. 50

DS. В первый день принять 1 драже; на 2-й день — 2 драже, на 3-й день — 3 драже; в зависимости от переносимости дозы повышают на одно драже

до 10-го дня, когда суточная доза составляет 10 драже «Мите». Начиная с 11-го дня назначают драже «Форте», в среднем 2 раза в день по 1 драже

Применяют при болезни Паркинсона, моторных беспокойствах, торзионно-дистоническом синдроме. В анестезиологии — для потенцированной анестезии и для управляемой искусственной гипотермии. Гистамин и противогистаминные препараты применяют под строгим наблюдением врача.

5. Маточные, кровоостанавливающие средства

Secale cornutum. Спорынья, маточные рожки (Б).
1,0 (5,0).

Rp. Pulveris Secalis cornuti 0,5
D. t. d. N. 6 in charta cerata
S. По 1 порошку 2—3—4 раза в день

Применяют при атонии матки после родов, при сильных менструальных кровотечениях, при обильных кровотечениях в климактерический период, при фибромах, сопровождающихся кровотечениями. Запрещается назначать спорынью и др. маточные средства при родах в период изгнания плода, при остатках плаценты после родов, при беременности, злокачественных опухолях половых органов. При передозировке препаратов спорыньи наблюдаются повышенная возбудимость, учащение пульса, бледность, боли в конечностях.

Лечение—промывание желудка, солевые слабительные, крепкий свежесваренный чай, кофеин, камфара.

Rp. Inf. Secalis cornuti 6,0 : 180,0
Sirupi simplicis 20,0
MDS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Показания те же.

Extractum Secalis cornuti fluidum. Экстракт спорыньи жидкий (Б). По 25—50 капель.

Rp. Extr. Secalis cornuti fluidi 30,0
DS. По 20 капель 2—3 раза в день

Назначают при маточных кровотечениях.

Ergotinum. Эрготин (Б). 1 мл (3 мл) под кожу Extr. Secalis cornuti fluidum pro injectionibus. Экстракт спорыньи жидкий для инъекции.

Rp. Ergotini 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 1 мл под кожу

Назначают при послеродовых кровотечениях.

Ergotalum. Эрготал (Б). (В препарат входит сумма алкалоидов спорыньи).

Rp. Ergotali 0,001
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2—3 раза в день

Назначают при маточных кровотечениях.

Rp. Sol. Ergotali 0,5% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 0,5—1 мл под кожу ежедневно

Показания те же.

Aclimanum. Аклиман (Б). Выпускается в виде драже. Состав: радобел (алкалоиды красавки) 0,001, виннокислого эрготамина 0,002, фенобарбитала 0,01, бромисовала 0,05, теобромина 0,05.

Rp. Dragée Aclimani N. 30
DS. Принимать по 1 драже 2—3 раза в день

Применяют при климактерических расстройствах, дистонии.

Stypticinum. Стиптицин (Б). 0,1 (0,3).

Rp. Stypticini 0,05
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при обильных менструальных кровотечениях.

Rp. Sol. Stypticini 1% (2%) 50,0
DS. Для смачивания марлевых тампонов и закладывания их в полость носа

Применяют при носовых кровотечениях.

Pregnantolum. Прегнантол.

Rp. Pregnantoli 0,02
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день после еды

Назначают при атонии матки в течение родового акта, маточных кровотечениях после родов, при климактерии.

Rp. Sol. Pregnantoli 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Вводить по 1 мл под кожу или внутримышечно

Показания те же.

Extractum Bursae pastoris fluidum. Экстракт пастушьей сумки жидкий 30—40 капель.

Rp. Extr. Bursae pastoris 30,0
DS. По 30 капель на прием

Назначают при маточных кровотечениях.

Extractum Polygoni hydropiperis fluidum. Экстракт водяного перца жидкий, 30—40 капель на прием.

Rp. Extr. Polygoni hydropiperis fluidi 20,0
DS. По 30 капель 2—3 раза в день

Назначают при маточных кровотечениях.

Extractum Viburni opuli fluidum. Экстракт калины обыкновенной жидкий, 20—30 капель.

Rp. Extr. Viburni opuli fluidi 30,0
DS. По 20 капель на прием

Применяют при маточных кровотечениях.

Rp. Extr. Bursae pastoris sicci
Extr. Secalis cornuti aa 3,0
Pulv. rad. Liquiritiae q. s.
Ut f. pilulae N. 30
DS. По 1 пилюле 3 раза в день

Применяют при маточных кровотечениях.

Sphaerophysinum benzoicum. Сферофизин бензойнокислый (Б). 0,03 (0,09).

Rp. Sphaerophysini benzoici 0,03
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 15
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Применяют при маточных кровотечениях, гипертонической болезни.

Isoverinum. Изоверин. Выпускается в таблетках по 0,1 и в ампулах по 1 мл 2 и 5% раствор.

Rp. Isoverini 0,1
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Назначают для усиления сокращения матки в послеродовом периоде, а также при первичной и вторичной слабости родовой деятельности.

Rp. Sol. Isoverini 2% (5%) 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл в мышцы

Показания те же.

Tinctura Stachys betonicaeflora. Настойка чистеца буквоцветного.

Rp. T-гае Stachys betonicaeflorae 50,0
DS. По 1 чайной ложке 3 раза в день

Применяют при послеродовых и других маточных кровотечениях.

Spleninum. Спленин. Выпускается в ампулах по 1 мл. Срок годности 1 год.

Rp. Splenini 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 1 мл под кожу или в мышцы ежедневно в течение 6—10 дней

Применяют при токсикозе беременных I и II степени.

Aviculagenum. Авикулярен. Получают препарат из спорыша. Выпускается в порошке и таблетках по 0,5. Срок годности 2 года.

Rp. Aviculageni 0,5
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. Принимать по 1 таблетке 3—4 раза в день

Применяют при маточных послеродовых кровотечениях, при кровотечениях после аборта.

Lagochilus inebrians. Лагохилус опьяняющий. Цветы и листья растения лагохилуса содержат лагохолин, дубильные, смолистые, горькие вещества, эфирные масла,

витамины А, С, К и соли кальция. Употребляется в виде настоя и настойки как седативное и кровоостанавливающее средство.

Рр. Inf. *Lagochilus inebriansis* 5% (10%) 200,0
DS. По 1—2 столовые ложки 3—6 раз в день

Применяют при кровотечениях: травматических, маточных, геморроидальных, легочных, носовых; при гипертонической болезни I и II степени, при зудящих дерматозах.

IV. ПРОПИСИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ ОКОНЧАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ

I. МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Novocainum. Новокаин (Б). 0,2 под кожу.

Rp. Novocaini 1,0
Sol. Natrii chlorati 0,85% 200,0
M. Sterilisetur!
DS. Для инфильтрационной анестезии

Rp. Novocaini 0,5
Sol. Natrii chlorati 0,85% 200,0
M. Sterilisetur!
Sol. Adrenalini hydrochlorici 0,1% gtt. XX
DS. Для инфильтрационной анестезии

Rp. Novocaini 1,25
Natrii chlorati 3,0
Calcii chlorati 0,062
Kalii chlorati 0,038
Aquae bidestillatae 500,0
M. Sterilisetur!
Sol. Adrenalini hydrochlorici 0,1% gtt. V
(gtt. XX)
DS. Для инфильтрационной анестезии по
методу А. В. Вишневого

Rp. Sol. Novocaini 1% 50,0
Sterilisetur!
DS. Вводить по 10—20 мл медленно
внутриартериально

Применяют при эндартериитах; внутривенно—при стенокардии.

Rp. Novocaini 0,25
Sol. Natrii chlorati 0,85% 5,0
Sterilisetur!
MDS. Для спинномозговой анестезии

Rp. Novocaini 1,0 (2,0)
Sol. physiologicae 200,0
M. Sterilisetur!
DS. Для проводниковой анестезии

Rp. Sol. Novocaini 0,5% (1—2%) 2,0 (5,0)
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Для растворения пенициллина или стрептомицина

См. Пенициллин, Стрептомицин.

Novocain-amidum. Новокаин-амид (Б). По химическому строению близок к новокаину.

Выпускается в таблетках по 0,25 и в ампулах по 5 и 10 мл 10% раствора. Применяется внутрь, внутримышечно и внутривенно.

Rp. Novocain-amidi 0,25
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. Принять внутрь 1—2 таблетки (пробная доза); при отсутствии побочных явлений назначают 0,5—1,0 на прием, до 4,0 в сутки

Если в течение 72 часов эффекта нет, препарат отменяют.

Показания см. ниже.

Rp. Sol. Novocaini-amidi 10% 5,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Ввести 2—5 мл внутривенно, медленно. Лучше вводить капельным методом в растворе глюкозы.

Применяют при различных расстройствах сердечного ритма—пароксизмальной мерцательной аритмии, пароксизмальной тахикардии, экстрасистолии. При операциях на сердце, легких—для предупреждения расстройства ритма, коллапса. Противопоказан при блокаде сердца, резком кардиосклерозе.

Mesocainum. Мезокаин (Б). Максимальная разовая доза 2,0.

Применяют для инфильтрационной анестезии 0,25% раствор до 800 мл; 0,5% до 400 мл и 1% до 100 мл; для проводниковой анестезии: 1% раствор до 100 мл; 2% до 20 мл.

Rp. Mesocaine 1,0
Sol. Physiologicae sterilisatae 400,0
MDS. Для инфильтрационной анестезии.
Мезокаин по эффективности действия превосходит новокаин.

Dicainum. Дикаин (А). Под кожу 0,015 (0,03).

Rp. Sol. Dicaini 0,25% (0,5%) 5,0
DS. По 2 капли в оба глаза 3 раза в день

Применяют при болях.

Rp. Sol. Dicaini 2% (3%) 10,0
DS. Для смазывания слизистых оболочек

Применяют в оториноларингологии.

Rp. Sol. Dicaini 1% 5,0
DS. Положить на вате в дупло зуба

Sovcainum. Совкаин (А). 0,01 (0,01).

Rp. Sol. Sovcaini 1% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 0,25—0,5—0,7 мл, для спинномозговой анестезии

Cocainum hydrochloricum. Кокаин хлористоводородный (А). 0,03 (0,03).

Rp. Sol. Cocaini hydrochlorici 2% 10,0
DS. По 2 капли в больной глаз 2 раза в день

Применяют как обезболивающее.

Rp. Sol. Cocaini hydrochlorici 5% 15,0
Sol. Adrenalini hydrochlorici 0,1% gtt. V
MDS. Для анестезии носоглотки

Rp. Cocaini hydrochlorici 0,2
Antipyridini 0,3
Sol. Adrenalini hydrochlorici 1 : 1000 1,0
Aquaе destillatae 10,0
MDS. По 5 капель 2—3 раза в день в нос

Назначают при остром рините.

Rp. Cocaini hydrochlorici 0,25 (0,5)
Mentholi 0,1
Sol. Adrenalini hydrochlorici 1 : 1000 0,5
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
DS. Мазь для носа

Назначают при насморке.

Anaesthesinum. Анестезин (Б). 0,5 (1,5).

Rp. Anaesthesini 0,3
D. t. d. N. 6 in oblatiis
S. По 1 облатке 2 раза в день перед едой

Назначают при гастральгиях, рвоте.

Rp. Anaesthesini 5,0
Amyli Tritici 45,0
M. f. pulvis subtilissimus
DS. Присыпка

Назначают при крапивнице, при болезненных поражениях кожи.

Rp. Anaesthesini 2,5
Zinci oxydati
Talcii aa 10,0
M. f. pulvis subtilissimus
DS. Присыпка

Назначают при зудящих дерматозах.

Rp. Anaesthesini
Zinci oxydati
Glycerini aa 10,0
Aquae Plumbi ad 100,0
MDS. Для смачивания кожи, перед
употреблением взбалтывать

Назначают при остром воспалении кожи.

Rp. Anaesthesini 0,2
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 10
S. По одной свече в прямую кишку

Назначают при болях, тенезмах, геморрое.

Rp. Anaesthesini 0,5
Mentholi 0,5
Lanolini ad 5,0
M. f. unguentum
DS. Мазь

Намазывать на пораженный участок кожи при зуде.

Rp. Anaesthesini
Dermatoli \overline{aa} 5,0
Vasellini ad 50,0
M. f. unguentum
DS. Мазь

Смазывать пораженный участок кожи при ожогах.

2. ВЯЖУЩИЕ ОБВОЛАКИВАЮЩИЕ, АДСОРБИРУЮЩИЕ И РАЗДРАЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА. ГОРЕЧИ

Tanninum s. Acidum tannicum. Танин. Дубильная кислота.

Rp. Sol. Acidi tannici 0,5% 500,0
DS. Для промывания желудка

Назначают при отравлении солями алкалоидов и тяжелых металлов.

Rp. Sol. Tannini 5% 200,0
DS. Для смазывания кожи

Назначают при ожогах II степени.

Rp. Tannini 2,0
Glycerini 20,0
MDS. Для смазывания слизистой рта

Назначают при катарах слизистой оболочки рта, зева, гортани.

Rp. Tannini 2,0
T-rae jodi 1,0
Glycerini 25,0
MDS. Для смазывания десен

Применяют при цинге.

Rp. Sol. Acidi tannici 2% 10,0
DS. По 2 капли в больной глаз 3 раза в день

Применяют при остром конъюнктивите.

Tannalbinum. Танальбин (0,5—2,0).

Rp. Tannalbinini 0,25 (0,5)

D. t. d. N. 6

S. По 1 порошку 2—4 раза в день (закрепляющее)

Rp. Tannalbinini 0,5

Extr. Opii sicci 0,015

M. f. pulvis

D. t. d. N. 6

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Показан при поносах неинфекционного характера.

Cortex Quercus. Кора дуба.

Rp. Decocti corticis Quercus 20,0 : 200,0

DS. Для полоскания рта

Показан при стоматитах.

Rp. Decocti corticis Quercus 20,0 : 200,0

Aluminis 3,0

Glycerini 10,0

MDS. Для полоскания рта

Показан при стоматитах и для смачивания кожи при ожогах.

Rp. Decocti corticis Quercus 40,0 : 200,0

D. Sterilisetur!

S. Смачивать кожу повторно

Применяют при ожогах II степени.

Rhizoma Tormentillae. Корневище лапчатки (дубровка).

Rp. Decocti rad. Tormentillae 20,0 : 200,0

DS. Для полоскания рта

Rp. T-rae Tormentillae 30,0

DS. Для смазывания десен

Применяют при стоматитах.

Rhizoma Bistortae. Корневище змеевика.

Rp. Extr. Bistortae fluidi 30,0

DS. Для смазывания десен

Применяют при стоматитах.

Fructus Myrtilli. Черника сушеная (плоды).

Rp. Fructus Myrtilli 20,0 (50,0)

DS. Для приготовления киселя

Применяют при поносах как вяжущее.

Herba Hypericici. Зверобой — трава.

Rp. Inf. herbae Hypericici 10,0 : 200,0

DS. По 1 столовой ложке 3—5 раз в день при поносах, для полосканий; при стоматитах как вяжущее

Rp. T-gae Hypericici 30,0

DS. Для смазывания десен

Применяют при стоматитах.

Rhizoma et radix Sanguisorbae. Корневище и корень кровохлебки.

Rp. Decocti rad. Sanguisorbae 15,0 : 200,0

DS. По 1 столовой ложке 5—6 раз в день

Применяют при поносах как вяжущее: для полоскания при воспалениях слизистой рта.

Rp. Extr. fluidi Sanguisorbae 40,0

DS. По 40 капель 4—5 раз в день

Применяют при поносах как вяжущее и для смазывания десен при стоматитах.

Flores Chamomille. Цветы ромашки.

Rp. Inf. flores Chamomillae 20,0 : 200,0

DS. По 1—2 столовые ложки 4 раза в день

Применяют при метеоризме, поносах.

Rp. Flores Chamomillae 50,0

DS. а) По 1 столовой ложке на стакан горячей воды (для клизмы).

б) Настоем из 100,0—200,0 сухих цветов ромашки на 500,0 крутого кипятка моют голову для придания волосам цвета блондинов

Folium Salviae. Листья шалфея.

Rp. Inf. folii Salviae 20,0 : 200,0

DS. Для полоскания (вяжущее, антисептическое)

Bacca Pruni racemosaе. Плоды черемухи обыкновенной.

Rp. Baccae Pruni racemosaе 100,0

DS. Заваривать, как чай, по 1 столовой ложке на стакан кипящей воды. После охлаждения принимать по $\frac{1}{2}$ стакана 2—3 раза в день

Применяют при поносах как вяжущее.

Amylum Tritici (пшеничный крахмал), **Amylum Solani** (из картофеля), **Amylum Maydis** (из манса, кукурузы), **Amylum Oryzae** (из риса). Присыпка.

Rp. Mucilaginis Amyli 100,0

DS. Для клизмы

Добавлять слизь к лекарствам, обладающим раздражающим действием; см. ниже.

Chloralum hydratum, Paraldehydum и др.

Semen Lini. Mucilago semen Lini. Слизь из семян льна.

Rp. Mucilaginis seminis Lini 50,0

DS. На 1 прием

Назначают как обволакивающее, замедляющее всасывание лекарств.

Tuber Salep. Клубни ятрышника (салеп).

Rp. Mucilaginis Salep 50,0

DS. На 1 прием

Применяют как замедляющее всасывание лекарств, обволакивающее.

Gummi-arabicum. Аравийская камедь.

Rp. Mucilaginis Gummi-arabici 50,0

DS. На 1 прием (обволакивающее)

Carbo animalis. Животный уголь.

Carbo Ligni pulveratus. Порошок древесного угля.

Carbolenum. Активированный уголь.

Rp. Carboleni 0,5
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. По 1 таблетке 5—6 раз в день

Назначают при отравлениях, метеоризме.

Rp. Carbonis animalis 20,0
DS. Принять в $\frac{1}{2}$ стакана воды

Показания те же.

Rp. Carboleni 50,0 (100,0)
DS. По 1 чайной ложке на $\frac{1}{2}$ стакана воды 3—6 раз в день

Назначают при отравлении алкалоидами.

Talcum. Тальк, силикат магния.

Rp. Talci
Amyli Tritici \overline{aa} 15,0
M. f. pulvis subtilissimus
DS. Детская присыпка

Ammonium caustitium solutum s. Liquor Ammonii caustici. Нашатырный спирт.

Rp. Ammonii caustici soluti 25,0
DS. 1) Для вдыханий или растираний
2) Смочить марлевые салфетки нашатырным спиртом, разведенным в воде 1 : 5 и наложить на кожу.
Назначают при укусах насекомыми и пчел — после удаления жала

Назначают при обморочном состоянии.

Rp. Ammonii caustici soluti 10,0
Glycerini
Spiritus vini
Aquaе destillatae \overline{aa} 25,0
MDS. Обмывание

Назначают при сухости, трещинах кожи рук.

Rp. Ammonii caustici soluti 200,0
DS. По 25 мл на 5 л теплой кипяченой
воды

Применяют для мытья рук перед операцией. Метод С. И. Спасокукоцкого и И. Г. Кочергина.

Linimentum ammoniatum s. Linimentum volatile. Лету-
чая мазь.

Rp. Ammonii caustici soluti 25,0
Ol. Helianthi
M. f. linimentum volatile
DS. Натирание

Назначают при миозитах, ревматизме, невралгии.

Rp. Linimenti volatililis 100,0
DS. Натирание

Назначают при артритах, невралгии.

Oleum Terebinthine rectificatum. Масло терпентинное
очищенное. Скипидар очищенный.

Rp. Ol. Terebinthinae 50,0
DS. По 15 капель на стакан горячей воды
для ингаляции

Rp. Ol. Terebinthinae
Axungiae porcinae \overline{aa} 15,0
M. f. unguentum
DS. Скипидарная мазь. Для натирания
(отвлекающее)

Rp. Ol. Terebinthinae
Chloroformii \overline{aa} 10,0
Linimenti volatililis ad 60,0
M. f. linimentum
DS. Растирание

Применяют при невралгиях, миозитах, ревматизме.

Pulvis Spongilla. Порошок бодяги.

Rp. Pulv. Spongillae 30,0
Linimenti volatililis 100,0
Ol. Camphorati
Ol. Terebinthinae \overline{aa} 25,0
MDS. Растирание

Перед употреблением встряхивать. Втирать в кожу до появления красноты, с последующим теплым укутыванием и постельным режимом.

Применяют как надежное средство при хроническом ревматизме, артритах, полнартритах, радикулитах, невритах и невралгиях, полиневритах, люмбаго, ишиасе.

Rp. Pulv. Spongillae 30,0

DS. Втирать в кожу $\frac{1}{2}$ чайной ложки порошка бодяги, размешанной в столовой ложке растительного масла

Показания те же.

Ol. Menthae piperitae. Масло перечной мяты.

Rp. Ol. Menthae piperitae 3,0

Spiritus vini 20,0

MDS. По 20 капель на стакан воды для полоскания рта.

Применяют как освежающее, антисептическое.

Tinctura Menthae piperitae. Настойка мятная. Мятные капли.

Rp. T-гае Menthae piperitae 20,0

DS. По 10—20 капель 3—4 раза в день.

Применяют при рвоте, гастральгии, стенокардии.

Aqua Menthae piperitae. Мятная вода. **Ol. Menthae piperitae.** Применяется как соггигенс.

Rp. Aquae Menthae piperitae 200,0

DS. По 1 столовой ложке на прием 5—10 раз в день

Применяют при рвоте беременных, а также добавляют к лекарствам, имеющим неприятный вкус.

Mentholum. Ментол.

Rp. Mentholi 0,5

Spiritus vini 90° 10,0

MDS. По 2—3 капли на сахар, на хлеб — под язык — повторно.

Применяют при стенокардии.

Rp. Mentholi 0,1
Ol. Vaselini 10,0
MDS. По 3—5 капель в каждую половину
носа (при сикозе)

Rp. Mentholi 1,0
T-rae Eucalypti
Spiritus vini rectificati \overline{aa} 10,0
MDS. По 10 капель на $\frac{1}{4}$ стакана воды
(для ингаляции)

Rp. Mentholi
Thymoli
Chloroformii \overline{aa} 0,5
Spiritus vini 90° 6,0
MDS. На вате в дупло зуба

Назначают при болях.

Rp. Mentholi 0,1
Protargoli 0,2
Vaselini 10,0
M. f. unguentum
DS. Мазь для закладывания в обе полови-
ны носа

Назначают при сикозе.

Rp. Mentholi 0,05
Bismuthi subnitrici 1,0
Vaselini flavi 10,0
M. f. unguentum
DS. Мазь для носа

Назначают при сикозе входа в нос.

Rp. Mentholi 0,15
Acidi borici
Zinci oxydati \overline{aa} 0,75
Vaselini flavi 15,0
M. f. unguentum
DS. Мазь для закладывания в обе поло-
вины носа

Показания те же.

Rp. Mentholi

Aetheris

Spiritus vini \overline{aa} 5,0

MDS. Смоченной ватой натирать виски,
затылок

Применяют при мигрени.

Aqua Laurocerasi. Вода лавровишневая.

Rp. Aquae Laurocerasi 8,0

DS. По 10—20 капель 2—3 раза в день.

Применяют при гастральгиях, а также добавляют к микстурам для улучшения их вкуса.

Aqua Amygdalatum amaraum. Вода горькоминдальная.

Rp. Aquae Amygdalatum amaraum 10,0

DS. По 10 капель на прием

Применяют при гастральгиях. Кроме того, добавляют к микстурам для улучшения вкуса других лекарств.

Oleum Anisi. Анисовое масло (входит в состав *Liquor Ammonii anisatus*).

Oleum Eucalypti. Эфирное масло эвкалипта.

Rp. Ol. Eucalypti 2,5

Talci 5,0

Amyli 32,5

M. f. pulvis

DS. Присыпать кожу лица и рук

Применяют для предохранения от укусов комаров.

Rp. Ol. Eucalypti 15,0

Mentholi 2,0

MDS. По 20—30 капель на ингаляцию

Rp. Ol. Eucalypti 2,0

Ol. Terebinthinae 8,0

MDS. По 15 капель на ингаляцию 3 раза
в день

Charta sinapisata. Горчичник.

Rp. Chartae sinapisatae N. 10

DS. Горчичники смачивают теплой водой, придерживают повязкой на нужном месте в течение 10—20 минут в зависимости от степени раздражения и чувствительности кожи, после чего снимают их и обтирают кожу мягкой мокрой тряпочкой.

Применяют при невралгиях, люмбаго-ишиасе, миалгиях, обмороке, плевритах, артритах как отвлекающее; при стенокардии, короналгиях разрезать горчичник вдоль пополам, смочить и положить на грудь рядом с грудной железой минуя грудную железу.

Farina sinapis. Мука горчичная. Столовая горчица.

Rp. Farinae sinapisatae 100,0

DS. Размешать потребное количество горчичной муки в теплой — при температуре 40—60° воде до образования жидкого теста и намазать на холст или на толстую бумагу слоем 0,25—0,5 см, приложить к больному месту и закрепить повязкой на 10—30 минут до образования сильного покраснения кожи

Показания см. Горчичник.

При приготовлении горчицы для стола для усиления аппетита к муке с теплой водой добавляют немного сахара и соль, растирают, герметически закрывают и выдерживают до 1/2 суток.

Добавляют уксус нерационально, так как он будет подавлять образование эфирного горчичного масла в горчице и ухудшать ее вкусовые качества.

Горчичная ванна. Размешать 100,0—200,0 горчичной муки в небольшом количестве теплой воды и вылить в ванну. Для ножной ванны достаточно 50,0 горчичной муки (для улучшения периферического кровообращения).

Spiritus Sinapis. Спирт горчичный, содержит 2% эфирного горчичного масла Ol. Sinapis aethereum.

Rp. Spiritus Sinapis 50,0

DS. Для втирания

Применяют при артритах, невралгии.

Spiritus Formicicus. Спирт муравьиный содержит 5% муравьиной кислоты.

Rp. Spiritus Formicici
Spiritus camphorati
Spiritus Sinapis \overline{aa} 30,0
MDS. Для втирания

Применяют при ревматизме, невралгии, артралгии.

Apisarthronum. Апизартрон. Мазь в стеклянных банках по 30,0 и 50,0 с содержанием по 30 и 50 единиц пчелиного яда, а также в ампулах — для введения содержимого под кожу.

Rp. Apisarthroni 30,0
DS. Втереть мазь (сначала с горошину) в пораженный участок. В случае хорошей переносимости — наносят 1—2 чайные ложки мази и медленно втирают ладонью руки 2 раза в день с последующим теплым укутыванием.

Мазь не должна попадать в глаза, на места царапин, ссадин.

Применяют при ревматизме, невралгиях, невритах, ишиасе.

Vigaripum. Вирапин. Мазь в тубах по 20,0, содержащих 3 мг пчелиного яда.

Rp. Vigaripini 20,0
DS. Втирать мазь в кожу сначала в небольшом количестве; если больной хорошо переносит втирание, дозу и количество втирания увеличивают, а после — теплое укутывание

Применяют при ревматических заболеваниях мышц, суставов, невралгиях.

Viprascutanum. Випракутан. Мазь, содержащая змеиный яд. Выпускается во флаконах по 100 мл.

Rp. Viprascutani 100,0
DS. Наносят 1—2 чайные ложки випракутана на кожу и втирают до полного высыхания.

Применяют при сильных болях, наносят препарат дополнительно и снова втирают, слегка массируют. Втирание производить 1—2 раза в день с последующим теплым укутыванием. При мышечном суставном ревматизме, невралгиях, ишиасе.

Viprasidum. Випразид (Б). Выпускается в ампулах (водный раствор виперитоксинов — токсины ядов различных ядовитых змей по 1 мл). Срок годности 2 года.

Rp. Viprasidi 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить под кожу или внутримышечно от 0,1 мл с постепенным увеличением дозы до 1 мл с промежутками в 3—5 дней.

Применяют при мышечном ревматизме, миалгии, артритах, полиартритах, спондилартритах, невралгиях, ишиасе, полиневритах.

Tinctura amara. Горькая настойка. По 10—20 капель.

Rp. T-гае amarae 20,0

DS. По 20 капель 2—3 раза в день за 30 минут до еды.

Применяют для улучшения аппетита, как рефлекторно усиливающее желудочную секрецию.

Herba Absinthii. Полынь — трава.

Rp. Herbae Absinthii 25,0

DS. Заварить, как чай, 1 чайную ложку травы в 1 стакане воды, настоять 20 минут и принимать за полчаса до еды по $\frac{1}{4}$ стакана.

Применяют для усиления аппетита.

Tinctura Absinthii. Полынная настойка по 15—20 капель на прием.

Rp. T-гае Absinthii 30,0

DS. По 20 капель на прием за 30 минут до еды

Показания см. Горькая настойка.

Tinctura Tagaxaci. Настойка одуванчика.

Rp. T-гае Tagaxaci

T-гае amarae \overline{aa} 10,0

T-гае Strychni 5,0

MDS. По 20 капель 3 раза в день перед едой

Применяют для усиления аппетита, при запорах и как желчегонное.

Folia Menyanthis, Folia Trifolii fibrini. Трифоль — листья. Трилистник.

Rp. Folii Trifolii fibrini
Herbae Absinthii $\bar{a}\bar{a}$ 15,0
M. f. species

DS. Заварить, как чай, по 1 чайной ложке в $\frac{1}{2}$ стакана воды и принимать по 1 столовой ложке перед едой

Применяют для усиления аппетита.

Rp. Inf. folii Trifolii fibrini 10,0 : 200,0

DS. Принимать по 1—2 столовые ложки перед едой.

Показания те же.

Herba Centaurii. Золототысячник — трава.

Rp. Herbae Centaurii 50,0

DS. Заварить, как чай, 1 столовую ложку в стакане воды, через 30 минут процедить и принимать по 1 столовой ложке перед едой

Применяют для усиления аппетита.

Rp. T-rae Centaurii 30,0

DS. По 25—30 капель перед едой

Применяют для повышения аппетита.

3. РВОТНЫЕ, ОТХАРКИВАЮЩИЕ

Apomorphinum hydrochloricum. Хлористоводородный апоморфин (А). Внутрь 0,005—0,01 (отхаркивающее) и 0,005 под кожу (рвотное). Раствор готовится ex tempore.

Rp. Sol. Apomorphini hydrochlorici 1% 5.0
Sterilisetur!

DS. In vitro nigro

S. Ввести 0,5 мл под кожу

Применяется как быстродействующее рвотное—рвота наступает через 3—5 минут.

Surgum sulfuricum. Серноокислая медь. Сульфат меди (Б). По 0,5 в растворе внутрь.

Rp. Sol. Cupri sulfurici 1% 50,0

DS. По 1 столовой ложке через 10 минут до действия (рвотное).

Zincum sulfuricum. Сульфат цинка (Б). 1,0 в растворе внутрь.

Rp. Sol. Zinci sulfurici 2% 50,0

DS. По 1 столовой ложке через 15 минут до действия (рвотное)

Radix Ipecacuanhae. Корень ипекакуаны, рвотный корень (Б). 0,1 (0,4) отхаркивающее; 1,0 внутрь — рвотное.

Rp. Inf. radicis Ipecacuanhae 0,6 : 180,0

Codeini puri 0,1

Liq. Ammonii anisati 2,5

MDS. По 1 столовой ложке через 3—4 часа (отхаркивающее)

Rp. Inf. radicis Ipecacuanhae 0,5 : 180,0

Dionini 0,1

Liq. Ammonii anisati 2,0

MDS. По 1 столовой ложке через 3—4 часа

Показания те же.

Rp. Inf. radicis Ipecacuanhae 0,5 : 200,0

Liquoris Ammonii anisati

Natrii bicarbonici $\bar{a}\bar{a}$ 4,0

MDS. По 1 столовой ложке несколько раз в день

Показания те же.

Natrium benzoicum. Натрий бензойнокислый. Бензоат натрия. По 0,2—0,5 на прием.

Rp. Inf. radicis Ipecacuanhae 0,5 : 200,0

Codeini puri 0,15

Liquoris Ammonii anisati

Natrii benzoici $\bar{a}\bar{a}$ 4,0

MDS. По 1 столовой ложке через 2—4 часа

Показания те же.

Rp. Inf. radicis Ipecacuanhae 3,0 : 50,0

DS. По 1 столовой ложке через 10—15 минут до действия (рвотное)

Emetinum hydrochloricum. Эметин хлористоводородный (Б). (алкалоид корня ипекакуаны). По 0,05 (0,1) под кожу.

Rp. Sol. Emetini hydrochlorici 2% 10,0
Sterilis!

DS. По 0,5—1 мл подкожно или внутримышечно 2 раза в день

Показан при амебной дизентерии.

Herba Thermopsidis. Трава термопсис (Б). 0,1 (0,3).

Rp. Inf. herbae Thermopsidis 0,6 : 200,0
Liquoris Ammonii anisati
Natrii bicarbonici \overline{aa} 4,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
(отхаркивающее)

Radix Senegae. Polygala Senega. Корень сенегги.

Rp. Decocti rad. Senegae 10,0 : 180,0
Liquoris Ammonii anisati 3,0

MDS. По 1 столовой ложке несколько раз в день (отхаркивающее)

Rp. Decocti rad. Senegae 10,0 : 180,0
Dionini 0,1

Liquoris Ammonii anisati 2,5

MDS. По 1 столовой ложке 5—6 раз в день

Показания те же.

Radix Althaeae. Алтейный корень. Decoct 10,0—15,0 : 200,0. **Ammonium chloratum.** Аммоний хлористый. Нашатырь. Отхаркивающее, антисептическое средство.

Rp. Decocti rad. Althaeae 6,0 : 180,0
Ammonii chlorati 4,0

MDS. По 1 столовой ложке 2 раза в день
(отхаркивающее)

Rp. Ammonii chlorati subtilissimi 10,0

DS. Покрыть некротический участок, безболезненный струп в коже и закрепить пластырем

Применяют при сибирской язве.

Fructus Anisi vulgaris. Анис обыкновенный — плод.

Rp. Inf. fructus Anisi 15,0 : 200,0

DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день до еды (отхаркивающее, послабляющее)

Liquor Ammonii anisatus. Нашатырно-анисовые капли.
По 5—10 капель на прием.

Состав: масла анисового 10 ч., спирта 90° 240 ч. и раствора аммиака 50 ч.

Rp. Liquoris Ammonii anisati 15,0

DS. По 7—10 капель на прием (отхаркивающее, антисептическое)

Terpinum hydratum. Терпингидрат 0,25—0,3.

Rp. Codeini puri 0,01

Terpini hydrati 0,25

M. f. pulvis

D. t. d. N. 10

S. По 1 порошку несколько раз в день (при кашле — отхаркивающее)

Pertussinum. Пертуссин. Выпускается во флаконах по 100 мл.

Состав: экстракта чабреца или экстракта тимьяна 12 ч., калия бромистого 1 ч., сиропа сахарного 88 ч., спирта этилового 95° 5 ч.

Rp. Pertussini 100,0

DS. Принимать по 1 столовой ложке (детям по 1/2 чайной, по 1 десертной ложке) 3—4 раза в день (отхаркивающее при бронхите, коклюше)

Radix Polemonii. Корень синюхи.

Rp. Extr. Polemonii fluidi 25,0

DS. По 20 капель 3 раза в день (отхаркивающее)

Herba Origani. Душица — трава.

Rp. Herbae Origani 1,0

Foliorum Farfarae

Radicis Althaeae aa 20,0

M. f. species

DS. По 2 чайные ложки заваривать стаканом кипятка, как чай, 20 минут настаивать и принимать по $\frac{1}{2}$ стакана 3 раза в день (отхаркивающее)

Folium Farfarae. Мать-и-мачеха — лист.

Rp. Folii Farfarae 50,0

DS. Заварить, как чай, по 1 столовой ложке на стакан воды, настоять 10 минут и принимать по 1 столовой ложке 3—4 раза в день (отхаркивающее)

Radix Saponariae. Мыльный корень.

Rp. Rad. Saponariae 30,0

DS. Положить 1 чайную ложку на стакан холодной воды, настоять 8 часов и принимать по $\frac{1}{2}$ стакана 3—4 раза в день (отхаркивающее)

Rp. Decocti rad. Saponariae 6,0 : 200,0

Natrii benzoici 4,0

MDS. Принимать по 1 столовой ложке 3—5 раз в день (отхаркивающее)

Folia Plantaginis majoris. Подорожник большой — листья.

Rp. Inf. foliorum Plantaginis 10,0 : 200,0

DS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день (отхаркивающее)

Herba Serpyllii. Чабрец — трава.

Rp. Inf. herbae Serpyllii 15,0 : 200,0

Natrii benzoici 4,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день (отхаркивающее, болеутоляющее)

Gemmae Pinii. Сосновые почки.

Rp. Decocti Gemmae Pinii 10,0 : 200,0

DS. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день (отхаркивающее, противомикробное)

Rhizoma et radix Inulae helenii. Корневище и корень девясила.

Rp. Decocti rad. Inulae 20,0 : 200,0
Natrii benzoici 4,0

MDS. Принимать по 1 столовой ложке
3—5 раз в день (отхаркивающее)

Herba Ledi palustris. Багульник — трава.

Rp. Inf. herbae Ledi palustris 10,0 : 150,0
Liq. Ammonii anisati 4,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
(отхаркивающее)

4. СЛАБИТЕЛЬНЫЕ, ЖЕЛЧЕГОННЫЕ

Oleum Ricini. Масло касторовое 15,0 — 30,0 per. se.

Rp. Ol. Ricini 15,0 (30,0)

DS. 1. Принять в подогретом виде за один
раз заесть черным хлебом и запить
черным кофе (слабительное).

2. Принять на ночь 30,0 накануне операции.

Rp. Ol. Ricini 2,0

D. t. d. N. 10 in capsulis gelatinosis

S. Принять все капсулы в течение 30 ми-
нут

Rp. Emulsi ol. Ricini 200,0

DS. Принимать по 2 столовые ложки че-
рез каждый час до наступления слаби-
тельного действия.

Касторовое масло не рекомендуют при хронических запорах.

Radix Rhei. Pulvis radix Rhei. Порошок корня ревеня
0,05—2,0.

Rp. Pulveris rad. Rhei 0,5

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. 1—2—3 таблетки на прием (послабляю-
щее, слабительное)

Extractum Rhei siccum. 0,1 (1,0). Экстракт ревеня
сухой.

Rp. Extr. Rhei sicci 3,0
Pulv. rad. Liquiritiae q. s.
ut f. pilulae N. 30
DS. По 1—2 пилюли на ночь

Показан при хронических запорах,

Extractum Frangulae fluidum. Жидкий экстракт крушины 20—40 капель.

Rp. Extr. Frangulae fluidi 50,0
DS. По 30 капель 2 раза в день (слабительное)

Rp. Decocti corticis Frangulae 20,0 : 200,0
Natrii sulfurici 20,0
MDS. По 1 столовой ложке на прием (слабительное)

Folium Sennae. Листья сенны. Александрийский лист. 0,5 (4,0).

Rp. Folii Sennae 10,0
D. t. d. N. 3 in sacculis chartaceis
S. Содержимое пакета заваривать, как чай, в стакане воды и по охлаждению процедить и принимать столовыми ложками (слабительное)

Rp. Inf. folii Sennae 10,0 : 150,0
T-gae Menthae 1,0
MDS. По 1—2 столовые ложки на прием

Показания те же.

Infusum Sennae compositum. Настой сенны сложный. Венское питье. По 1—3 столовые ложки на прием.

Состав: листьев сенны изрезанных 10 ч., воды кипящей 75 ч., сенъетовой соли 10 ч., меда очищенного 10 ч., спирта 95° 10 ч.

Rp. Infusi Sennae compositi 100,0
DS. По 2 столовые ложки на прием (слабительное)

Pulvis Liquiritiae compositus (s. Pulvis Glycyrrhizae compositus). Сложный порошок солодкового корня.

Состав: корня солодкового в порошке 20 ч., листьев сенны в порошке 20 ч., плодов фенхеля в порошке 10 ч., серы очищенной 10 ч., сахара в порошке 40 ч.

Rp. Pulveris Liquiritiae compositi 30,0
D. in scatula

S. Одну чайную (или столовую) ложку размешать в $\frac{1}{4}$ стакана воды и принимать на ночь (слабительное)

Алоë. Алоэ. Сабур. Extractum Aloës siccum 0,015—0,1 на прием.

Rp. Extr. Aloës 0,1
Pulv. rad. Rhei 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку на ночь

Применяют при хронических запорах. Алоэ противопоказан при беременности, геморрое, цистите.

Extractum Aloës. Экстракт алоэ.

Rp. Extr. Aloës 1,0
D. t. d. N. 30 in ampullis
S. Вводить подкожно по 1 мл ежедневно

Применяют при помутнении стекловидного тела, хронических артритах.

Oleum Vaselini purissimi, pro uso interno. Масло вазелиновое очищенное.

Rp. Ol. Vaselini purissimi pro uso interno 200,0
Ol. Menthae gtt. II
MDS. По 1 столовой ложке 2 раза в день (слабительное)

Phenolphthaleinum (Purgen). Фенолфталеин (Пурген) 0,1 (0,3).

Rp. Phenolphthaleini 0,1
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1—2 таблетки вечером (послабляющее)

Пурген противопоказан при болезнях почек.

Isapheninum. Изафенин (Б). 0,025 (0,05) на прием.

Rp. Isaphenini 0,01

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2 раза в день (слабительное)

Extractum Descurinae Sophiae fluidum. Жидкий экстракт из семян гулявника струйчатого.

Rp. Extr. Descurinae Sophiae fluidi 30,0

DS. Принимать 15—20 капель 2 раза в день после еды в течение 3—5 дней (слабительное, при атонических запорах)

Magnesium sulfuricum. Серноокислая магнезия. Горькая соль. Сульфат магния (английская соль) 10,0—30,0.

Rp. Magnesii sulfurici 30,0

DS. Принимать утром по 1 чайной ложке на рюмку воды по мере надобности (послабляющее и желчегонное — при хроническом холецистите)

Rp. Magnesii sulfurici 20,0 (30,0)

DS. Растворить в $\frac{1}{2}$ стакана воды и запить стаканом воды (слабительное, при отравлениях)

Rp. Sol. Magnesii sulfurici 25% 50,0

DS. Для внутриводенального введения (желчегонное)

Natrium sulfuricum. Сульфат натрия 10,0—30,0.

Rp. Natrii sulfurici 25,0

DS. На один прием. Растворить в $\frac{1}{2}$ стакана воды и запить стаканом воды; принять на ночь (слабительное)

Sal carolinum factitium s. Sal. carlsbadense.

Соль карловарская искусственная.

Состав: сульфата натрия 22 ч., бикарбоната натрия 18 ч., хлорида натрия 9 ч. и сульфата калия 1 ч.

Rp. Salis carolini factitii 50,0
DS. По 1—2 чайные ложки на $\frac{1}{2}$ стакана
воды на ночь (слабительное, желче-
гонное)

Pulvis аërophorus Botkini. Шипучий порошок Боткина.
Состав: бикарбоната натрия 6,5 ч., виннокаменной кис-
лоты 6 ч. и сульфата натрия 2 ч.

Rp. Pulveris аërophorus Botkini 50,0
DS. По 1 чайной ложке на $\frac{1}{2}$ стакана во-
ды на ночь (послабляющее)

Sulfur depuratum. Сера очищенная 0,5—1,0.

Rp. Sulfuris depurati 0,5 (1,0)
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку на ночь (послабляющее)

Hydrargyrum chloratum mite. Ртуть однохлористая
(s. Calomel) (Каломель) (Б). 0,6 (1,8).

Rp. Calomelanos 0,3 (0,5)
Sacchari lactis 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку через 2 часа, до действия

Назначают при дехлорированной диете (послабляющее, слаби-
тельное, противомикробное). Желчегонное по 0,05—0,1 на прием.

Противопоказание: болезни почек, одновременный прием йода,
кислот.

Chologonum. Хологон 0,2—0,25.

Rp. Chologoni 0,25
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день (желчегон-
ное)

Decholinum. Дехолин 20% 5—10 мл, 5% 5—10 мл
в вену.

Rp. Sol. Decholini 5% 5,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 5—10 мл в вену медленно ежеднев-
но с последующими 2—3-дневными пе-
рерывами (желчегонное)

Allocholum. Аллохол. Выпускается в таблетках, содержащих: сухой желчи животных 0,08, сухого экстракта чеснока 0,04, сухого экстракта крапивы 0,005 и активированного угля 0,025.

Rp. Tabulettae Allocholi N. 50

S. По 1—2 таблетки 3 раза в день после еды (желчегонное)

Flos Helichrysi aeneae. Бессмертник — цветы.

Rp. Decocti flos Helichrysi aeneae 6,0 : 200,0

DS. По 1/2 стакана на прием 2 раза в день (желчегонное)

Rp. Extr. Helichrysi aeneae fluidi 50,0

DS. По 1 чайной ложке 3 раза в день

Показания те же.

Rp. Extr. Helichrysi aeneae sicci 1,0

D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 3 раза в день

Flaminum. Фламин (сухой концентрат вытяжки бессмертника).

Rp. Flaminum 0,05

D. t. d. N. 12 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3 раза в день до еды (желчегонное)

Stigmata Maydis. Кукуруза — рыльца.

Rp. Stigmatum Maydis 10,0

DS. Настоять в стакане кипящей воды и пить столовыми ложками через 3 часа (желчегонное, мочегонное)

Rp. Extr. Stigmatum Maydis fluidi 40,0

DS. По 30 капель 3 раза в день

Показания те же.

Tinctura Berberis vulgaris. Настойка барбариса обыкновенного. Выпускается в склянках по 50 мл.

Rp. Tincturae Berberis vulgaris 50,0

DS. По 30 капель 3 раза в день перед едой

Применяют при желчных коликах, хроническом холецистите.

Cholenzymum. Холензим. Выпускается в таблетках по 0,5. Срок годности 1 год.

Rp. Cholenzymumі 0,5

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. По 1 таблетке 1—3 раза в день

Применяется как желчегонное, при болезнях печени и желчных путей, а также при гастритах, ахилии и энтероколитах.

Cholosas. Холосас. Экстракт из плодов шиповника. Отпускается во флаконах по 250 мл. Назначают по 1 чайной ложке 3 раза в день — при холециститах, гепатитах. Слабительные и желчегонные применяются под постоянным наблюдением врача.

**V. ПРОПИСИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ВЛИЯНИЕМ
НА ПРОЦЕССЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ,
КРОВОТВОРЕНИЯ**

I. КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ

Acidum hydrochloricum purum dilutum. Разведенная чистая соляная кислота (Б). 20 (60) капель.

Rp. Acidi hydrochlorici diluti 5,0
Aquae destillatae 180

MDS. По 1 столовой ложке несколько раз в день после еды и сразу же прополаскать рот водой, — во избежание порчи зубов

Применяют при ахилии.

Rp. Acidi hydrochlorici diluti 5,0
Pepsini 2,5
Aquae Menthae 180,0

MDS. По 1 столовой ложке несколько раз в день после еды

Применяют при пониженной кислотности желудка.

Rp. Acidi hydrochlorici diluti 30,0
Pepsini 5,0

MDS. Принимать во время еды по 20—30 капель в 1/2 стакана теплой воды

Применяют при пониженной кислотности желудка.

Acidum tartaricum. Кислота виннокаменная.

Rp. Acidi tartarici pulverati

Magnesii carbonici

Sacchari aa 0,3

M. f. pulvis

D. t. d. N. 10

S. Растворять по 1 порошку в $\frac{1}{2}$ стакана воды (шипучий напиток — легкое слабительное)

Acidum lacticum. Молочная кислота.

Rp. Acidi lactici 50,0

DS. По 1 чайной ложке на 1 л кипяченой воды температурой 38° (для спринцевания)

Acidum boricum. Борная кислота.

Rp. Acidi borici 10,0

DS. По 1 чайной ложке на стакан горячей воды (полоскание, примочка)

Rp. Sol. Acidi borici 2% 20,0

Cocaini hydrochlorici 0,1

Sol. Adrenalini hydrochlorici 1 : 1000 1,0

MDS. Капли для носа (при остром насморке)

Acidum Glutamicum. Глютаминовая кислота.

Rp. Acidi Glutaminici 1,0

D. t. d. N. 30

S. По 1 порошку 3 раза в день до еды

Назначают при шизофрении, эпилепсии, мышечной дистрофии. Глютаминовая кислота противопоказана при лихорадочных состояниях, болезнях печени, почек и кроветворных органов.

Calcium glutamicum. Кальциевая соль глютаминовой кислоты.

Rp. Sol. Calcii glutaminici 10% 500,0

DS. Принимать по 1—3 столовые ложки (или по 20—50 мл на прием) 3 раза в день

Назначают сроком на 4—6 месяцев при психических расстройствах, связанных с церебральным артериосклерозом, пресенильных психозах, эпилепсии после травмы, при туберкулезном менингите, арахноэнцефалите, полиомиелите.

При необходимости курс лечения повторяют через 2—3 месяца.

Rp. Sol. Calcii glutaminici 10% 10,0

D. t. d. N. 20 in ampullis

S. Вводить ежедневно по 3—5 мл в первый день, а в последующие по 10 мл внутривенно капельным методом. Курс 15—20 вливаний

Показания те же.

Magnium glutamicum. Магниева соль глутаминовой кислоты. Выпускается в ампулах по 10 мл 10% раствора для внутривенных введений капельным методом.

Rp. Sol. Magnii glutaminici 10% 500,0

DS. Принимать по 20—50 мл 3 раза в день внутрь

Применяют в течение 4—6 месяцев при спастических парезах и параличах, после арахноэнцефалита, при гипертонических кризах, эпилепсии. Через 2—3 месяца можно курс повторить.

Natrium bicarbonicum. Бикарбонат натрия. Сода двууглекислая.

Rp. Natrii bicarbonici 30,0

DS. По $\frac{1}{2}$ чайной ложки на рюмку воды

Применяют при изжоге, повышенной кислотности.

Rp. Natrii bicarbonici 1,0

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Показания те же.

Rp. Sol. Natrii bicarbonici purissimi 5% 100,0
Sterilisetur!

DS. Вводить в вену по 20—50 мл

Применяют при ацидозе, интоксикации,

Rp. Natrii bicarbonici 0,5
Glycerini
Aquae destillatae \overline{aa} 5,0
MDS. Вливать в ухо по 10 капель 3 раза
в день

Применяют для размягчения серных пробок перед промывани-
ем уха.

Rp. Natrii bicarbonici 100,0
DS. По 1 столовой ложке на 5 стаканов
кипяченой воды, температурой 38° (для
спринцевания)

Rp. Natrii bicarbonici 30,0
Natrii benzoici
Natrii chlorati \overline{aa} 5,0
Ol. Menthae gtt. III
M. f. pulvis
DS. По 1 чайной ложке на 1 стакан воды
для полоскания горла

Применяют при хронических катарах.

Magnesium oxydatum. Окись магния.

Magnesium usta. Магнезия жженая по 0,1—0,5—1,0 на
прием.

Rp. Magnesiae ustae 30,0
D. in vitro
S. Принимать по $\frac{1}{2}$ чайной ложки на рюм-
ку воды

Применяют при изжоге, повышенной кислотности.

Rp. Magnesiae ustae 0,5
Extr. Belladonnae 0,015
M. f. pulvis
D. t. d. N. 6—10
S. По 1 порошку 2 раза в день

Показания те же.

Rp. Magnesiae ustae
Natrii bicarbonici
Calcii carbonici \overline{aa} 0,5
M. f. pulvis

D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 3 раза в день за 1 час до еды

Применяют при гиперацидном гастрите.

Rp. Magnesii oxydati 15,0

Aquae destillat 300,0

MDS. По 1 столовой ложке повторно, каждый раз хорошо взбалтывать

Применяют при отравлении кислотами.

2. СОЛИ ЩЕЛОЧНЫХ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ. ГЛЮКОЗА. МЕД

Kalium aceticum. Liquor Kalii acetici. Ацетат калия.

Rp. Liquoris Kalii acetici 15,0

Aquae Menthae piperitae 150,0

Sirupi simplicis 20,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Назначают при тахикардии, аритмии, декомпенсации сердца; как мочегонное.

Calcium chloratum crystallisatum. Хлорид кальция, кальций хлористый 0,5—1,0—1,5 внутрь, в 10% растворе по 10 мл в вену.

Rp. Calcii chlorati 10,0

Aquae destillatae 180,0

MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день на молоке

Назначают при крапивнице, сывороточной болезни, легочных кровотечениях.

Rp. Sol. Calcii chlorati crystallisati 10% 10,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 10 мл внутривенно, вводить медленно

Назначают при легочных, почечных кровотечениях, гематурии, при остром упадке сердечной деятельности.

Calcium gluconicum. Глюконат кальция 2,0—5,0 внутрь; 10% 5—10 мл в мышцу.

Rp. Calcii gluconici 50,0

DS. По 1 чайной ложке 2 раза в день

Применяют при крапивнице, сывороточной болезни.

Rp. Calcii gluconici 0,5
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Rp. Sol. Calcii gluconici 10% 10,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 10 мл в мышцу

Показания те же.

Calcium carbonicum praecipitatum. Карбонат кальция осажженный. Кальций углекислый осажженный.

Rp. Calcii carbonici 1,0
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяют при повышенной кислотности желудочного сока.

Barium sulfuricum. Сульфат бария.

Rp. Barii sulfurici pro Roentgeno 100,0
DS. Размешать с киселем или жидкой кашей и принять внутрь или ввести в прямую кишку

Применяют для рентгенографии желудка, кишечника.

Rp. Barii sulfurici 30,0
Zinci oxydati
Talcii aa 15,0
Amyli 40,0
M. f. pulvis
DS. К порошку добавляют воды до образования кашицы, наносят на волосистые места кожи, через 5—10 минут снимают спинкой ножа (депиляторий)

Glucosum, Glucosa. Виноградный сахар. Глюкоза выпускается в порошках и таблетках по 1,0; в ампулах по 10, 20, 50 мл 40% раствора.

Rp. Sol. Glucosi 5% 200,0
Sterilisetur!
DS. Для подкожных вливаний

Применяют при кровопотерях.

Rp. Sol. Glucosi 40% 20,0
D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить медленно внутривенно по 20 мл

Применяют при гипогликемии, инфекционных заболеваниях, декомпенсации сердца, гепатитах, отравлениях, шоковых состояниях.

При быстром поступлении в кровь высоких концентраций глюкозы может увеличиться ее свертываемость.

Внутривенное введение глюкозы противопоказано при эмболии, тяжелом коронаросклерозе, после апоплексии.

Rp. Glucosi 1,0
Acidi ascorbinici 0,05 (0,1)

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3 раза в день

Показания те же.

Rp. Natrii chlorati 8,5

Kalii chlorati

Calcii chlorati

Natrii bicarbonici \overline{aa} 0,2

Glucosi 1,0

Aquae destillatae ad 1000,0

M. Sterilisetur!

DS. Раствор Рингера — Локка

Вводить внутривенно при кровопотерях.

Rp. Glucosi 20,0

Acidi ascorbinici 0,25

Natrii bicarbonici 0,12

Aquae destillatae ad 100,0

M. Sterilisetur!

DS. Вводить внутривенно по 20 мл ежедневно

Назначают при упадке сердечной деятельности.

Mel depuratum. Мед очищенный. Мед содержит 70—80% глюкозы, витамины, эфирные масла.

Rp. Melis depurati 500,0

DS. Принимать по 50,0—100,0 в день за едой, с чаем

Назначают при истощении, миокардиосклерозе, коронарной недостаточности, болезнях печени, инфекциях, интоксикациях и атонии кишок.

3. ФТОР, ХЛОР, ИОД, РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА, ФОСФОР

Natrium fluoratum. Флюорид натрия. Фтористый натрий. Хранится в герметически закрытой склянке, внутренняя поверхность которой покрывается парафином.

Rp. Natrii fluorati 0,2
Aquae destillatae 18,0
MDS. Для втирания в твердые ткани зуба

Применяют для обезболивания твердых тканей зуба у взрослых, для предупреждения кариеса. По Новикову.

Rp. Natrii fluorati
Bolus albae $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
Glycerini 1,2
M. f. pasta
DS. Пасту втирать 2—3 минуты в чувствительный дентин

Применяют для обезболивания чувствительного дентина при среднем кариесе зубов. По И. Г. Лукомскому.

Natrium chloratum. Хлорид натрия. Хлористый натрий. Выпускается в порошке и в таблетках по 0,85.

Solutio Natrii chlorati isotonica. Изотонический раствор хлористого натрия. 0,85% водный раствор поваренной соли; по 10, 20, 100, 250 мл в ампулах.

Rp. Solutionis Natrii chlorati isitonicae sterilisatae 500,0

DS. Для внутривенного или подкожного введения по 50—100 мл и в клизмах

Применяют при кровопотерях.

Rp. Sol. Natrii chlorati isotonicae sterilisatae 500,0

Adde sol. Adrenalini hydrochlorici 0,1%
ggt. V (X)

MDS. Вводить внутривенно медленно

Применяют при кровопотерях, пониженном кровяном давлении, ослабленной сердечной деятельности.

Rp. Sol. Natrii chlorati 0,85% 250,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Для внутривенного и подкожного введения

Применение см. выше.

Rp. Natrii chlorati 0,85
D. t. d. N. 500 in tabulettis
S. Растворить 10 таблеток в 1 л дистиллированной воды, профильтровать и простерилизовать

Применение см. выше.

Rp. Sol. Natrii chlorati 10% 20,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. По 5—10—20 мл внутривенно медленно

Применяют при остром понижении кровяного давления.

Rp. Sol. Natrii chlorati 2% (5%) 500,0
D. Sterilisetur!
S. Для обмывания и тампонады гнойных, вяло гранулирующих ран

Хлорид натрия (соль поваренная) является источником образования соляной кислоты в желудке; в этой связи соль рационально использовать как таковую и в виде соленой пищи для предупреждения ахилии, при ахилии—как регулятор пищеварения.

Хлорид натрия может быть эффективным в профилактических и лечебных целях при гиперхолестеринемии, атероматозе, атеросклерозе (при отсутствии нарушения кровообращения) как фактор, способствующий усилению обмена веществ, липоидного обмена.

Для поддержания определенного необходимого солевого равновесия в организме людей, находящихся в жарких климатических условиях, работающих в горячих цехах, физиолог И. П. Разенков рекомендовал время от времени употреблять для питья слегка подсоленную (0,2%) воду.

Jodum. Йод (Б). 0,02 (0,06). Кристаллы темно-бурого цвета. Раствор йода в спирте — *Solutio jodi spirituosa* носит название — йодная настойка.

Tinctura Jodi. Настойка йодная 5% 15 (50) капель внутрь.

Tinctura Jodi. Настойка йодная 10% 8 (25) капель внутрь.

Rp. T-rae Jodi 5% 50,0
DS. Наружное

Применяют для смазывания операционного поля, рук, а также для обработки ран.

Rp. T-rae Jodi pro usu interno 15,0
DS. По 1—5 капель с молоком 3 раза в день после еды

Применяют при атеросклерозе, третичном сифилисе, актиномикозе, хроническом артрите.

Rp. T-rae Jodi 1,5
Acidi tannici 2,0
Glycerini 30,0
MDS. Для смазывания десен

Применяют при цинге.

Rp. Jodi puri 0,2
Kalii jodati 0,5
Glycerini 30,0
Ol. Mentae gtt. III
MDS. Капли для носа, для смазывания горла

Применяют при хроническом рините, озене, атрофическом ларингите.

Solutio Lugoli. Liquor Lugoli. Раствор Люголя.

Rp. Jodi puri 5,0
Kalii jodati 10,0
Aquae destillatae ad 100,0
MDS. Для смазывания горла

Применяют при хронических воспалительных процессах.

Внутрь по 4—6 капель 2—3 раза в день на молоке при атеросклерозе. По 1 капле ежедневно в течение 20 дней, после 20-дневного промежутка курс можно повторить—при эндемическом зобе.

Rp. Jodi puri 0,02
Kalii jodati 0,2
Luminali 0,4
Pulv. folii Digitalis 1,0
Extr. rad. Valerianae 2,0
Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s.
Ut f. pilulae N. 40

DS. По 1 пилюле 2 раза в день за едой в течение 20 дней с 10-дневным перерывом

Проводят всего 3—4 курса при тиреотоксикозах.

По показаниям в течение курса добавляют инсулин и хинидин. Метод Н. А. Шерешевского.

Natrium jodatum. Йодистый натрий 0,1—1,0.

Rp. Sol. Natrii jodati 4,0 (6,0) 200,0

DS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день после еды

Применяют при атеросклерозе, актиномикозе, хроническом артрите, а при третичном сифилисе при переносимости дозу увеличивают до 8,0—10,0 в сутки.

Kalium jodatum. Йодистый калий 0,1—1,0.

Rp. Sol. Kalii jodati 6,0 (12,0) 200,0

DS. По 1 столовой ложке 2—3 раза в день

Применяют при атеросклерозе, гипертонической болезни, актиномикозе, хроническом артрите, а при третичной форме сифилиса при переносимости дозу увеличивают до 8,0—10,0 в сутки.

Rp. Kalii jodati 0,01

Aquae destillatae 100,0

MDS. По 1—2 чайные ложки на прием 1 раз в неделю

Применяют при эндемическом зобе.

Sajodinum. Сайодин.

Rp. Sajodini 0,5

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2 раза в день

Применяют при атеросклерозе, нейросифилисе, хроническом ревматизме.

Laminaria Saccharina. Ламинария сахаристая. Морская капуста. Выпускается в виде порошка, содержащего йодистые и бромистые соли, кальциевые соли альгиновых кислот, маннит, полисахариды, ламинарин, витамин С.

Rp. Laminariae Saccharinae 100,0

DS. Принимать по $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке 1 раз в день

Назначают при хронических запорах у лиц с явлениями атеросклероза.

Противопоказано при нефрите, геморрагических диатезах. О «рассасывающей» роли йода при атеросклерозе можно говорить, очевидно, только в связи с его способностью поглощаться из крови щитовидной железой (диагностируется методом «меченых атомов», клинически) и входить в состав тиреоидного гормона, стимулирующего обмен веществ. При резко выраженных формах атеросклероза, гипертонической болезни III стадии снижается количество поглощаемого щитовидной железой йода и в таких случаях эффективность йода будет менее значительной. От больших доз препаратов йода могут развиваться побочные явления: металлический вкус, насморк, кашель, бронхит, слезы, сердечная слабость, сыпь — йодизм. В этих случаях прерывают лечение и назначают молоко, сырые яйца, крахмал, размешанный в воде, щелочное промывание желудка, сердечные средства.

Jodoformium. Йодоформ. Желтые кристаллы резкого запаха.

Rp. Jodoformii 20,0
DS. Присыпка

Назначают при вяло гранулирующих гнойных ранах, сифилитических язвах, мягком шанкре.

Emulsio Jodo-jodoformiata. Йодоформная эмульсия.

Rp. Jodi puri 1,0
Jodoformii 9,0
Glycerini 90,0
MDS. Вводить в полости по 5—10 мл 1 раз в неделю

Применяют при костном туберкулезе и для тампонады гнойных ран.

Rp. Jodoformii 10,0
Glycerini 90,0
MDS. Для тампонады свищевых ходов, гнойных ран — один раз в 5 дней. Перед употреблением взбалтывать

Bilitrastum. Билитраст¹.

Rp. Bilitrasti 3,0
DS. Принимать 1,0—1,5 через 20 минут и запивать 3 стаканами сладкого чая

Применяют для рентгеноскопии желчных путей.

¹ Подробности о рентгеноконтрастных средствах см. в соответствующих руководствах.

Bilignostum. Билигност.

Rp. Sol. Bilignosti 20% 10,0 (20,0)

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить 1—2 мл в вену

При отсутствии осложнений добавляют
30—40 мл

Вводят медленно в подогретом виде. Контрастное изображение желчных путей наблюдается через 15—30 минут.

Cardiotrastum. Кардиотраст (Diodonum. Диодон)
35—70% по 20—50 мл в ампулах.

Rp. Sol. Cardiotrasti 50% 20,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить по 20 мл в вену медленно в подогретом виде

Применяют для ангиокардиографии.

Jodognostum. Йодогност.

Rp. Jodognosti 25,0

DS. Перед приемом внутрь растворяют в $\frac{3}{4}$ стакана боржома или нарзана, к раствору добавляют 0,5—1,0 лимонной кислоты

Применяют для рентгеноскопии желчных путей.

Jodolipolum. Йодолипол.

Rp. Jodolipoli 10,0

D. t. d. N. 2 in ampullis

S. Вводить с помощью катетера через носовую полость в трахею (под контролем рентгена) по 3—5 мл, далее постепенно прибавлять до 10—20 мл

Применяют при бронхографии, метро- и сальпингографии.

Trijotrastum. Трийотраст (Triumbrenum. Триумбрен).

Rp. Sol. Trijotrasti 50% 20,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Сначала вводят в вену 1—3 мл. При отсутствии осложнений на 2-й день вводят медленно в подогретом виде до 40 мл

Применяют при пиелографии, ангиокардиографии. Применение рентгеноконтрастных средств противопоказано при декомпенсации

сердца, при острой форме туберкулеза и при острых заболеваниях печени и почек.

Calcium glycerophosphoricum. Глицерофосфат кальция 0,1—0,3.

Rp. Acidi arsenicosi 0,03
Phytini 3,0
Calcii glycerophosphorici 2,0
Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s.
Ut f. pilulae N. 30
S. По 1—2 пилюли 3 раза в день

Применяют при общем упадке питания, истощении нервной системы, рахите.

Lecithinum. Лецитин.

Rp. Lecithini 0,4
D. t. d. N. 50 in dragée
S. По 2 драже 3 раза в день

Применяют при неврастении, общем упадке сил, малокровии.

Liposegerinum. Липоцеребрин. Выпускается в таблетках по 0,5. Срок годности 3 года.

Rp. Liposegerini 0,5
D. t. d. N. 50 in tabulettis
S. Принимать по 1 таблетке 3—4 раза в день в течение 3—4 недель

Применяют при нервном истощении, гипотонии.

Phytinum. Фитин 0,25—0,5.

Rp. Phytini 0,25
D. t. d. N. 40 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Применяют при неврастении, упадке питания, рахите, анемии.

4. ГОРМОНЫ, ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

а) Препараты гипофиза, щитовидной железы, тормозящие функцию щитовидной железы, и препараты паращитовидных желез

Hormonum adrenocorticotropinum.

Адренокортикотропный гормон (АКТГ). (Eхacthinum. Эксактгин) по 20—40 ЕД или по 10—20 мг во флаконах.

Rp. Hormoni adrenocorticotropini 20 ED

D. t. d. N. 10

S. Перед употреблением каждую дозу растворить в 2 мл стерильного физиологического раствора. Вводить по 0,5 мл в мышцу 4 раза в сутки

Применяют при остром ревматизме, хронических ревматических артритах, подагре, при гипофизарной кахексии, острой лимфатической и миелонидной лейкемии, крапивнице, сывороточной болезни. При бронхиальной астме доза увеличивается до 40—100 мг в день.

Противопоказания: активный туберкулез, язвенная гипертоническая болезнь, коронарная недостаточность, беременность.

Adiurecginum. Pituitrinum siccum. Адиурекрин, сухой питуитрин (Б). 0,05—0,15.

Rp. Adiurecchini 0,05

D. t. d. N. 20 in charta cerata

S. По 1 порошку 3 раза в день втягивать в нос (в 8 часов утра, в 4 часа дня и в 12 часов ночи)

Применяют при несахарном мочеизнурении.

При ночном недержании мочи у детей по 0,02 один раз в сутки перед сном в течение 2—3 недель.

Pituitrinum. Питуитрин. По 2 мл (4 мл) под кожу.

Rp. Pituitrini 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. По 0,5—1 мл под кожу или внутримышечно

Применяют для усиления сокращения матки при родах—инъекции повторяют через 2 часа до 3—4 раз, чередуя их с хинином (по 0,15), при маточных кровотечениях, несахарном диабете.

Питуитрин противопоказан: при гипертонической болезни, токсикозах у беременных.

Antiasthmocginum. Антиастмокрин (Kadamysinum. Кадамизин). 0,5—1 мл под кожу (смесь питуитрина с адреналином). Срок годности 1 год.

Rp. Antiasthmocchini 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 0,5—1 мл под кожу 3—4 раза в день

Применяют в начале или во время приступа бронхиальной астмы.

Prolactinum. Пролактин.

Rp. Prolactini 5,0

DS. По 1 мл внутримышечно 2 раза в день
в течение 5—6 дней

Применяют при недостаточности выделения молока молочными железами в послеродовом периоде.

Thyreoidinum. Тиреоидин (Б). 0,3 (1,0).

Rp. Thyreoidini 0,1

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день после
еды с одно-, двухдневными промежут-
ками

Применяют при гипотериозах, микседеме, кретинизме и при от-
дельных формах ожирения.

Rp. Thyreoidini 0,01 (0,05)

Sacchari 0,3

M. f. pulvis

D. t. d. N. 10

S. По 1 порошку 2 раза в день

Показания те же.

Dijodthyrosinum. Дийодтирозин 0,05.

Rp. Dijodthyrosini 0,05

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день в тече-
ние 2—3 недель

После 1—2-недельного перерыва курс лечения повторить; на-
значают при базедовой болезни и тиреотоксикозе легкой и средней
тяжести.

Methylthiouracilum. Метилтиоурацил (Б). 0,05—0,25.

Rp. Methylthiouracili 0,25

D. t. d. N. 12 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2 раза в день с обяза-
тельным систематическим контролем за
состоянием белой крови

Показан при базедовой болезни.

Rp. Methylthiouracili 2,0

Kalii jodati 0,2

Jodi puri 0,02
Luminali 0,4
Pulv. folii Digitalis 1,0
Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s.
Ut f. pilulae N. 40
DS. По 1 пилюле 2 раза в день после еды

Показан при всех формах тиреотоксикоза, под контролем состава крови. Пропись Н. А. Шерешевского.

Mercazolilum. Мерказолил (s. *Metothyrimum*. Метотирин) (Б). Выпускается в таблетках по 0,005. Близок по действию к метилтиоурацилу.

Rp. Mercazolili 0,005
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. По $\frac{1}{2}$ —1 таблетке 2—3 раза в день
При легких формах тиреотоксикоза; по 2 таблетки 3 раза в день при тиреотоксикозах средней тяжести, а далее дозу уменьшают. Затем дают длительно 4—6 месяцев по $\frac{1}{2}$ таблетки.
Возможны осложнения — развитие лейкопении. Противопоказан при беременности, лейкопении, лихорадочных состояниях.

Betasinum. Бетазин.

Rp. Betasini 0,05
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды
(при тиреотоксикозе)

Parathyreoidinum. Parathyreocrinum. Паратиреоидин (Б). 5 мл высшая доза под кожу. Выпускается в ампулах по 1 мл. Срок годности 2 года.

Rp. Parathyreoidini 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1—2—5 мл подкожно или внутримышечно от 1 до 4 раз в сутки

Показан при тетании, спазмофилии, аллергических заболеваниях. Под контролем уровня кальция в крови.

б) Препараты поджелудочной железы и их синтетические заменители

Insulinum. Инсулин (Б). 1 мл содержит 20—40 ЕД. Выпускают во флаконах по 5 мл. Хранится 1½ года в прохладном темном месте.

Rp. Insulini 5,0

DS. Вводят подкожно 1—2—3 раза в день

Применяют при сахарном диабете по 10—20 ЕД за один раз за 30 минут до еды. При диабетической коме 40—60 до 100 ЕД и далее по 20—30 ЕД через 3—6 часов под контролем уровня сахара крови и мочи.

Вечерняя доза должна быть введена за 3—6 часов до сна.

При болезнях печени, острой дистрофии печени, при тиреотоксикозах и истощении вводят небольшие дозы инсулина и одновременно глюкозу.

Triprotamin-zinc-insulinum. Трипротамин-цинк-инсулин (Б). Препарат инсулина с продленным действием. Выпускается во флаконах по 5 мл. В 1 мл 40 ЕД инсулина. Срок годности 1 год.

Rp. Triprotamin-zinc-insulini 5,0

DS. Вводить подкожно по 10 ЕД (до 60 ЕД) один раз в сутки. Вначале вводят 1/3 дозы обычного инсулина и одновременно 2/3 дозы трипротамин-цинк-инсулина. Перед употреблением взбалтывать

Применяют при сахарном диабете.

Globin-zinc-insulinum. Глобин-цинк-инсулин. Инсулин с продленным действием. Выпускается во флаконах с содержанием по 10 мл препарата (400 МЕД).

Rp. Globin-zinc-insulini 10,0

DS. Вводить под кожу по 10—20—60 ЕД один раз в сутки перед завтраком за полчаса до еды.

Повторное введение в одно и то же место не рекомендуется; в вену — не допускается

Применяют: а) при сахарном диабете легкой степени—одну дозу в сутки;

б) при диабете средней формы и тяжелой сахарной болезни—2 дозы в сутки.

Лечение, дозирование проводятся только под постоянным наблюдением врача индивидуально в зависимости от состояния больного (количества сахара в крови и моче) и пищевого режима.

Шприц и иглы для инъекции стерилизуют путем кипячения в течение 15 минут в дистиллированной воде без соды или другой щелочи.

Liposainum. Липокаин по 0,2—0,4 на прием.

Rp. Liposaini 0,1

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. По 1—2 таблетки 2—3 раза в день

Применяют при сахарном диабете, болезнях печени.

Diabogalum. Диаборал (Б). Аналогичен бутамиду. Выпускается по 0,5 в таблетках. Во флаконах по 50 таблеток (сульфаниламидное соединение).

Rp. Diabogali 0,5

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. Принимать первый день по 1 таблетке 5 раз в день после еды; 2-й день по 1 таблетке 4 раза в день; 3-й и 4-й день по 1 таблетке 3 раза в день; на 5-й день 2 таблетки в день и на 6-й день 1 таблетку в день в зависимости от состояния больного и содержания сахара в крови и моче

Показан при сахарном мочеизнурении.

Butamidum. Бутамид (s. Rastinonum. Растинон). Выпускается в таблетках по 0,5.

Rp. Butamidi 0,5

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. Принимать внутрь первый день 3—6 таблеток, во 2-й день 3—5 таблеток, в 3-й день 3—4 таблетки; затем 1—3 таблетки в день.

При отсутствии эффекта в течение двух недель лечение бутамидом прекращается

Показан при сахарном диабете у лиц пожилого возраста. Противопоказан при диабете у молодых, при болезнях печени, почек, инфекционных болезнях при лейко-тромбопении, беременности, коматозных состояниях; из осложнений может развиваться лейкопения.

Nadisani. Надизан (Invenolum. Инвенол). Выпускается в таблетках по 0,5.

Rp. Nadisani 0,5

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. Принимать внутрь по 1 таблетке 3—6 раз в день (далее см. схему лечения бутамидом)

Показания и противопоказания те же, см. Бутамид. Лечение сахарного диабета проводится под строгим наблюдением врача—периодически в условиях стационара.

в) Препараты женских и мужских половых гормонов и их синтетические заменители¹

Diaethylstilboestrolum. Диэтилстильбэстрол (Б).
В 1 мг 20 000 ЕД.

Rp. Diaethylstilboestrolis 0,001

D. t. d. N. 12 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке ежедневно

Показан при недостаточной функции половых желез, климактерии.

Rp. Sol. Diaethylstilboestrolis oleosae 0,1% 1,0

D. t. d. N. 12 in ampullis

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в 3—5 дней

Показания те же.

Сбщая доза на курс при приеме внутрь 12—15 мг; при внутримышечном введении 5—15 мг.

Rp. Sol. Diaethylstilboestrolis propionici oleosae 0,1% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. По 1 мл внутримышечно 1 раз в 3—5 дней

Показания те же.

Solutio Dimoestrolum oleosa. Масляный раствор димэстрола (Б). 0,6% 2,0.

¹ Половые гормоны противопоказаны: при злокачественных и доброкачественных опухолях половых органов, при острых воспалительных процессах половых органов, нормальной беременности, болезнях почек, печени, гипертонических кризах.

Rp. Sol. Dinnoestrolis oleosae 0,6% 2,0

D. t. d. N. 4 in ampullis

S. Вводить по 2 мл внутримышечно один раз в неделю и реже

Применяется при недостаточной функции половых желез. На курс 2—3 впрыскивания.

Solutio Folliculinum oleosae. Масляный раствор фолликулина в 1 мл содержит 5000—10 000 ЕД.

Rp. Sol. Folliculini oleosae (5000 ЕД) 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 1 мл в мышцу ежедневно в течение 2—3 недель

Применяется при недостаточной функции яичников.

Oestradiolum dipropionicum. Эстрадиол-дипропионат (Б). 1 мг содержит 20 000 ЕД.

Rp. Sol. oleosae Oestradioli dipropionici
0,1% 1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. По 1 мл в мышцы 2 раза в неделю

Применяется при пониженной функции яичников, кастрации.

Acrofollinum. Акрофоллин (Б). Выпускается в таблетках по 0,1 мг и в ампулах по 1 мл, содержащих по 1 и 5 мг эстрадиола-монопропионата, растворенного в масле.

Rp. Acrofollini 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить по 1 мл внутримышечно ежедневно в течение 15—20 дней

Применяется при аменорее, запоздалом половом развитии, после кастрации, генитальной гипоплазии, при предклимактерических расстройствах менструаций.

Microfollinum. Микрофоллин (Б). Выпускается в таблетках — в «Мите» содержится по 0,01 микрофоллина, а в «Форте» микрофоллина 0,05. Действующее начало — этинил-эстрадиол.

Rp. Tabulettae Microfollini «forte» N. 50

DS. По 1 таблетке 2—3 раза в день

Применяют при климактерических состояниях; по 1 таблетке 3—6 раз в день при аменорее или олигоменорее; по 1 таблетке 6 раз в день при раке простаты.

Klimakterinum. Климактерин. Выпускается в дражированных таблетках. В одной таблетке содержится: бензойнокислого эстрадиола 25 МЕ, сухого порошка из яичника — 0,03, нитроглицерина 0,0002, теобромина и кофеина по 0,025, фенолфталеина 0,006, фосфорнокислого кальция 0,004.

Rp. Tabulettae Klimakterini 50,0
DS. Принимать (проглатывать целиком)
по 1—2 таблетки 3 раза в день

Показан для профилактики и лечения климактерических состояний

Progesteron. Прогестерон (**Lutocyclinum.** Лютоциклин) (Б). 5—10 мг в день.

Rp. Sol. Progesteroni oleosae 0,5% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 1 мл в мышцу 1 раз в день в течение
4—6 дней

Показан при аменорее, бесплодии, при начинающемся аборте до 1—2 мл в сутки до исчезновения угрожающих симптомов.

Praegninum. Прегнин (**Pregnogalum.** Прегнорал) (Б). 5—10 мг в день.

Rp. Praegnini 0,005
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день под язык в
течение 6—8 дней

Показан при недостаточности функции яичников.

Synoestrolum. Синэстрол (Б). В 1 мг 10 000 ЕД.

Rp. Synoestroli 0,001
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Применяют при недостаточности функции яичников. Курс лечения длится 10—15 дней.

Rp. Sol. Synoestroli oleosae 0,1% 1,0
D. t. d. N. 12 in ampullis
S. Вводить по 1 мл в мышцу

Показан при климактерии.

Rp. Sol. Synoestroli 2% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 3 мл в мышцу ежедневно

Показан при раке предстательной и молочной железы.

Methylandrostendiolum. Метиландростендиол (Б). Выпускается в таблетках по 0,025.

Rp. Methylandrostendioli 0,025

D. t. d. N. 30 in tabulettis

S. По 1 таблетке под язык 2—3 раза в день

Применяется при дисменорее, климактерии.

Tectosteronum propionicum. Тестостерон-пропионат (Б). По 10—25 мг в день.

Rp. Sol. Testosteroni propionici oleosae 2,5%
1,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Водить по 1 мл внутримышечно через каждые 2 дня

Применяют при недостаточности функции половых желез, климактерии у женщины и мужчин.

Methyltestosteronum. Метилтестостерон (Б). По 15—20 мг в день.

Rp. Methyltestosteroni 0,005

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1 таблетке (под язык) 2—3 раза в день

Применяют при климактерии у мужчин, при функциональных маточных кровотечениях.

г) Препараты коры надпочечников

Cortisonum. Кортизон по 0,025—0,05—0,1 внутрь. Во флаконах по 5—10 мл суспензии, содержащей в 1 мл по 0,025 кортизона. Вводят в мышцы.

Rp. Cortisoni 0,025

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день.
С наступлением эффекта дозу уменьшают.

Назначают при ревматизме, полнартрите, лейкозе, болезни Аддисона, пузырчатке, волчанке. Противопоказания см. АКТГ.

Dehydrocortisonum. Дегидрокортизон (*Cortancylum*. Кортанцил. *Meticortenum*: Метикортен) (Б). Дегидрокортизон в 3—5 раз активнее кортизона, выпускается в таблетках по 0,005.

Rp. *Tabulettae Dehydrocortisoni* N. 100
DS. Принимать по 1—2 таблетки 3—4 раза в день

Применение см. Кортизон.

Desoxycorticosteronum aceticum. Дезоксикортикостерон-ацетат (Б). 0,005—0,01 в день.

Rp. *Sol. Desoxycorticosteroni aceticum oleosae*
0,5% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл через 1—2 дня внутримышечно

Назначают при адинамии, гипотонии. Курс лечения 10—12 впрыскиваний.

Cortinum. Кортин. По 1—2 мл под кожу, внутримышечно.

Rp. *Cortini* 1,0
D. t. d. N. 12 in ampullis
S. По 1—2 мл под кожу 1—2—3 раза в день

Применяют при аддисоновой болезни, миастении.

д) Ферментные препараты

Pepsinum. Пепсин 0,3—1,0 (см. *Acidum hydrochloricum dilutum*).

Pancreatinum. Панкреатин 0,5—1,0.

Rp. *Pancreatini* 0,5
D. t. d. N. 15
S. По 1 порошку 3 раза в день после еды

Применяют при ахилии, упадке питания.

Succus Gastricus. Желудочный сок (срок годности 6 месяцев).

Rp. *Succi gastrici* 200,0
DS. По 1 столовой ложке 3 раза в день во время еды

Применяют при ахилии, гастритах.

Регоранаса. Перопанаса. Выпускается в виде драже (ферментный препарат) по 0,1. Срок годности 2 года.

Rp. Regoranasae 0,1

D. t. d. N. 30 in dragée

S. Принимать по 1—2—4 драже 2 раза в день через 1—1½ часа после еды; нужно проглатывать драже целиком, запивая глотком воды

Применяется при ахилии, холециститах, гепатитах, панкреатитах, хронических энтероколитах.

Lydasa. Лидаза. Выпускается в ампулах по 0,1 сухого вещества (ферментный препарат). Срок годности до 1 года.

Rp. Lydasae 0,1

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Содержимое ампулы растворить в 1 мл стерильного 0,5% раствора новокаина и ввести под кожу

Применяется при застарелых контрактурах суставов, рубцах после ожогов и после операций, склеродермии.

Противопоказан при острых и хронических воспалительных процессах.

Ronidasa. Ронидаза. Выпускается в герметически закрытых флаконах по 5,0. Ронидаза — фермент из семенников крупного рогатого скота. Срок годности 1 год.

Rp. Ronidasae 5,0

DS. Наносят 0,5 препарата на смоченную в стерильном физиологическом растворе марлевую салфетку, сложенную в 4—5 слоев, накладывают ее на 16—18 часов на пораженную поверхность и бинтуют по типу компресса. Далее повязку вновь меняют ежедневно в течение 15—60 дней

Применяют для лечения незастарелых рубцов после ожогов, операций, при тугоподвижности суставов, длительно не заживающих ранах.

Противопоказано при злокачественных новообразованиях, туберкулезе, инфекционных заболеваниях.

5. ВИТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ. СРЕДСТВА, УСКОРЯЮЩИЕ (КОАГУЛЯНТЫ) И ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ (АНТИКОАГУЛЯНТЫ) СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ

Vitaminum A. Витамин А. Аксерофтол. Ретинол. Антиксерофтальмический, антиинфекционный витамин. Суточная потребность человека от 1—3 мг до 10—30 мг. В 1 мг 3300 МЕ или ИЕ (международных или интернациональных единиц).

Rp. *Vitami A* 3300 ME
D. t. d. N. 50 in dragée
S. По 3—4 драже в день

Применяют для профилактики и лечения гемералопии (ночная слепота), ксерофтальмии, базедовой болезни, туберкулеза, атеросклероза, почечнокаменной болезни, экземы, фурункулеза, септических заболеваний, кератоза, ихтиоза, сухой себорей, чешуйчатом лишае, ломкости ногтей и волос, в целях ускорения заживления ран, при ожогах и отморожениях, при беременности и послеродовом периоде, постгеморрагической анемии. При А-авитаминозе страдает нервная система, эпителий кожи и слизистых оболочек.

Carotinum. Каротин. Провитамин А (масляный раствор каротина). 1 мл его содержит 1 мг каротина, что соответствует 1660 МЕ витамина А. Выпускается в виде жидкого концентрата, содержащего в 1 мл 2—2,5 мг (3320—4150 МЕ) кристаллического препарата.

Rp. *Carotini* 1,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. По 1 мл под кожу ежедневно

Показания см. Витамин А.

Carotonum. Каротон.

Водно-коллоидный раствор каротина. Выпускается во флаконах по 5 мл и по 1 мл в ампулах.

Rp. *Carotoni* 5,0
DS. Смоченные тампоны прикладывать к пораженной коже

Применяют при ожогах, отморожениях, пролежнях; в виде капель при поражении роговицы, конъюнктивы.

Vitaderm. Витадерм. Мазь, содержащая каротин.

Rp. *Vitadermi* 30,0
DS. Подогреть до расплавления и наносить на пораженную поверхность

Применяют при ожогах, отморожениях, язвах, пролежнях, экземе.

Citralum. Цитраль (аналог витамина А).

Rp. Sol. Citrali spirituosae 1% 30,0

DS. По 10—20 капель 2—3 раза в день

Применяют при гипертонической болезни. При кератитах, конъюнктивите в виде водно-спиртового раствора (1:10 000) по 1—2 капли в глаз.

Vitaminum B₁. Витамин B₁.

Thiaminum bromatum. Тиамин-бромид (антиневритический).

Минимальная суточная потребность человека 2—3 мг. Лечебная суточная доза 10—50 мг.

Rp. Sol. Thiamini bromati 0,6% 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 1 мл ежедневно внутримышечно, внутривенно

Применяют при различных заболеваниях нервной системы, при невритах, невралгиях, полиомиелите, при всех формах болезни бери-бери, пониженном артериальном давлении, дистрофии миокарда, диабете, подагре, неукротимой рвоте, анемии, гипертиреозах, атонии желудка, язвенной болезни, дерматозах, чешуйчатом лишае, ранениях, ожогах, эндартериитах, инфекциях, работающим в горячих цехах. При отравлении сероуглеродом, тетраэтилсвинцом, ртутью, метиловым алкоголем, мышьяком.

Rp. Thiamini bromati 0,01

Sacchari albi 0,3

M. f. pulvis

D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 3—5 раз в день

Показания те же.

Rp. Thiamini bromati 0,015

Luminali 0,03

Analgini

Pyramidoni \overline{aa} 0,25

M. f. pulv.

D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяют при невралгиях, ишиасе, радикулите. Пропись И. И. Сивкова.

Vitaminum B₂. **Riboflavinum.** Рибофлавин. Суточная потребность человека 2 мг. Лечебная суточная доза 10—12 мг. Срок годности 1 год при температуре 20°.

Rp. Riboflavini 0,005
Sacchari albi 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3—6 раз в день

Применяют при гипорибофлавинозе, кератитах, упорных конъюнктивитах, старческой катаракте, себорее, кожном зуде, сикозе, дистрофии миокарда, диабете, тиреотоксикозах, при различных заболеваниях печени, болезни Боткина, малокровии, анацидном гастрите, лучевой болезни, инфекциях, трофических язвах, при длительном лечении антибиотиками.

Vitamin B₆. Витамин B₆ (Б). (Pyridoxin. Пиридоксин).
Суточная потребность человека 2—10 мг. Лечебная суточная доза до 100 мг.

Rp. Pyridoxini 0,025
Sacchari 0,25
M. f. pulvis
D. t. d. N. 15
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Применяют при токсикозах беременных, эклампсии, экземе, кожном зуде, лейкопении, гепатитах, болезни Боткина, псориазе, гипохромной анемии, паркинсонизме, пеллагре, лучевой болезни, при гастритах с секреторной недостаточностью, при лечении больных антибиотиками, фтивазидом и сульфаниламидами.

Rp. Sol. Pyridoxini 2,5% (5%) 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл внутримышечно 1—2 раза в день

Показания те же.

Acidum folicum. Фолиевая кислота по 0,01—0,03 на прием.

Rp. Acidi Folicum 0,02
Sacchari 0,25
M. f. pulv.
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2 раза в день

Применяется при бирмеровской анемии, макроцитарной гиперхромной анемии, при спру, лейкопении и гранулоцитопении, болезнях печени при назначении сульфаниламидов, антибиотиков, облучении лучами Рентгена, отравлении бензолом.

Vitaminum B₁₂. Витамин B₁₂ (цианокобаламин). Выпускается в ампулах по 1 мл с содержанием по 30, 100, 200, 500 и 1000 γ (микрограмм = 0,000001) кристаллического вещества.

Rp. Vitamini B₁₂ 100 γ (200)
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл через 2—3 дня внутримышечно

Применяется при бирмеровской анемии, при пищевой гиперхромной макроцитарной анемии, при спру, лучевой болезни, гепатитах, болезни Боткина, полиневритах, полкомиелите, псориазе и интоксикациях.

Cholinum chloratum. Холин-хлорид. Относится к комплексу витаминов В. Выпускается в ампулах по 10 мл 20% раствора и во флаконах по 100 мл 20% раствора для приема внутрь.

Rp. Sol. Cholini chlorati 20% 10,0
D. t. d. N. 12 in ampullis
S. Вводить внутривенно медленно капельным методом со скоростью не более 30 капель в минуту (в виде 1% раствора в 5% растворе глюкозы)

Применяют при острых и хронических гепатитах, атеросклерозе.

Rp. Sol. Cholini chlorati 20% 100,0
DS. Принимать по 1 чайной ложке
3—5 раз в день

Показания те же.

Vitamin C. Acidum ascorbinicum. (Противоцинготный витамин). Суточная потребность человека 30—100 мг. Лечебные дозы аскорбиновой кислоты 0,05—0,1—0,5 до 1,0 в день для взрослого. Срок годности в таблетках 1 год. Срок годности растворов в ампулах 6 месяцев.

Rp. Sol. Acidi ascorbinici 5% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1—2 мл внутримышечно или внутривенно 1—2 раза в день

Назначается для профилактики и лечения цинги, при геморрагических диатезах, климактерических кровотечениях, гипергиреозе, атеросклерозе, сердечной слабости, при поражении сердечной мышцы, при декомпенсации для усиления диуреза, ахилии, нефритах, при

инфекциях: пневмонии, ревматизме, туберкулезе, дифтерии, коклюше, малярии, при болезнях печени, гепатитах, болезни Боткина, для ускорения заживления ран, в пред- и послеоперационном периоде, при фурункулезе, интоксикациях, при септических заболеваниях, лучевой болезни, отравлениях мышьяком, свинцом, бензолом. При тошноте, неукротимой рвоте принимать глотками 0,5% раствор аскорбиновой кислоты.

Повторное внутривенное введение аскорбиновой кислоты в концентрированном растворе глюкозы может способствовать увеличению свертывания крови.

Rp. Acidi ascorbinici 0,05 (0,1—0,35)
D. t. d. N. 30 in tabulettis
S. По 1 таблетке 4—6 раз в день

Показания те же.

Vitaminum PP. Acidum nicotinicum. Никотиновая кислота. Никотинамид (Б) (противопеллагрический). Лечебные дозы 0,1—0,3 в день. Минимальная суточная потребность человека 15—25 мг.

Rp. Acidi nicotinicici 0,05
Sacchari 0,3
M. f. pulvis. D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяется для профилактики и лечения всех случаев пеллагры, при невритах, невралгиях, диабете, гепатитах, нефритах, гипосекреции желудка, эндартериитах, склеродермии, при длительно не заживающих язвах, лучевой болезни, при отравлении сульфаниламидами, талием, свинцом, бензолом.

Rp. Sol. Acidi nicotinicici 1% (5%) 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. По 1 мл внутривенно, медленно 1—2 раза в день в течение двух недель

Показания те же.

Rp. Acidi ascorbinici 0,2
Acidi nicotinicici 0,05
Riboflavini 0,005
Glucosi 0,5
M. f. pulvis
D. t. d. N. 30
S. Принимать по 1 порошку 2—3 раза в день

Применяется при авитаминозах, гиповитаминозах, ахилии

Vitamin D. Витамин D. Кальциферол. Эргокальциферол. (Антирахитический витамин). В 1 мг содержится 40 000 ЕД. Лечебная доза для взрослого 100 000—150 000 ЕД. Суточная потребность для здоровых детей от 1 года до 14 лет 500—1000 ЕД.

Solutio vitamini D oleosae. Витамин D в масляном растворе. **Vitaminolum.** Витаминол. В 1 мл, т. е. в 30 каплях, содержится 50 000 ЕД.

Rp. Sol. Vitamini D oleosae 35,0
DS. По 10—15 капель на ложку теплого молока или на кусок черного хлеба 2 раза в день

Применяется для профилактики и лечения рахита, остеомаляции, тетании, волчанки, туберкулеза легких, псориаза, при трудно заживающих переломах, остеомиелитах, при септических послеродовых заболеваниях.

Курс лечения 1½—3 месяца с перерывами под контролем уровня кальция крови.

Противопоказан при артериосклерозе, болезнях печени и почек.

Solutio vitamini D spirituosae. Витамин D в спиртовом растворе, 1 мл (т. е. 50—60 капель) содержит 200 000 ЕД.

Rp. Sol. Vitamini D spirituosae 35,0
DS. По 1—2 капли на молоке 2—3 раза в день

Показания см. Витамин D в масляном растворе.

Oleum Jecoris Aselli. Рыбий жир. Жир из печени трески. Содержит витамина А в 1 мл от 100 до 500 ЕД и витамина D в 1 мл от 60 до 80 ЕД. Суточная доза 30,0—45,0 рыбьего жира.

Rp. Olei Jecoris Aselli 200,0
DS. По 1 десертной или столовой ложке 3 раза в день перед едой

Применение см. Витамин А и Витамин D.

Ol. Jecoris Aselli vitaminisati. Витаминизированный рыбий жир, активнее натурального в 5—7 раз. Суточная доза 4,0—5,0.

Rp. Olei Jecoris Aselli vitaminisati 100,0
DS. По 1 чайной ложке 1 раз в день перед едой

Vitaminum E. Токоферол (Erevitum. Эревит. Erythralium. Эфинал). 0,3% токоферола в масле по 1—2 мл внутрь на день.

Rp. *Vitami E* 30,0

DS. По 20 капель на ложку теплого молока 2 раза в день

Показан при токсикозах беременности, гипоплазии половых органов, аменорее, импотенции, бесплодии, мышечной дистрофии.

Коагулянты. Vitaminum K. Витамин К. Филлохинон. Антигеморрагический витамин. По 2—5 мг в сутки.
Vicasolum. Викасол 0,01—0,02. Препарат витамина К.

Rp. *Sol. Vicasoli* 0,3% 5,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 3—5 мл в мышцы

Применяется для профилактики и лечения кровотечений различной этиологии: при паренхиматозных, носовых, желудочных, гинекологических, при кровохаркании, тонзиллэктомиях, ранениях, геморрагических диатезах, болезни Боткина, хронических заболеваниях печени.

Rp. *Vicasoli* 0,01

D. t. d. N. 6 in tabulettis

S. По 1 таблетке 1—2 раза в день

Показания те же.

Vitamin P. Витамин Р. Цитрин (Б).

Rp. *Vitami P* 0,1

Ac. ascorbinici 0,2

Sacchari 0,25

M. f. pulv.

D. t. d. N. 20

S. По 1 порошку 2—5 раз в день

Применяется для профилактики и лечения цинги, лучевой болезни, при геморрагических диатезах, гломерулонефритах, гипертонической болезни.

Extractum Urticae fluidum. Жидкий экстракт крапивы. Содержит витамины С, К и каротин.

Rp. *Extracti Urticae fluidi* 50,0

DS. По 30—50 капель 3 раза в день до еды

Показан при легочных, маточных, почечных, кишечных кровотечениях.

Extractum herbae Millefolii fluidi. Жидкий экстракт травы тысячелистника. Содержит алкалоид ахиллеин, каротин, витамин С.

Rp. Extr. herbae Millefolii fluidi

Extr. Urticae fluidi \overline{aa} 30,0

MDS. 30—40 капель 3 раза в день до еды

Показан при кровотечениях—маточных, кишечных.

Rutinum. Рутин по 0,06—0,015 внутрь.

Rp. Rutini 0,02

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 2 таблетки 2—3 раза в день

Применяется для уменьшения проницаемости капилляров, тромбопении.

Rutaminum. Рутамин. Растворимый препарат рутина. В 1 мл содержится 0,05 рутина и 0,075 новокаина-основания.

Rp. Rutamini 1,0

D. t. d. N. 30 in ampullis

S. По 1 мл 1 раз в день

Применяется при заболеваниях, сопровождающихся повышенной проницаемостью капилляров; при кровоизлияниях в мозг, сетчатку глаза, при скарлатине, кори, сахарном диабете, пурпуре и др.

Urutinum. Урутин. Выпускается в ампулах по 1 мл (0,025 рутина и 0,05 уротропина в 1 мл дистиллированной воды). Срок годности 1 год.

Rp. Urutini 1,0

D. t. d. N. 30 in ampullis

S. По 1 мл под кожу или в мышцы один раз в день

Показания см. Рутин, Рутамин.

Tinctura Arnicae. Настойка арники.

Rp. T-гае Arnicae 30,0

DS. По 30—40 капель 3 раза в день до еды

Показан при кровотечениях в гинекологической практике.

Thrombinum. Тромбин. Выпускается в ампулах в сухом виде. Содержимое ампулы растворяют в 5—10 мл

стерильного физиологического раствора, смачивают им тампон и накладывают на кровоточащую поверхность при капиллярных кровотечениях: из носа, десен, костной полости и т. п.

Gelatina alba. Желатина (клей животных).

Rp. Sol. Gelatinae albae 10% 10,0 (25,0—50,0)
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 10—25 мл под кожу бедра в подогретом виде

Применяется для повышения свертываемости крови при геморрагических диатезах, желудочных и кишечных кровотечениях.

Антикоагулянты. Нерагинит. Гепарин. Во флаконах по 5 мл (в 1 мл 5000, 10 000 и 20 000 ЕД).

Rp. Нерагини 5,0
DS. По 1—2 мл (5000, 10 000 ЕД) внутривенно, внутримышечно, подкожно через 4—12 часов, затем дозу уменьшают

Применяют при операциях на кровеносных сосудах, при переливании крови, инфаркте миокарда, эмболиях, тромбозах, эндартериите. Во избежание кровотечений проверяют протромбин в крови.

Dicumarinum. Дикумарин (А). 0,1—0,2.

Rp. Dicumarini 0,1
Sacchari 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 2 раза в день

Применяют при инфаркте миокарда, эмболии, тромбофлебите, коронарной недостаточности. Лечение проводить в стационаре. Систематически проверяют содержание протромбина в крови и эритроцитов в моче.

Противопоказания: при злокачественных опухолях, открытых ранах, язвенной болезни, первые дни после родов, гемофилии, менструации, при нарушении функций почек и печени и при лечении сульфаниламидами.

Neodicumarinum (s. Pelentanum). Неодикумарин (Пелентан) (А). 0,2—0,3 до 0,6 в сутки.

Rp. Neodicumarini (s. Pelentani) 0,2 (0,05)
Sacchari 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 1—3 раза в день

Обязателен контроль протромбина в крови больного и эритроцитов в моче.

Показания см. Дикумарин, Гепарин.

Rp. Neodicumarini (s. Pelentani) 0,1—0,3
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 1—3 раза в день, далее дозу уменьшают

Показания те же.

Rp. Tabulettae Pelentani N. 100
DS. Принимают по 1 таблетке 2—3 раза в день

Показания см. Дикумарин.

Схема лечения больных с острым инфарктом миокарда антикоагулянтами в клинике факультетской терапии I Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова.

1—2-й день болезни—сразу вводится 10 000 ЕД (2 мл) гепарина внутривенно и далее через каждые 4 часа вводят внутримышечно по 10 000 ЕД (2 мл). Всего 6 инъекций в сутки—pro die 60 000 ЕД гепарина.

3—4-й день—вместо гепарина назначают неодикумарин (или его синоним импортный препарат пелентан) по 0,2 три раза в день.

5-й день болезни и последующие дни (4—6 недель) назначают дикумарин по 0,1 один-два-три раза в день в зависимости от протромбинового времени.

В случае несвоевременного получения дикумарина больные получают неодикумарин или пелентан по 0,2 три раза в день или по 0,3 два раза в день в течение 4—6 недель.

Необходимо строго следить за протромбиновым временем (предел снижения его 40—35%) и производить исследования мочи из-за возможности появления гематурии.

В этих случаях надо либо уменьшить дозировку антикоагулянтов, либо временно (на 1—2 дня) отменить их.

После проведенного курса лечения отмену антикоагулянтов следует проводить постепенно, уменьшая дозировку в течение 3—4 дней.

Phenylinum. Фенилин (А). 0,03—0,05 до 0,1.

Rp. Phenylini 0,03
Sacchari 0,25
M. f. p. D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Применяется для профилактики и лечения инфаркта миокарда, эмболий, тромбозов—под контролем протромбина крови.

Sinantrinum S-1. Синантрин С-1 — аналог гепарина. Выпускается в ампулах. Вводят в вену, в мышцы и под кожу по 0,5—1—3 мл через 4—6 часов в течение 3 суток. Курс лечения 18—25 мл.

Применяется для профилактики и лечения тромбозов, эмболий, инфарктов миокарда, при переливании крови.

Hirudo medicinalis. Медицинские пиявки.

Rp. Hirudinis medicinalis N. 6
DS. Прикладывают по 3 пиявки за каждое ухо, к коже затылка или на область сердца. Пиявки, насыщая кровь, одновременно выделяют из своих ротовых желез в кровь человека фермент Hirudin — антикоагулянт.

Назначают при гипертонической болезни, инфаркте миокарда, эмболии, тромбофлебите.

Natrium citricum pro injectione. Натрий лимоннокислый, цитрат натрия. К переливаемой крови добавляют 4—5% для предотвращения ее свертывания.

Антикоагулянты противопоказаны при геморрагических диатезах, язвенных заболеваниях, злокачественных новообразованиях, при нарушении функции печени и почек.

6. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВОТВОРЕНИЕ

Ferrum reductum. Железо восстановленное. Темно-серый порошок, по 0,3—1,0 (до 6,0 в день).

Rp. Ferri reducti 0,5 (1,0)
D. t. d. N. 50 in capsulis amylaceis
S. По 1 капсуле 3 раза в день после еды, запивая разведенной соляной кислотой, по 15—20 капель на рюмку воды или 30 мл 0,5% раствором аскорбиновой кислоты

Применяют при малокровии.

Rp. Ferri hydrogenio reducti 0,5
Sacchari lactis 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 24
S. По 1 порошку 3—5 раз в день.
Порошок принимается на белом хлебе

Rp. Ferri reducti 1,0
Acidi ascorbinici 0,1
M. f. pulv.
D. t. d. N. 50 in capsulis gelatinosis
S. По 1 капсуле 3—6 раз в день

Показания те же.

Ferrum lacticum. Железо молочнокислое закисное. Лактат железа. Зеленовато-белый порошок по 0,3—1,0.

Rp. Ferri lactici 0,25
D. t. d. N. 20 in capsulis amylaceis
S. По 1 капсуле 3 раза в день после еды

Применяют при малокровии.

Ferrum sulfuricum oxydulatum. Железо сернокислое закисное. Сульфат закиси железа. Бледно-зеленый порошок по 0,3—1,0.

Rp. Ferri sulfurici oxydulati 0,3
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяют при малокровии.

Pilulae Blandi (s. Tabulettae Blandi). Бло — драже (таблетки Бло).

В каждой таблетке содержится 0,028 железа сернокислого закисного.

Rp. Pilulae Blandi N. 50
DS. По 1 пилюле 3—6 раз в день после еды

Haemostimulinum. Гемостимулин (препарат крови скота с прибавлением железа и меди). Срок хранения 1 год.

Rp. Haemostimulini 0,3
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день во время
еды, запивая раствором разведенной
соляной кислоты

Применяют при анемиях.

Мышьяк (неограниченные соединения).

Acidum arsenicosum anhydricum. Мышьяковистая кис-
лота. Мышьяковистый ангидрид. Белый мышьяк (А).
0,003 (0,01).

Rp. *Acidi arsenicosi* 0,1
Extr. et pulv. rad. *Liquiritiae* q. s.
Ut f. pilulae N. 100
DS. Принимать по 1 пилюле 3 раза в день;
через каждые три дня дневную дозу
увеличивать на 1 пилюлю до 7—8 пи-
люль в день, а затем уменьшать число
принимаемых пилюль в том же по-
рядке

Применяют при упадке питания, малокровии, неврастении, психо-
зазе.

Rp. *Acidi arsenicosi* 0,06
Ferri lactici 6,0
Extr. et pulv. rad. *Liquiritiae* q. s.
Ut. f. pilulae N. 60
DS. По 1—2 пилюли 3—6 раз в день

Показания те же.

Rp. *Acidi arsenicosi* 3,0
Cocaini hydrochlorici
Thymoli $\bar{a}\bar{a}$ 0,5
Ol. camphorati q. s.
Ut. f. pasta
DS. Положить туго в дупло зуба на 2 часа

Применяют для девитализации пульпы при пломбировании ка-
нала зуба.

Liquor arsenicalis Fowleri. *Liquor Kalii arsenicosi*.

Раствор мышьяковистокислого калия (А). 3 (10) капель.

Rp. Liquoris arsenicalis Fowleri 10,0
DS. По 5 капель 3 раза в день

Применяют при малокровии, при постепенном повышении дозы до 10—15 капель и более—при лейкозах.

Natrium arsenicum. Натрий мышьяковокислый. Арсенат натрия (А). 0,003 (0,01).

Rp. Sol. Natrii arsenici 1% 1,0
D. t. d. N. 30 in ampullis
S. Вводить подкожно ежедневно по 0,1 мл, через каждые три дня дозу повышать на 0,1 мл до 0,6—0,8 мл в день; а затем количество вводимого вещества уменьшать в том же порядке до 0,2 мл в день

Применяют при малокровии, псориазе, хронической экземе.

Rp. Natrii arsenicici 0,03
Chinini hydrochlorici 3,0
Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s.
Ut. f. pilulae N. 60
DS. По 1 пилюле 2—3 раза в день

Применяют при легких формах тиреотоксикоза.

Duplex. Дуплекс. Состав: Natrium arsenicum Strychninum nitricum \overline{aa} 0,001, Aq. destillatae 1,0.

Rp. Duplicis 1,0
D. t. d. N. 30 in ampullis
S. Для подкожных впрыскиваний (общетонизирующее)

Camponum (син. Нералонум). Камполон. В 1 мл содержится 1,3 μ г витамина В₁₂.

Rp. Camponi 2,0
D. t. d. N. 30 in ampullis
S. По 2 мл внутримышечно ежедневно (для уменьшения болей одновременно с камполоном в шприц набирают 1 мл 1% раствора новокаина)

Применяется при злокачественном малокровии, гепатитах, циррозах печени, атрофических гастритах.

Antianaeminum. Антианемин. По 2 мл в ампулах.

Rp. Antianaemini 2,0

D. t. d. N. 20 in ampullis

S. По 2—4 мл внутримышечно ежедневно.
Срок лечения 20—50 дней

Применяется при злокачественном малокровии, гемолитической анемии, хлорозе.

Pyloginum (s. Gastrinum). Пилорин.

Rp. Pylogini 100,0

D. t. d. N. 4

S. По 2 чайные ложки 2—3 раза в день.
Запивать разведенной соляной кислотой, 15—20 капель на рюмку воды

Применяется при злокачественном малокровии.

Gastrinum. Гастрин. Выпускается в таблетках по 0,4 препарата. Срок годности 2 года.

Rp. Gastrini 0,4

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. Принимать по 1—2 таблетки 3 раза в день

Применяется при разных формах анемии в сочетании с другими антианемическими средствами—витамины В₁₂, камполон.

Fercovenum. Ферковен. Выпускается в ампулах или герметически закрытых флаконах по 5 мл (в 1 мл содержится 20 мг железа и 0,09 мг кобальта). Срок годности 2 года.

Rp. Fercoveni 5,0

D. t. d. N. 15 in ampullis

S. Вводить внутривенно, медленно (первые две инъекции по 2 мл, последующие— по 5 мл), один раз в сутки

Назначается в течение 10—15 дней при гипохромной анемии.
Противопоказан при болезнях печени, гипертонической болезни II и III стадии и грудной жабе.

Coamidum. Коамид. Выпускается в порошке и в виде 1% раствора в ампулах по 1 мл.

Комплексное соединение микроэлемента кобальта с амидом никотиновой кислоты.

Rp. Sol. Coamidi 1% 1,0
D. t. d. N. 30 in ampullis
S. Вводить под кожу по 1 мл ежедневно в течение 3—4 недель

Применяется при позднем хлорозе, ахилической хлоранемии, анемии на почве кровотечения, при хронических лейкозах, особенно лимфолейкозах, гипопластической анемии.

Natrium nucleinicum. Натрий нуклеиновокислый. По 0,1—0,2 на прием.

Rp. Natrii nucleinici 0,1
Sacchari 0,25
M. f. pulv. D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяется при лейкопении и агранулоцитозе.

Rp. Sol. Natrii nucleinici 5% 25,0
D. Sterilisetur!
S. По 2—3 мл внутримышечно ежедневно

Показания те же.

Pentoxylum. Пентоксил (Б).

Rp. Pentoxyli 0,2 (0,3)
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3—4 раза в день во время еды

Применяется при агранулоцитарной анемии, лейкопении.

6-Mercaptopurinum. 6-Меркаптопурин (А). Выпускается по 0,05 в таблетках.

Rp. 6-Mercaptopurini 0,05
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. Применяется внутрь из расчета по 0,002—0,0025 ежедневно на 1 кг веса больного. Суточную дозу дают в 2—3 приема в течение 3—4 недель.
В случае необходимости—о чем судят по клиническому течению болезни—дозу осторожно повышают до 0,005 на 1 кг веса

Применяется при остром и подостром лейкозе, при лейкомиическом и лейкопеническом остром и подостром лейкозе, под контролем состава крови.

Thesapum. Тезан (Б). По 0,005—0,01—0,02 на прием

Rp. Thesani 0,01
Sacchari 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3—4 раза в день

Применяется при лейкопении, агранулоцитозе.

Rp. Sol. Thesani 0,5% 1,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. По 1—2 мл внутримышечно 3 раза в день

Показания те же.

Urethapum. Уретан. По 4,0—6,0 в сутки.

Rp. Urethani 1,0
D. t. d. N. 20 in capsulis gelatinosis
S. По 1 капсуле 4 раза в день

Назначают при лечении хронических лейкозов, 60,0—100,0 на курс лечения.

Novembichinum. Новэмбихин (А). По 10 мг в ампулах.

Rp. Novembichini 0,01
D. t. d. N. 5 in ampullis
S. В ампулу вливают шприцем 10 мл рингеровского раствора и вводят по 5—10 мл внутривенно 3 раза в неделю

Назначают при ранних стадиях лимфогранулематоза, хронических лейкозах.

Dorapum. Допан (А). Выпускается в таблетках по 1—2—5 мг.

Rp. Dorani 0,002
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 4—6 таблеток на прием после еды один раз в 4—6 суток. Всего 5—7 раз

Назначают при хронической миелоидной лейкемии с резко выраженной спленомегалией и с небольшим увеличением общего числа лейкоцитов и лимфогранулематозе—под контролем количества лейкоцитов в крови.

Myelosanum. Миелосан (s. Myleganum, Милеран) (А). Выпускается в таблетках по 0,002; суточная доза 0,004—0,006—0,008.

Rp. Myelosani 0,002

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке 2—3 раза в день

При лейкоцитозе (более 200 000 в 1 мм³) и со значительной спленомега-лией дозу увеличивают до 4 таблеток в сутки. По мере снижения числа лейкоцитов до 100 000—120 000 в 1 мм³ суточная доза уменьшается до 2 таблеток, а при лейкоцитозе в 20 000—30 000 в 1 мм³ — по 1 таблетке в сутки. При снижении числа лейкоцитов до 10 000—15 000 в 1 мм³, что устанавливается еженедельно, лечение миелосаном необходимо прекратить

Назначают миелосан при хроническом миелолейкозе. Противопоказан при острых и подострых лейкозах, обострении хронического миелолейкоза, если он протекает по типу острого лейкоза, при алейкемических и сублейкемических формах хронического лейкоза, при выраженной тромбопении.

Sarcolysinum. Сарколизин (А). Выпускается в таблетках по 0,01 и в запаянных ампулах емкостью 20 мл, содержащих по 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 препарата. Высшая разовая доза для взрослого на курс 0,25. Хранится в холодном месте. Срок годности 1½ года.

Rp. Sarcolysini 0,01

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. В ампулу вливают 10—20 мл стерильного физиологического раствора, слегка подогревают до растворения и вводят внутривенно 1 раз в неделю. Всего на курс 4—7 вливаний.

Rp. Sarcolysini 0,01

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. По 1 таблетке на прием после еды

Применяется при семиномах и их метастазах, ретикулосаркомах, злокачественных ангиоэндотелиомах, костных опухолях Юинг-

га — под строгим контролем состава крови, под наблюдением врача и только в условиях стационара.

Сарколизин противопоказан при кахексии, выраженной анемии, лейкопении, тяжелых болезнях сердца, печени и почек.

Neosidum. Неоцид. Получен из культуральной жидкости определенного микроорганизма. Выпускается во флаконах по 100 мл. Сохраняется при температуре 5—10°. Срок годности 6 месяцев. На курс лечения 2—4 л.

Rp. Neosidi 100,0

DS. Принимать внутрь по 5 мл 3 раза в день после еды в течение недели; по 10 мл — 3 раза в день в течение двух недель. Спустя 7 дней курс повторяют. Затем, после недельного перерыва проводят 3-й курс по той же схеме

1. Применяется при злокачественных новообразованиях.
2. По 20—50 мл вводят в виде клизмы (при раке прямой кишки).
3. Неоцид применяется местно в виде ванночек, тампонады на 12—15 часов. При раке женской половой сферы.

Colchaminum. Колхамин (или **Otainum.** Омаин) (А). Колхамин — алкалоид, задерживает развитие злокачественных образований и лейколимфопоза. Выпускается в виде 0,5% мази в банках по 25, 50 и 100,0. Срок годности 1 год.

Rp. Ung. Colchamini 50,0

DS. Поверхность опухоли покрывают 1,0—1,5 мази, закрывают стерильной марлей и заклеивают лейкопластырем. Повязку меняют ежедневно. Курс лечения 20—35 дней

Применяют при раке кожи I и II стадии; противопоказан при раке кожи III и IV стадии. Возможны осложнения — лейкопения, понос и другие нежелательные явления.

Antiverrucinum. Антиверруцин. «Антиверруцин-паста» состоит из взвеси в дистиллированной воде 88 ч. углекислого кальция и 12 ч. окиси кальция. «Антиверруцин-порошок» — измельченный углекислый кальций. Выпускается в банках по 200,0.

Rp. Antiverrucini-pastae 50,0

DS. Наносят, втирая 2—3 раза в день, пасту на бородавки, папилломы или кондиломы и отчасти на окружающую здоровую кожу

Остроконечные кондиломы влагалища смазывают 2—3 раза в неделю «антиверруцин-пастой», после чего припудривают «антиверруцином-порошком». Излеченные кондиломы продолжают присыпать в течение 1—2 месяцев.

**VI. ПРОПИСИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
С ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ, АНТИСЕПТИЧЕСКИМ
И ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ**

1. АНТИБИОТИКИ И ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА

1. *Penicillinum crystallisatum pro injectionibus*. Пенициллин кристаллический для инъекций — в 1 мг 1500 ЕД. Выпускается во флаконах по 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 000 000 ЕД. Хранится в сухом помещении при комнатной температуре. Срок годности 2 года. Растворы хранятся в прохладном месте не более 1—2 дней. Разовая доза пенициллина от 50 000 до 300 000 ЕД. Суточная от 300 000 до 1 000 000—2 000 000 ЕД.

2. *Penicillinum-natrium* (или *Kalium*) *pro injectionibus*. Пенициллин-натриевая соль или калиевая соль для инъекций содержит в 1 мг 900 ЕД. Выпускается во флаконах по 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 и 500 000 ЕД. Хранится в прохладном месте при температуре не выше 10°. Срок годности 6 месяцев. Раствор хранится 1—2 дня при тех же условиях.

3. *Penicillinum-Calcium*. Пенициллин-кальций, кальциевая соль пенициллина. Выпускается в стеклянных банках для наружного применения. В 1 мг не менее 500 ЕД. Хранится в сухом помещении при температуре не выше 10°. Срок годности 6 месяцев.

Rp. *Penicillini crystallisati*
(*pro injectionibus*) 300 000 ЕД
(или *Penicillini-natrii* или *Penicillini-Kalii*
pro injectionibus)
D. t. d. N. 3 *in vitro originale*

S. Пенициллин растворить непосредственно во флаконе в 6 мл 0,5% или 1% раствора новокаина (каждый мл раствора должен содержать 50 000 ЕД пенициллина) и вводить в мышцы наружного верхнего квадранта ягодицы

Назначают при крупозной пневмонии и пневмониях вообще, плеврите, абсцессах легкого, ангине, дифтерии, скарлатине, гриппе, ревматизме, менингите, мастите, остром нефрите, возвратном тифе, остеомиелите, сибирской язве, фурункулезе, роже, пиодермии, гонорее, раневых инфекциях, полиомиелите по 200 000—300 000 ЕД 2—3 раза в день в течение 4—8 дней. При септическом эндокардите по 150 000—200 000 ЕД через 3—4 часа сроком от 2 до 4 месяцев. Для лечения сифилиса по 50 000 ЕД каждые 3 часа, курсовая доза пенициллина для человека 60 кг веса от 4 800 000 ЕД до 7 200 000 ЕД, что зависит от формы сифилиса; при ожогах II степени на обожженную поверхность накладывают салфетки, смоченные раствором пенициллина с новокаином (100 000 ЕД пенициллина на 100 мл 0,25% раствора новокаина, а поверх них четырехслойно салфетки, смоченные синтомициновой эмульсией).

Rp. Penicillini-natrii 200 000 ED
Sol. Natrii chlorati 0,85% · 10,0
MDS. По 2—3 капли в глаз (конъюнктивиты), а по 4—6 капель в каждую половину носа (риниты). Для промывания каналов зуба (при периодонтитах)

Rp. Penicillini-calcii 300 000 ED
Streptocidi albi subtilissimi 3,0
M. f. pulvis
DS. Втягивать в нос 3—5 раз в день

Применяется при ринитах.

Rp. Penicillini-calcii 100 000 ED
Lanolini
Vasellini aa 15,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать пораженную кожу, раны

Применяется при ожогах, инфицированных ранах.

Novocillinum. Новоциллин. Суспензия новокаиновой соли пенициллина в персиковом масле. В 1 мл суспензии 300 000 ЕД пенициллина и 0,12—0,13 новокаина-основания.

Rp. Novocillini 5,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить внутримышечно по 1 мл 1—2
раза в сутки в подогретом виде
Перед употреблением тщательно
взбалтывать

Показания см. Пенициллин.

Bicillinum. Бициллин (**Extencillinum.** Экстенциллин)
(аналог пенициллина) по 300 000—600 000 и 1 200 000 ЕД
во флаконах. Срок годности при 20° 1 год.

Rp. Bicillini 300 000 ЕД

D. t. d. N. 4 in vitro originale

S. Во флакон с бициллином вводят 2 мл
стерильной дистиллированной воды и
перемешивают до получения равномер-
ной взвеси. Вводят всю дозу один раз в
неделю в ягодичные мышцы.

Показания см. Пенициллин.

Phenoxymethylpenicillinum. Феноксиметилпенициллин.
Препарат не разрушается кислотой желудочного сока.
Выпускается в таблетках по 200 000 и 100 000 ЕД. Хра-
нить при температуре не выше 20°.

Rp. Phenoxymethylpenicillini 200 000 ЕД

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. Принимать внутрь по 1 таблетке за
1 час до еды 3—4 раза в день

Применяется при инфекционных заболеваниях, вызванных чув-
ствительными к пенициллину микроорганизмами; см. Пенициллин
кристаллический.

При пенициллинотерапии возможны осложнения: головная боль,
повышение температуры, аллергические реакции, ангионевротический
отек, дерматиты с зудом, миалгии, острый отек легкого (кровохар-
канье), энтериты; изъязвления слизистой рта, зева, пищевода, «мо-
лочница», возможны судороги при введении в вену или в сонную
артерию, эозинофилия.

В случае надобности в связи с интоксикацией применяют ди-
медрол, диазолин, эфедрин, адреналин, кальций.
При длительном лечении антибиотиками назначают одновременно
витамины: В₁, В₂, С, РР.

Estolinum. Экмолин. Выпускается во флаконах по
10 мл. Срок годности 2 года.

Rp. Estolini 10,0

DS. По 4—6 капель в каждую половину носа 3 раза в день или в виде ингаляции 0,5 мл эсмолина на 5 мл физиологического раствора

Применяется для профилактики и лечения гриппа.

Estopovocillinum I. Экмоновоциллин I. Состоит из новокаиновой соли пенициллина по 300 000 или 600 000 ЕД и по 2,5 и 5 мл эсмолина.

Estopovocillinum II. Экмоновоциллин II—из смеси новокаиновой соли пенициллина 300 000 или 600 000 ЕД с натриевой или калиевой солью кристаллического пенициллина 100 000 или 200 000 ЕД и эсмолина 2,5 или 5 мл. Срок годности 2 года.

Перед применением оба препарата смешивают и вводят внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодицы взрослым—экмоновоциллин I—300 000—600 000 ЕД и экмоновоциллин II по 400 000—800 000 ЕД один раз в сутки; это обеспечивает терапевтическую концентрацию пенициллина в крови 30—36 часов.

Показания см. Пенициллин.

Biomycinum hydrochloricum. Биомицин солянокислый (син. Аугеомисинум. Ауреомицин s. **Chlortetracyclinum.** Хлортетрациклин) от 100 000 до 500 000 ЕД на прием. Максимальная суточная доза для взрослого человека 2 000 000 ЕД (2,0 чистого веса). На курс от 15 000 000 ЕД до 35 000 000 ЕД (от 15,0 до 35,0 чистого веса). Срок годности 1 год.

Rp. Biomycini hydrochlorici 100 000 ЕД
(150 000 ЕД)

D. t. d. N. 20 in tabulettis (или в капсулах)

S. По 2 таблетки 5 раз в день за полчаса до еды

Показан при пневмонии, ангине, ревматизме, коклюше, подостром септическом эндокардите, амёбной и бактериальной дизентерии, бруцеллезе, туляремии, сыпном тифе, сибирской язве, актиномикозе, трахоме, холере азиатской и для лечения и профилактики хирургических заболеваний. Водные растворы для лечения ожогов, флегмон, мастита и для промывания полостей приготавливают ex tempore в концентрации 4000—5000 ЕД в 1 мл.

Биомицин противопоказан при грибковых заболеваниях кожи. Осложнения: гиперемия слизистых оболочек, тяжелые дерматиты, зуд и другие аллергические реакции. Лечение этих осложнений см. Пенициллин.

Tetracyclinum. Тетрациклин. Близок биомицину. В таблетках по 0,1—0,15. Максимальная суточная доза для взрослых 2,0. Срок годности 1 год при температуре не выше 20°.

Rp. Tetracyclini 0,15
D. t. d. N. 60 in tabulettis
S. По 1—2 таблетки 4 раза в сутки

Показан при пневмонии различной этиологии, коклюше, подостром септическом эндокардите, дизентерии, гонорее, бруцеллезе, туляремии, сыпном тифе, пситтакозе, трахоме.

Для профилактики и лечения инфекционных осложнений в хирургии—перитонит и при инфекциях мочеполовых путей.

Terramycinum (s. Oxytetracyclinum. Окситетрациклин. Tetranum. Тетран). Террамицин. По 100 000—500 000 ЕД (0,1—0,5) на прием. Высшая суточная доза для взрослого 2,0. При температуре 20° годен 6 месяцев.

Rp. Terramycini 0,2
D. t. d. N. 25 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Применение см. Тетрациклин.

Unguentum oxytetracyclini. Мазь окситетрациклиновая (террамициновая). Выпускается 1% мазь в тубиках по 5,0; 10,0; 25,0; 50,0. В 1,0 мази содержится 10 000 ЕД антибиотика. Срок годности 6 месяцев при температуре 20°.

Rp. Ung. oxytetracyclini 10,0
DS. Мазь закладывают стеклянной палочкой за нижнее веко глаза 3—5 раз в день

Применяется при конъюнктивите, блефарите, кератите, язве роговой оболочки, трахоме.

Albomycinum. Альбомицин по 500 000—1 000 000—3 000 000 ЕД в ампулах. Сохраняются 6 месяцев при температуре не выше 20°.

Rp. Albomycini 1 000 000 ЕД
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Растворить содержимое ампулы в 2 мл дважды дистиллированной воды. Вводить сразу же после растворения под кожу 2 раза в сутки

Применяется при пневмонии у детей и у взрослых.

Synthomycinum. Синтомицин (Б). 1,5 (6,0).

Rp. Synthomycini 0,5

D. t. d. N. 40 in capsulis gelatinosis

S. По 2 капсулы 4 раза в день, в первые 2—3 дня и далее по 1 капсуле 4 раза в день

Применяется при бациллярной дизентерии на курс 10,0—20,0; при брюшном тифе и паратифозных заболеваниях на курс 30,0—45,0; при сыпном тифе на курс 20,0—30,0; при бруцеллезе на курс 35,0—50,0.

Назначается также при коклюше, пневмонии и гонорее, роже, пиодермии, трахоме.

Emulsio Synthomycini. Эмульсия синтомициновая.

Rp. Emulsi Synthomycini 5% (10%) 50,0

DS. Для смазываний

Назначается при рожистом воспалении, гнойных ранах, ожогах, пиодермии, экземе, трахоме, блефарите, трофических язвах, сикозе.

Eusynthomycinum. Эусинтомицин (Б) (не горек, удобен для детей).

Rp. Eusynthomycini 1,0

D. t. d. N. 15

S. По 1 порошку 4—6 раз в день

Показания см. Синтомицин.

Laevomycetinum. Левомецетин (Chlogocidum. Хлороцид) (Б). 1,0 (4,0).

Rp. Laevomycetini 0,5

D. t. d. N. 12 in capsulis gelatinosis

S. По 1 капсуле 4—6 раз в сутки.

Назначается при брюшном тифе и паратифе на курс 25,0—30,0; при сыпном тифе на курс 15,0—18,0; при дизентерии на курс 10,0—20,0; при бруцеллезе на курс 25,0—45,0; применяется также при туляремии, пневмонии, а также при трахоме в виде 1% эмульсии.

Rp. Laevomycetini 0,5

Ol. Cacao 2,0

M. f. suppositorium

D. t. d. N. 20

S. Вводить в прямую кишку 4 раза в день

Назначается при дизентерии, паратифозных заболеваниях и парапроктитах. В отдельных случаях при лечении синтомицином и левомецетином могут наблюдаться осложнения: гиперемия слизистых

оболочек, поносы, дерматиты и другие явления, сходные с теми, которые наблюдаются при пенициллинотерапии.

Схема лечения больных брюшным тифом, тиф-паратифом А и В в клинике инфекционных болезней 1-го Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова.

Взрослый больной принимает синтомицин или левомицетин по 0,5 шесть раз в сутки в течение всего лихорадочного периода и еще два первых дня при уже сниженной до нормы температуре.

Далее лечение продолжают еще 8 дней, но суточную дозу этих препаратов уменьшают до 4 приемов по 0,5.

Gramicidinum S. Грамицидин С. В ампулах и во флаконах по 0,5; 1,2 и 5 мл 2% спиртовой раствор.

Rp. Gramicidini 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Растворять по 1 мл в 50 мл стерильной дистиллированной воды и применять только в тот же день для орошения ран и для примочек, полосканий

Colimycinum. Колимицин (Б). Антибиотик. Выпускается в стерильной расфасовке во флаконах по 0,5—1,0 препарата. Срок хранения сухого порошка 1 год. Водные растворы колимицина сохраняют активность при температуре 6° 2 суток; в мазях — до 2 месяцев.

Rp. Colimycini 0,5 (1,0)

D. t. d. N. 6 in vitro originale

S. Содержимое флакона растворить в 5—10 мл (20 мл) 0,5% стерильного раствора новокаина и ввести в брюшную полость или в плевральную полость. Для промывания плевры растворяют колимицин 1 : 2000 в 0,25% растворе новокаина

Применяется при инфицированных поражениях брюшной и плевральной полостей: разлитых гнойных перитонитах и эмпиемах, хронических остеомиелитах; при лечении ран, пиодермий, экзем, осложненных гнойным процессом, применяют примочки из 0,25—0,5% раствора колимицина в 0,5% растворе новокаина, а также в виде мази.

Возможны осложнения. Всасывание больших количеств колимицина может привести к расстройствам слуха.

Microcidum. Микроцид. Выпускается в герметически закрытых флаконах по 100 и 200 мл. Сохраняется при температуре не выше 10°.

Rp. Microcidi 100,0

DS. Смоченными марлевыми тампонами, которые увлажняют 2—3 раза в сутки, покрывают пораженную кожу, раневую поверхность

Применяется при свежих инфицированных ранах, ожогах I, II и III степени, отморожениях II и III степени, длительно не заживающих язвах, пролежнях; при пиодермии, фурункулезе, абсцессах, остеомиелите, в гинекологии, при воспалении среднего уха в виде капель.

После открытия флакона микроцид нужно расходовать в первые три дня. Помутневший препарат не применяется.

Streptomycinum sulfuricum. Стрептомицин сернокислый.

Streptomycinum hydrochloricum. Стрептомицин хлористоводородный (Б). В 1,0 любого препарата содержится 1 000 000 ЕД. Выпускается во флаконах по 250 000, 500 000 и 1 000 000 ЕД. Хранится в сухом, темном прохладном месте при температуре не выше 20°. Срок годности 2 года. Высшие дозы для взрослых: разовая 1 000 000 ЕД, суточная — 2 000 000 ЕД.

Rp. Streptomycini 500 000 ED

D. t. d. N. 10 in vitro originale

S. Растворяют содержимое непосредственно во флаконе в 5 мл стерильного физиологического раствора или 0,5% раствора новокаина и вводят по 2,5 мл в ягодичную мышцу или в мышцу бедра 2 раза в день через равные промежутки времени

Показан при остром милиарном туберкулезе, ранних формах туберкулезного менингита, туберкулезе глотки, гортани и рта, при легочном туберкулезе, остром туберкулезном перитоните, туберкулезе кишечника и туберкулезе мочеполовых органов, при туберкулезе костей, глаз и кожи (волчанке) и других проявлениях туберкулеза, а также при бруцеллезе, туляремии, чуме, коклюше, дизентерии, гонорее, септикотоксических инфекциях и раневых инфекциях, сибирской язве, полиомиелите. На курс лечения туберкулеза необходимо 100,0—120,0 стрептомицина. Возможные осложнения при лечении стрептомицином: головная боль, дерматиты, поносы,

сердцебиения, гематурия, понижение слуха. При выраженном побочном действии назначают димедрол, диазолин, витамины В₁, В₂, С.

Rp. Streptomycini 250 000 ED
Sol. Natrii chlorati isotonicae 10,0
DS. Глазные капли.

По 2 капли в каждый глаз 4—6 раз
в день

Применяется при туберкулезе глаз.

Dihydrostreptomycinum sulfuricum. Дигидрострептомицин сульфат. Выпускается во флаконах по 500 000 и 1 000 000 ЕД (0,5—1,0 препарата). Сохраняется при температуре не выше 20°.

Rp. Dihydrostreptomycini sulfurici 500 000 ED
D. t. d. N. 10 in vitro originale
S. Содержимое во флаконе растворить в 5 мл стерильного физиологического раствора и впрыскивать по 2,5 мл в ягодичные мышцы 2 раза в день

Показания см. Стрептомицин.

Дигидрострептомицин более длительно, чем стрептомицин, задерживается в организме и легче переносится больными.

Phthivazidum. Фтивазид (Б). Светло-желтый порошок. 1,0 (2,0).

Rp. Phthivazidi 0,5
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3—4 раза в день до еды

Применяется при туберкулезе верхних дыхательных путей, серозных оболочек, очаговых формах легочного туберкулеза в период вспышки, фиброзно-кавернозном туберкулезе, туберкулезе лимфатических желез, костно-суставном туберкулезе и туберкулезе кожи, красной волчанке. На курс лечения туберкулеза необходимо 120,0—150,0 фтивазида. Для предупреждения побочных явлений (тошнота, рвота, головокружения, геморрагическая сыпь) назначают одновременно витамин В₆ по 50 мг ежедневно.

Rp. Phthivazidi 0,3 (0,5)
D. t. d. N. 30 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Показания те же.

Rp. Phthivazidi 0,5
Anaesthesini 0,2
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 15
S. По 1 свече 2 раза в день

Применяется при туберкулезе кишечника, половых органов.

Metazidum. Метазид (Б). По 0,2—0,5 на прием.

Rp. Metazidi 0,2
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Показания см. Фтивазид.

Lagusani. Ларусан (Б). По 0,2—0,3 на прием.

Rp. Lagusani 0,2
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Показания см. Фтивазид.

Acidum paraaminosalicylicum. Парааминосалициловая кислота (ПАСК). Натриевая соль парааминосалициловой кислоты. **Natrium para-amino-salicylicum** 3,0 на прием, 10,0—12,0 в сутки (примерно 0,2—0,3 в сутки на 1 кг веса больного).

Rp. Natrii paraaminosalicylici 3,0
D. t. d. N. 40
S. По 1 порошку 4 раза в день в $\frac{1}{4}$ стакана воды или молока через 30 минут после еды

Применяется при подострых и хронических формах туберкулеза легких, гортани, кишечника, половых органов, красной волчанке.

На курс лечения туберкулеза (с промежутками) требуется от 2500,0 до 3600,0 ПАСК.

Tibonum. Тибон (Thiomucidum. Тиомицид) (Б). Зеленовато-желтый порошок 0,1 (0,2).

Rp. Tiboni 0,01 (0,025—0,05)
Sacchari 0,3
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12

S. По 1 порошку 2—3 раза в день после еды; через каждую неделю дозу увеличивают до 0,025, 0,05 и до 0,1 на прием; при побочных явлениях дозу препарата уменьшают

Назначают при туберкулезе лимфатических желез и слизистых оболочек при лепре.

Rp. Tiboni 0,025
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Показания те же.

Saluzidum. Салюзид (Б). 0,5—1,0 (до 2,0 в сутки).
Saluzidum solubile. Салюзид растворимый.

Rp. Saluzidi 0,5
D. t. d. N. 60
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Применяют при всех формах туберкулеза.

Срок лечения 2—2½ месяца.

Rp. Sol. Saluzidi solubiliae 5% (10%) 10,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. По 10 мл под кожу, в мышцы (или 5% внутривенно медленно)

Ампулу вскрывают перед употреблением. Показания те же.

Tubazidum. Тубазид (**Isotebezidum.** Изотебецид) (Б). 0,1—0,2 (до 0,4 в сутки).

Rp. Tubazidi 0,1
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяется при туберкулезе легких, туберкулезе слизистых и серозных оболочек.

Sanazinum. Саназин (Б). Срок годности в ампулах 1 год.

Rp. Sol. Sanazini 1% 10,0
D. t. d. N. 20 in ampullis

S. Вводить внутривенно медленно по 10 мл с добавлением 5 мл 40% раствора глюкозы

Применяют при туберкулезе, коклюше, дизентерии; растворы 1:500 для промывания ран, полостей.

Juglonum. Юглон (Б).

Rp. Jugloni 2,0
Anasthesini 3,0
Vasellini ad 50,0
M. f. unguentum

DS. Повязку с мазью накладывают на пораженную кожу 1—2 раза в сутки в течение 3 дней до образования струпа

Применяется для лечения волчанки, бородавчатого туберкулеза кожи, скрофулодермы.

Sulfitum thyrosinum. Сульфит тирозина. Выпускается в ампулах по 10—20 мл. Хранится в течение 6 месяцев в темном прохладном месте.

Rp. Sol. Sulfiti thyrosini 20,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. По 5—10—20 мл внутривенно медленно через день. Детям назначают по 1 чайной, десертной, столовой ложке 2—3 раза в день

Применяется при остром периоде полиомиелита, туберкулезного менингита, при арахноэнцефалите, шизофрении.

Противопоказано при язвенной болезни желудка, гипертиреозе и сахарном диабете.

Crysanolum. Кризанол в виде 5—10% взвеси в масле. Препарат золота. Augum.

Rp. Crysanoli 1,0 (2,0—3,0)
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. Вводить внутримышечно в подогретом виде по 1—3 мл. Один раз через 2—5 дней. Всего 20—25 инъекций. Перед употреблением взбалтывать

Применяется при свежих формах туберкулеза, красной волчанке и при остром полиартрите.

Кризанол противопоказан при милиарном туберкулезе, старых фиброзно-кавернозных процессах, диабете, кахексии.

2. СУЛЬФАНИЛАМИДЫ

Streptocidum album. Стрептоцид белый (Б). 2,0 (7,0).

Rp. Streptocidi albi 0,5
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку 3—6 раз в сутки

Применяется при ангине, роже, гонорее.

Срок лечения 3—5 дней.

Rp. Streptocidi albi 0,3
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 2 таблетки 3—6 раз в день

Показания те же.

Rp. Streptocidi albi subtilissimi 5,0
D. t. d. N. 6 in scatula
S. Присыпка

Применяют при остром раневом процессе, при свежих ранах.

Rp. Streptocidi albi subtilissimi 2,0
Vaselini flavi 10,0
M. f. unguentum
DS. Глазная мазь. Закладывать за веки
обоих глаз 2 раза в день

Применяют при острых конъюнктивитах, сикозе.

Rp. Streptocidi albi subtilissimi
Norsulfazoli $\bar{a}\bar{a}$ 1,0
Penicillini 50 000 ED
Ephedrini hydrochlorici 0,05
M. f. pulvis
DS. Втягивать в каждую половину носа
3—4 раза в день

Применяют при остром рините и остром гайморите.

Sulfodimezinum. Сульфодимезин (Б). 2,0 (7,0).

Rp. Sulfodimezini 1,0
D. t. d. N. 30
S. По 1 порошку 6 раз в день

Применяют при острой пневмонии, бронхопневмонии, гриппе, остром ревматизме, менингите, менингококковом перитоните, дизентерии, дифтерии, гонорее, рожистом воспалении. Длительность лечения 5—7 дней.

Rp. Sulfodimezini 0,5
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 2 таблетки на прием 4—8 раз в день

Показания те же.

Norsulfazolum. Норсульфазол (Б). 2,0 (7,0).

Norsulfazoli 1,0 (0,5)
D. t. d. N. 30 in tabulettis
S. По 1 таблетке 6 раз в день

Показания см. Сульфодимезин.

Sulfazinum. Сульфазин (Б). По 1,0 на прием.

Rp. Sulfazini 0,5
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 4—8 раз в день

Показания см. Сульфодимезин.

Rp. Sulfazini 2,0
Penicillini 100 000 ED
Ephedrini hydrochlorici 0,2
M. f. pulvis subtilissimus
DS. Для втягивания в нос по маленькой щепотке (насморк острый)

Methylsulfazinum. Метилсульфазин (Б). Доза 2,0 (7,0).

Rp. Methylsulfazini 0,5
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1—2 таблетки 3—4 раза в день

Применяется при воспалении легких, стрептококковых инфекциях, рожистом воспалении.

Sulfacilum (s. Albucidum-natrium). Сульфацил (Альбуцид-натрий). **Sulfacylum solubile.** Сульфацил растворимый (Б).

Rp. Sol. Sulfacyli solubilis 30% 10,0
DS. По 2 капли 3 раза в день в больной глаз

Показан при конъюнктивитах.

Rp. Sulfacyli solubilis 2,0 (3,0)
Vasellini flavi 10,0
M. f. unguentum

DS. Закладывать за веки обоих глаз на
ночь

Показан при бленнорее, язвах роговицы.

Aethazolum. Этазол (Б).

Rp. Aethazoli 0,5
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1—2 таблетки через 4 часа

Показан при дизентерии, пневмонии, ангине, рожистом воспалении, раневых инфекциях.

Natrium aethazolum. Этазол-натрий. Натриевая соль этазола выпускается в порошке и ампулах по 10 мл 10—20% раствора. Максимальная суточная доза 6,0.

Rp. Sol. Natrii aethazoli 10% 10,0
D. t. d. N. 12 in ampullis
S. Вводить по 5 мл внутривенно медленно

Показан при пневмонии, рожистом воспалении, дизентерии, пелитах, менингите.

Disulforgminum. Дисульформин 1,0 на прием для взрослых.

Rp. Disulforgmini 1,0
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 6 раз в день

Применяется при дизентерии, колитах.

Sulcymidum. Сульцимид (Б). По 1,0—2,0 на прием.

Rp. Sulcymidi 0,5
D. t. d. N. 20
S. По 1 порошку через 6—8 часов

Применяется при пневмонии, дизентерии.

Phthalazolum. Фталазол (Б). 0,5.

Rp. Phthalazoli 0,5
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 2 таблетки 4—6 раз в день

Применяется при острых гастроэнтеритах, дизентерии, язвенном колите. Срок лечения 3—4 дня.

Sulginum. Сульгин (Б). 0,5—1,0

Rp. Sulgini 0,5

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. По 1—2 таблетки 6—8 раз в день

Показания см. Фталазол.

Urosulfanum. Уросульфан (Б). 0,5—1,0.

Rp. Urosulfani 0,5

D. t. d. N. 12

S. По 1 поршкы 4—6 раз в день

Применяется при циститах, пиелитах, пиелонефритах.

Diacarbium. Диакарб (**Fonuritum.** Фонурит) (аналог сульфаниламидов). Выпускается в таблетках по 0,25.

Rp. Diacarbi 0,25

D. t. d. N. 12 in tabulettis

S. По 1 таблетке 1 раз в день

Применяется как мочегонное средство больным с нарушением кровообращения II и III степени; при пороках сердца, гипертонической болезни.

Сульфаниламиды более эффективны в период острого течения того или другого инфекционного заболевания. Подостро и хронически протекающие те же инфекции (например, при пневмонии) слабее поддаются влиянию сульфаниламидов и тогда назначают антибиотики.

Во избежание осложнений рационально проводить лечение препаратами не более 7—10 дней при одновременном обильном употреблении жидкостей и витаминов В₁, В₂, С, РР.

Возможные осложнения: головная боль, тошнота, потеря аппетита, цианоз, сыпь, невриты; гемолитическая анемия, реже лейкопения, агранулоцитоз.

Сульфаниламиды противопоказаны при гепатитах.

3. ПРОТИВОМАЛЯРИЙНЫЕ СРЕДСТВА

Acricinium. Акрихин. **Atebrinum.** Атебрин (Б). 0,2 (0,4).

Rp. Acricini 0,1

D. t. d. N. 15 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3 раза в день, 5—7 дней.

После 10-дневного перерыва повторить лечение: 2 раза по 1 таблетке, 3 раза в день по 3 дня и снова 10-дневный промежуток

На курс лечения малярии необходимо 35—40 таблеток. При лямблиозе и красной волчанке пользуются схемой лечения малярии в виде трехциклового курса (см. выше).

Rp. Sol. Acrichini 4% 50,0

D. Sterilisetur!

S. По 5 мл внутримышечно или по 2—3 мл в 20 мл 20% глюкозы внутривенно

Вводить медленно в подогретом виде

Применяется при упорной малярии, малярийной коме, а при кожном лейшманиозе впрыскивать в толщу бугорка 4% раствор по 0,3—0,5 мл.

Plasmocidum. Плазмоцид (Б). 0,02 (0,06).

Rp. Plasmocidi 0,02

Acrichini 0,1

D. t. d. N. 15 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3 раза в день, 5 дней.

После 7—10-дневного перерыва повторить лечение: 2 раза по 1 таблетке; 3 раза в день, 3 дня с 7—10-дневным промежутком

Применяется на курс лечения при всех формах малярии и при тропической необходимо 33 таблетки.

Chinocidum. Хиноцид (Б). По 0,005—0,01 на прием.

Rp. Chinocidi 0,01

D. t. d. N. 12 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2—3 раза в день после еды

Применяется в целях химиопрофилактики при трехдневной малярии для предупреждения рецидивов.

Bigumalum. Бигумаль (Б). 0,3 (0,6).

Rp. Bigumali 0,1

D. t. d. N. 12 in tabulettis

S. По 3 таблетки 2 раза в день. На 2-й, 3-й, 4-й и 5-й день по 3 таблетки 1 раз в день. Далее по 1—2 таблетки 1 раз в неделю в течение 3—6 месяцев

Применяют при всех формах малярии в лечебных и профилактических целях.

Rp. Bigumali
Acrichini \overline{aa} 0,1
Plasmocidi 0,02
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. Принимать по 3 таблетки в 1—2 приема
в течение 7 дней

Применяется при всех формах малярии.

Rp. Bigumali 0,1
Plasmocidi 0,02
D. t. d. N. 15 in tabulettis
S. Принимать 1-й день 3 таблетки в 2 приема. На 2-й, 3-й, 4-й и 5-й день по 3 таблетки в 1—2 приема

Применяется при всех формах малярии.

Chloridinum. Хлоридин (Б). По 0,025 на прием.

Rp. Chloridini 0,025
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день

Показания см. Бигумаль.

Chininum hydrochloricum. Хинин хлористоводородный.
По 0,3—0,5 на прием до 1,0—1,5 в день.

Rp. Chinini hydrochlorici 0,3
D. t. d. N. 20 in capsulis gelatinosis
S. По 1 капсуле 3—6 раз в день, 3 дня подряд, 4 дня перерыв, всего 4 таких недельных цикла

На курс лечения малярии 25,0—30,0 хинина.

Rp. Chinini hydrochlorici 0,5
D. t. d. N. 20 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2—3—4 раза в день по схеме

См. выше при малярии. По $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ таблетки через 2—3 часа как стимулятор родовой деятельности.

Rp. Chinini hydrochlorici 0,3
Methyleni coerulei 0,05
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12 in capsulis gelatinosis
S. По 1 капсуле 3 раза в день

Применяется при упорной форме малярии.

Пропись Н. Е. Кушева.

Rp. Chinini hydrochlorici 9,0
Acidi hydrochlorici diluti q. s.
Ut f. pilulae N. 30 Consperge saccharo
S. По 1 пилюле 3—4 раза в день

Применяется при малярии.

Пилюли готовят без constituents. Пропись М. А. Левченко.

Rp. Chinini hydrochlorici 6,0
Acidi arsenicosi
Jodi puri \overline{aa} 0,04
Methyleni coerulei 1,0
Extr. et pulv. rad. Liquiritiae q. s.
Ut f. pilulae N. 20
DS. По 1 пилюле 3 раза в день

Применяется при хронической малярии.

Rp. Chinini hydrochlorici 3,0
Antipyrgini 2,0
Aquaе destillatae 6,0
M. Sterilis!
DS. По 1 мл глубоко в подкожную клетчатку межлопаточной области

Применяется при упорной малярии.

Rp. Chinini hydrochlorici
Acidi borici \overline{aa} 0,2
Ol. Cacao 3,0
M. f. globulus vaginalis
D. t. d. N. 10
S. Употребление известно (противозачаточное)

Chininum bihydrochloricum. Хинин двухлористоводородный 50%. По 1—2 мл в вену.

Rp. Sol. Chinini bihydrochlorici 50% 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Ввести глубоко в подкожную клетчатку
2 мл раствора в подогретом виде

Применяется при упорной форме малярии, малярийной коме.

Chininum sulfuricum. Хинин сернокислый 0,3—
0,5—1,0.

Rp. Chinini sulfurici 0,3 (0,5)
D. t. d. N. 20 in capsulis gelatinosis
S. По 1 капсуле 2 раза в день

Применяется при лечении и профилактике малярии.

Euchininum. Эйхинин 0,3—0,5—1,0 (мало горек).

Rp. Euchinini
Sachari albi \overline{aa} 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяется при малярии у детей.

Ciclochinum. Циклохин (Б). Выпускается в таблетках
по 0,05 и 0,3.

Rp. Ciclochini 0,3
D. t. d. N. 3 in tabulettis
S. По 1 таблетке 1 раз в день утром по-
сле легкого завтрака

Применяется при эритроцитарных формах паразитов всех ви-
дов малярии, особенно при тропической малярии, где отмечена ус-
тойчивость паразитов к бигумалю. Всего на курс 0,9.

Chlorazinum. Хлоразин (Б). Выпускается в порошке
и таблетках по 0,1—0,15. Суточная доза 0,3 в два приема.

Rp. Chlorazini 0,15
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. По 1 таблетке 2 раза в день в течение
5—6 дней

Применяют для профилактики лечения всех форм малярии.

Chinidinum. Хинидин. **Chinidinum sulfuricum.** Серно-
кислая соль хинидина (Б). 0,1—0,2.

Rp. Chinidini sulfurici 0,1
Sacchari albi 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Применяется при мерцательной аритмии, трепетании предсердий, тиреотоксикозах.

Rp. Chinidini sulfurici 0,15
Pulveris follii Digitalis 0,05
Papaverini hydrochlorici 0,02
Sacchari lactis 0,2
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12 in capsulis amylaceis
S. По 1 капсуле 3 раза в день

Показания те же.

4. ПРОТИВОСИФИЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ МЫШЬЯКА

Novarsenolum. Новарсенол (А). Порошок светло-желтого цвета в ампулах по 0,15; 0,3; 0,45; 0,6. Препарат должен свободно пересыпаться в ампулах, не образуя комков и хорошо растворяться.

Rp. Novarsenoli 0,3
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Содержимое ампулы растворить в 5 мл дважды дистиллированной свежестерилизованной воды. Раствор новарсенола тотчас же вводить внутривенно медленно в течение 1¹/₂—2 минут.

Препарат вводят из расчета 0,1—0,12 в сутки с соответствующими дозе перерывами. Начальная доза для женщин 0,15, для мужчин 0,3. Максимальная разовая доза 0,6 для мужчин и 0,45 для женщин. Курсовая доза новарсенола для лечения всех форм сифилиса для женщин 4,5—5,0, для мужчин 5,0—5,5. Для лечения возвратного тифа, сибирской язвы, абсцесса легкого вводят в вену мужчинам по 0,45, женщинам по 0,3 2—3 раза с 4—6-дневными промежутками.

Myarsenolum. Миарсенол (А). Порошок светло-желтого цвета в ампулах по 0,15; 0,3; 0,45; 0,6.

Rp. Myarsenoli 0,3

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Содержимое ампулы растворить в 2 мл дистиллированной стерилизованной воды. Ввести при помощи длинной иглы внутримышечно в наружный верхний квадрант ягодицы

Назначают миарсенол при плохой переносимости новарсенола, в детской практике и в случаях, когда внутривенные вливания новарсенола технически невыполнимы. Разовые и курсовые дозы миарсенола такие же, как и новарсенола.

Osarsolum. Осарсол (А). 0,25 (1,0).

Rp. Osarsoli 0,25

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. Принимать за 1 час до еды 1-й день 1 таблетку, 2-й день по 1 таблетке 2 раза в день; 3-й — по 1 таблетке 3 раза в день; 4-й и 5-й день по 2 таблетки 2 раза в день.

5-дневные приемы чередуют с 3-дневными перерывами при всех проявлениях позднего сифилиса. пока больной не получит 30,0—40,0 осарсола

Применяется при возвратном тифе, малярии и трихоцефалезе, амёбной дизентерии, принимать по 1 таблетке 3—4 раза в день.

Rp. Osarsoli 0,25

Glucosi

Acidi bogici \overline{aa} 0,3

M. f. pulvis

D. t. d. N. 12

S. Присыпки

Применяется при трихомонадном кольпите.

Aminarsonum. Аминарсон (А). По 0,25 на прием.

Rp. Aminarsoni 0,25

D. t. d. N. 15 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3 раза в день в течение 8—10 дней

Применяется при амёбиазе, при трихомонадном вагините в виде шариков по 0,12.

Препараты мышьяка противопоказаны при индивидуальной непереносимости, язвенной болезни, неспецифических болезнях нервной системы, печени, почек, декомпенсации сердца, геморрагическом диатезе, диабете, базедовой болезни и острых инфекциях.

Побочные явления при применении препаратов мышьяка: нитритоидные кризы, повышение температуры, дерматиты, желтуха, геморрагический энцефалит, полиневриты. При нитритоидных кризах тотчас же вводят внутривенно или внутримышечно 0,5—1 мл 0,1% адреналина.

Для профилактики за час до введения мышьяка назначают внутрь эфедрин. Далее для лечения токсических реакций вводят внутривенно тиосульфат натрия—10—50 мл 30% раствора, а также вводят повторно под кожу или в мышцу унитиол.

5. ПРЕПАРАТЫ РТУТИ И ВИСМУТА С ПРОТИВОСИФИЛИТИЧЕСКИМ И АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

Hydrargyrum cyanatum. Цианид ртути. Ртуть цианистая (А). 0,01 (0,03).

Rp. Sol. Hydrargyri cyanati 1% 30,0
D. Sterilisetur!

S. Вводить внутривенно медленно, сначала 0,5 мл, затем 0,75 мл и далее по 1 мл ежедневно

Назначают при сифилисе. Курс 30—40 вливаний.

Rp. Hydrargyri cyanati
Novocaini \overline{aa} 0,2
Aquaе destillatae 20,0
M. Sterilisetur!

DS. Вводить внутримышечно по 1 мл ежедневно

Назначают при сифилисе. Курс 20—30 вливаний.

Rp. Sol. Hydrargyri cyanati 1 : 2000 50,0
DS. Промывать глаза 3—5 раз в день

Применяется при конъюнктивитах.

Hydrargyrum oxycyanatum. Цианид ртути основной. Ртуть оксидцианистая (А).

Rp. Sol. Hydrargyri oxycyanati 1 : 5000 200,0
DS. Промывать глаза 3—6 раз в день

Применяется при конъюнктивитах.

Hydrargyrum salicylicum. Ртуть салициловокис-
лая (А). 0,02 (0,06).

Rp. Hydrargyri salicylici 2,0
Ol. Persicorum (ol. Olivarum) 20,0
M. Sterilis!

DS. Вводить по 1 мл 1 раз в 5—7 дней
внутримышечно в наружный верхний
квадрант ягодицы длинной иглой, в по-
догретом виде после тщательного
взбалтывания

Применяется при сифилисе. Курс 10—12 впрыскиваний.

Hydrargyrum bijodatum rubrum. Ртуть двуиодистая.
Йодид окисной ртути (А). 0,02 (0,06). Ярко-красный по-
рошок.

Микстура Biett.

Rp. Hydrargyri bijodati rubri 0,12
Kalii jodati 6,0
Aquae destillatae ad 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день
после еды

Применяется при висцеральном сифилисе.

Rp. Hydrargyri bijodati rubri
Natrii jodati aa 0,5
Natrii chlorati purissimi 0,2
Aquae destillatae 25,0
M. Sterilisetur!

DS. По 1 мл внутримышечно ежедневно

Применяется при висцеральном и других проявлениях сифили-
са, на курс 30—40 впрыскиваний.

Unguentum Hydrargyri cinereum. Серая ртутная
мазь.

Rp. Ung. Hydrargyri cinerei 2,0 (4,0)
D. t. d. N. 10 in charta cerata

S. Тщательно втирать в кожу досуха в те-
чение 30—40 минут, пока при проведе-
нии пальцем не останется светлой по-
лосы на коже, в 1-й и 2-й день то в пра-
вое, то в левое бедро, на 3-й и 4-й день

то в правое, то в левое предплечье и на 5-й и 6-й день то в правый, то в левый бок поочередно. На 7-й день ванна и отдых от втираний

Применяется при всех формах сифилиса. Курс 36—42 втирания. Побочное действие противосифилитических препаратов ртути при длительном их применении: стоматиты, гастроэнтериты, дерматиты, поражение почек, анемия.

Hydrargyrum bichloratum (s. **Hydrargyrum sublimatum corrosivum**). Ртуть двуххлористая. Сулема (А) 0,02 (0,06).

Rp. Hydrargyri bichlorati 0,5 (1,0)

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. Одну таблетку растворить в 1 л воды

Применяется при дезинфекции рук, кожаных и резиновых предметов (исключая металлические предметы) и помещений.

Помощь при отравлении препаратами ртути — см. терапевтический указатель, отравления солями тяжелых металлов.

Diocidum. Диоцид (А). Смесь цетилпиридиний бромида с этанолмеркурихлоридом — ртутный антисептик. Выпускается в виде таблеток. Для приготовления раствора 1 : 5000 берут две таблетки цетилпиридиний бромида и одну таблетку этанолмеркурихлорида и растворяют в кипяченой теплой воде. Растворы этих веществ при взбалтывании пенятся — «детергены» и обладают хорошим дезинфицирующим моющим свойством.

Rp. Tabulettae Diocidi N. 50

S. Приготавливают растворы (способ см. выше) для мытья рук перед операцией

Способ применения: смачивают раствором диоцида стерильную салфетку и моют руки 3 минуты. Затем 2 минуты протирают 96° спиртом. Такая обработка рук создает асептичность кожи на срок не менее 2 часов.

Hydrargyrum amidato-chloratum s. **Hydrargyrum praecipitatum album**. Амидохлорная или белая осадочная ртуть.

Rp. Ung. Hydrargyri praecipitati albi 5% (10%) 30,0

DS. Смазывать пораженную кожу

Применяется при пиодермии, лишаях, веснушках, сифилидах.

Rp. Hydrargyri praecipitati albi
Bismuthi subnitrici \overline{aa} 2,0
Acidi salicylici
Camphorae tritae
Perhydroli \overline{aa} 0,5
Unguenti Cetacei 20,0
M. f. unguentum
DS. Втирать в кожу лица

Назначается при угрях и веснушках.

Hydrargyrum oxydatum flavum. Окись ртути желтая.

Rp. Ung. Hydrargyri oxydati flavi 2% 5,0
DS. Смазывать края век

Назначается при конъюнктивитах.

Hydrargyrum chloratum mite. Calomel. Ртуть однохлористая, каломель (Б). 0,6 (1,8).

Rp. Calomelanos
Talcis \overline{aa} 5,0
M. f. pulvis
DS. Присыпка

Назначается при сифилитических язвах.

Mercurialum. Меркузал (Б). По 1 мл в мышцу.

Rp. Mercuriali 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. После 2—3-дневного приема больным 10% раствора хлористого кальция (по 1 столовой ложке 3 раза в день) вводят внутримышечно по 0,3—0,5 мл, реже 1 мл, меркузала с 2—3-дневными промежутками

Назначается при отеках сердечного происхождения.

Novurium. Новурит (Б). Новурит — 10% раствор триметилциклопентана — карбоново-кисло-метоксимеркуригидроксид-аллиламид-карбонокислой натриевой соли с содержанием теофиллина. Выпускается в ампулах по 1—2 мл и в свечах.

Rp. Sol. Novuriti 10% 1,0
D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить по 0,5—0,75—1 мл два раза в неделю медленно в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы с помощью длинной иглы (введение под кожу или в отечные ткани воспрещается)

Применяют при отеках сердечного происхождения как мочегонное; если предварительно вводят дигиталис, а также хлорид аммония, мочегонное действие усиливается. Противопоказан при гломерулонефрите, остром и хроническом заболевании кишечника, кишечных кровотечениях—подобно другим ртутным препаратам.

Rp. Novuriti 0,25
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 10
S. Вводить по 1 свече в пустую прямую кишку через каждые 3—5 дней

Показания те же.

Promegani. Промеган (А). Выпускается в таблетках, содержащих по 10 мг ртути.

Rp. Tabulettae Promegani N. 6
DS. Принимать по 1 таблетке после еды 2—3—4 раза в день

Показания см. Меркузал, Новурит.

Vijochinolum. Бийохинол (Б). 8% взвесь йодвисмутата хинина в персиковом масле, по 3 мл в мышцы.

Rp. Vijochinoli 50,0 (100,0)
DS. Вводят медленно длинной иглой по 3 мл внутримышечно в наружный верхний квадрант ягодицы 1 раз в 3 дня (из расчета 1 мл на 1 день). Перед употреблением препарат нужно слегка подогреть и тщательно взболтать до получения равномерной взвеси

Применяется при всех формах сифилиса. Курс 40—50 мл.

Bismovegolium. Бисмоверол (Б). Суспензия основной висмутовой соли комплексной моновисмутовой кислоты в персиковом масле.

Rp. Bismoveroli 100,0

DS. По 1 мл внутримышечно в подогретом виде; через день в первой половине курса и через 2 дня во второй половине курса. Перед употреблением взбалтывать

Применяется при всех периодах сифилиса. Курс 16—20 мл взвеси.

Vithiugolum. Битиурол (Б). 11% взвесь комплексных соединений йодистого висмута с тиомочевинной в персиковом масле.

Rp. Vithiugoli 100,0

DS. По 1 мл внутримышечно в подогретом виде через день. Перед употреблением взбалтывать

Применяется при всех периодах сифилиса.
На курс 25 мл взвеси.

Pentabismolum. Пентабисмол (Б). Препарат висмута, растворимый в воде.

Rp. Pentabismoli 2,0

D. t. d. N. 20 in ampullis

S. Первый день 1 мл в мышцы, далее по 2 мл через день в смеси с 0,5 мл 2% раствора новокаина

Применяется при всех формах сифилиса.
На курс 40—50 мл.

Bismuthum subnitricum. Висмут основной азотнокислый 0,3—0,5.

Rp. Bismuthi subnitrici 0,3 (0,5)

D. t. d. N. 6

S. По 1 порошку 2—3 раза в день

Применяется при гастроэнтеритах, колитах.

Rp. Bismuthi subnitrici

Magnesiae ustae aa 0,5

M. f. pulvis

D. t. d. N. 10

S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяется при гастроэнтеритах.

Rp. Bismuthi subnitrici 3,0
Vaselini albi
Lanolini \overline{aa} 15,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать пораженную кожу

Применяется при дерматитах, язвах.

Rp. Bismuthi subnitrici
Streptocidi albi
Thumoli \overline{aa} 0,5
Bolus albae 5,0
Glycerini q. s.
Ut f. pasta
DS. Положить туго в дупло зуба

Применяется при глубоком карнесе.

Xerоformium. Ксероформ. Bismuthum tribromphenilicum. Трибромфенолят висмута основной.

Rp. Xerоformii 1,0
Zinci oxydati 5,0
Lanolini ad 10,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать пораженную кожу

Применяется при дерматитах, экземе.

Rp. Xerоformii 0,5
Extr. Belladonnae 0,015
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече на ночь

Применяется при геморрое, трещинах заднего прохода.

Dermatolum. Дерматол. Bismuthum subgallicum. Галлат висмута основной 1,0 (3,0).

Rp. Dermatoli 10,0
Zinci oxydati 20,0
Talci 30,0
M. f. pulvis subtilissimus
DS. Присыпка

Применяется при гнойничковых поражениях кожи,

Rp. Dermatoli 0,2
Extr. Belladonnae 0,01
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече утром и на ночь

Назначается при геморрое, трещине заднего прохода, парапроктитах.

6. СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРОМ ДЕЙСТВИЯ

(препараты алюминия, железа, меди, цинка, серебра и свинца)

Alumen. Квасцы. **Aluminium sulfuricum cum Kalio sulfurico.** Квасцы алюминиево-калиевые.

Rp. Stili Aluminis N. 3
DS. Протирать карандашом конъюнктиву глаза, кожу после бритья при порезах как кровоостанавливающее

Назначается при трахоме

Rp. Infusi folii Salviae 10,0 : 200,0
Aluminis 2,0
MDS. Для полоскания рта, горла

Назначается при язвенном стоматите, ангине.

Rp. Sol. Aluminis 0,5% 200,0
Acidi bogici 2,0
MDS. Для полосканий рта, горла

Назначается при стоматитах, ангине.

Alumen ustum. Квасцы жженые.

Rp. Aluminis usti 10,0
Talci 20,0
M. f. pulvis
D. in scatula
S. Присыпка

Применяется при чрезмерных грануляциях, опрелостях, потливости ног.

Liquor Alumini acetici 8%. Раствор ацетата алюминия 8%. **Liquor Burovi.** Жидкость Бурова.

Rp. **Liquoris Burovi** 100,0

DS. Растворить в 500 мл дистиллированной воды

Показана для примочек при экземе, ушибах, для полосканий.

Aluminium hydroxydatum. Гидрат окиси алюминия.
Argilla alba. Глинозем.

Rp. **Argillae albae** 100,0

DS. Размешивать по 1—2 столовые ложки в $\frac{1}{2}$ стакана воды и принимать повторно

Показан при острых энтероколитах, отравлении, метеоризме.

Bobus alba. Белая глина. Каолин.

Rp. **Boli albae** 100,0

DS. Размешивать по 1—2 столовые ложки в $\frac{1}{2}$ стакана воды и принимать повторно

Показан при поносах, отравлениях, метеоризме.

Ferrum trichloratum solutum s. Ferrum sesquichloratum solutum. Раствор хлорида окисного железа. Раствор хлорного железа. **Liquor Ferrii sesquichlorati** — официальный раствор.

Rp. **Ferrii trichlorati soluti** 50,0

DS. Растворить в стакане воды—для полосканий (при ангине), смачивать вату или марлю для тампонады носа (при кровотечениях)

Rp. **Liq. Ferrii sesquichlorati**
Glycerini

Aquae destillatae \overline{aa} 10,0

MDS. Для смазываний кровоточащей слизистой оболочки носа

Cuprum citricum. Цитрат меди. Медь лимоннокислая.

Rp. **Ung. Cupri citrici 5%** 5,0

DS. Закладывать за край века

Применяется при трахоме, конъюнктивитах.

Cuprum sulfuricum. Медь сернокислая. Медный порошок (Б).

Rp. Sol. Cupri sulfurici 0,5% 20,0

DS. По 2—3 капли в конъюнктиву глаза

Применяется при трахоме.

Rp. Sol. Cupri sulfurici 20% 30,0

DS. Для прижигания язв

Назначается при стоматитах.

Rp. Stili Cupri sulfurici N. 3

DS. Протирать «карандашом» конъюнктиву глаза

Назначается при трахоме.

Rp. Sol. Cupri sulfurici 3% 100,0

Liq. Ammonii caustici 15,0

MDS. Наружное

Первый раствор см. ниже.

Rp. Sol. acidi Pyrogallici 3% 100,0

DS. Наружное

Второй раствор см. ниже.

Перед употреблением равные количества первого и второго раствора смешивают и смачивают волосы головы (восстановитель цвета волос).

Zincum oxydatum. Окись цинка.

Rp. Ung. Zinci 30,0

DS. Смазывать пораженные участки кожи

Назначается при пиодермии.

Pasta Zinci salicylata. Паста салицилово-цинковая.

Pasta Zinci Lassari. Паста Лассара.

Состав: салициловой кислоты 2,0 окиси цинка 25,0, крахмала 25,0 и желтого вазелина 48,0.

Rp. Pastae Zinci salicylatae 50,0

DS. Наложить на пораженные участки кожи

Назначается при пиодермии, экземе.

Rp. Zinci oxydati
Amyli Tritici
Talci \overline{aa} 30,0
Glycerini 40,0
Spiritus Vini 95° 50,0
Aquae destillatae 300,0
MDS. Смоченными тампонами покрывать пораженную кожу. Перед употреблением взбалтывать

Применяется при острой экземе, дерматитах.

Rp. Zinci oxydati subtilissimi
Talci \overline{aa} 20,0
Acidi Salicylici subtilissimi 2,0
M. f. pulvis
D. in scatula
S. Присыпать пораженные участки кожи

Применяется при гнойничковой сыпи, экземе, опрелостях.

Zincum sulfuricum. Сульфат цинка. Цинк сернокислый (Б).

Rp. Sol. Zinci sulfurici 0,25% (0,5%) 20,0
DS. По 2 капли в оба глаза

Применяется при конъюнктивитах.

Argentum nitricum. Нитрат серебра. Серебро азотнокислое. Ляпис (А). 0,03 (0,1).

Rp. Sol. Argenti nitrici 2% 5,0
D. in vitro nigro
S. По 2 капли в каждый глаз новорожденному с последующим промыванием изотоническим раствором хлорида натрия

Применяется для предохранения от гонококковой инфекции.

Rp. Sol. Argenti nitrici 5% (10%) 50,0
D. in vitro nigro
S. Смазывать раневую поверхность, кровоточащие участки

Применяется при прижигании язв, обильных грануляций.

Rp. Stili Argenti nitrici N. 2
S. Втирать в раневую поверхность

Показания те же.

Rp. Sol. Argenti nitrici spirituosae 3% 20,0
D. in vitro nigro
S. Для посеребрения каналов зубов

Rp. Argenti nitrici
Sulfuris praecipitati $\bar{a}\bar{a}$ 1,5
Spiritus vini 96°
Glycerini $\bar{a}\bar{a}$ 25,0
Aquae destillatae 200,0
MD. in vitro nigro
S. Смочить волосы головы при помощи щеточки, избегая втирания, 1 раз и дать высохнуть при дневном свете в тени. После просушивания волосы промыть как обычно. Во избежание потемнения ногтей рекомендуется надевать резиновые перчатки или тотчас же вымыть руки или протереть ногти нашатырным спиртом. Хранить в темном месте (восстановитель цвета волос; при однократном смачивании цвет шатен)

Protargolum s. Argentum proteicum. Протаргол.

Rp. Sol. Protargoli 2% 20,0
D. in vitro nigro
S. По 2 капли в оба глаза

Применяется при конъюнктивитах; по 6 капель в каждую половину носа при остром рините, по 20,0 для введения в уретру—при уретритах.

Collargolum. Колларгол. Argentum colloidalе. Серебро коллоидальное 0,25 (0,5).

Rp. Sol. Collargoli 2% 20,0
DS. По 2—3 капли в оба глаза

Применяется при конъюнктивитах.

Plumbum aceticum. Ацетат свинца. Свинец уксуснокислый (Б).

Rp. Plumbi acetici 10,0
Aquae destillatae 100,0
MDS. По 2 чайные ложки на кружку воды

Назначается для спринцеваний.

Unguentum Plumbi subacetici. Мазь свинцовая.

Rp. Ung. Plumbi subacetici 20,0

DS. Намазать пораженную кожу

Назначается при пролежнях.

Aqua Plumbi. Вода свинцовая. Свинцовая примочка.

Rp. Aquae Plumbi 200,0

DS. Смачивать кожу

Применяется при острой экземе, острых дерматитах, ушибах, язвах, укусах насекомых.

Emplastrum Plumbi simplex. Пластырь свинцовый простой.

Rp. Emplastri Plumbi simplicis

Vaselini \overline{aa} 25,0

M. f. unguentum

DS. Смазывать пораженную кожу

Применяется при пролежнях, варикозных язвах.

Rp. Emplastri Plumbi simplicis 25,0

Ichthyoli 2,5

M. f. emplastrum

DS. Наложить на пораженную кожу

Назначается при пролежнях, вяло заживающих ранах.

7. ПРЕПАРАТЫ СЕРЫ, СУРЬМЫ, СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ, И ПРОТИВОЯДИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ

Natrium hyposulfurosum. Натрий серноватистокислый.

Natrium thiosulfuricum. Тиосульфат натрия 30% по 50 мл в ампулах.

Rp. Sol. Natrii hyposulfurosi 30% 50,0

D. t. d. N. 3 in ampullis

S. По 50 мл внутривенно

Применяется при отравлении новарсенолом, синильной кислотой и солями тяжелых металлов. По 5—10—20 мл при псориазе, экземе.

Rp. Sol. Natrii hyposulfurosi 60% 100,0
DS. Протирать кожу дважды с 15-минутными промежутками с последующим втиранием 6% раствора чистой соляной кислоты

Rp. Sol. Acidi hydrochlorici puri 6% 100,0
DS. Натирать кожу дважды с 15-минутными промежутками после 2 втираний раствора серноватистокислого натрия

Лечение чесотки по М. П. Демьяновичу.

Sulfur praecipitatum. Сера осажденная.

Rp. Sulfuris praecipitati 5,0
Ol. Rusci 4,0
Vasellini ad 50,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать пораженную кожу

Применяется при грибковых заболеваниях кожи, чесотке, лишаях.

Rp. Sulfuris praecipitati 0,5
D. t. d. N. 15
S. По 1 порошку 3 раза в день перед едой 5 дней подряд

Применяется при энтеробиозе.

Sulfur depuratum. Сера очищенная.

Rp. Sulfuris depurati 4,0
Resorcini 2,5
Pastae Zinci 40,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать пораженные участки кожи

Применяется при угрях, дерматитах.

Rp. Sulfuris depurati 0,5
D. t. d. N. 15
S. По 1 порошку 3 раза в день перед едой 5 дней подряд

Применяется при энтеробиозе.

Rp. Sulfuris
Plumbi acetici
Ammonii chlorati $\bar{a}\bar{a}$ 5,0
Spiritus vini 96° 50,0
Glycerini 10,0
Aquaе destillatae ad 200,0
MDS. Смочить волосы головы 3—6 раз,
дать высохнуть, а после промыть как
обычно (восстановитель цвета во-
лос)

Unguentum sulfuratum simplex. Мазь серная про-
стая.

Rp. Ung. Sulfurati simplicis 50,0
DS. Втирать в пораженные участки кожи
Применяется при чесотке.

Methioninum. Метионин. По 1,0—1,5 на прием.

Rp. Methionini 1,0
D. t. d. N. 20 in oblatiis
S. По 1 облатке 3—4 раза в день

Применяется при болезни Боткина, токсических поражениях пе-
чени.

Solusurminum. Солюсурьмин (Б).

Rp. Sol. Solusurmini 5% 5,0 (10,0)
Sterilisetur!
DS. Вводить свежеприготовленный рас-
твор внутривенно, внутримышечно и
под кожу, начиная с 3 мл, увеличи-
вают на 1,5 мл ежедневно, доходя до
8—10 мл в день

Проводят курс лечения лейшманиоза — 20—30
инъекций.

Solusulfonum. Солюсульфон (Б). Выпускается в виде
порошка.

Rp. Sol. Solusulfoni 50% 10,0
D. Sterilisetur! (стерилизуют в автоклаве
30 минут при температуре 115°).

S. Вводить в мышцы свежеприготовленный раствор два раза в неделю — в первую по 2 мл; во вторую по 2,5 мл; в третью по 3 мл; в четвертую и в последующие по 3,5 мл

Доза может меняться в зависимости от состояния больного. Курс 6 месяцев, затем 1½ месяца перерыв.

Применяется для лечения больных лепрой, лечение проводится в специализированных учреждениях.

Cutisonum. Кутизон (Б).

Rp. Cutisoni 0,05

D. t. d. N. 12 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3 раза в день в течение 3—4 дней

Применяется при гриппозной вирусной инфекции, катарах дыхательных путей.

Trichomonacidum. Трихомонацид (Б). Выпускается в порошке и таблетках по 0,02; 0,05, 0,1.

Rp. Trichomonacidi 0,1

D. t. d. N. 20 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке 3 раза в день после еды

Одновременно мужчинам вводят в уретру 10 мл 1% раствора препарата; женщинам — в цервикальный канал порошок или таблетку в указанной дозе.

Применяется при трихомонадном кольпите, при урогенитальных заболеваниях, где возбудителем является *Trichomonas vaginalis* как у женщин, так и у мужчин.

Rp. Trichomonacidi 0,1

Ol. Cacao 3,0

M. f. globulus vaginalis

D. t. d. N. 10

S. Употребление известно

Показания те же.

Mercaminum salicylicum. Меркамин салициловокислый (Б). По 0,2—0,3 на прием.

Rp. Mercamini salicylici 0,2

D. t. d. N. 6

S. По 1 порошку 3 раза в день

Применяется для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни. Курс 5—7 приемов.

Mercaminum hydrochloricum. Меркамин хлористоводородный (Б).

Rp. Sol. Mercamini hydrochlorici 10% 2,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить по 2 мл внутривенно медленно с 5—7-дневными промежутками

Применяется для профилактики и лечения синдрома лучевой болезни. Курс 4—7 инъекций.

Caferidum. Каферид (Б). Выпускается в виде таблеток, содержащих окись железа с календулой.

Rp. Tabulettae «Caferidi» N. 50

DS. Принимать по 1—2 таблетки 3 раза в день в течение 1—2 месяцев

Применяется при лучевой терапии.

Leucogenum. Лейкоген (Б). Отпускается в порошке и в таблетках по 0,02.

Rp. Leucogeni 0,02

D. t. d. N. 50 in tabulettis

S. Принимать по 1 таблетке 3—4 раза в день до наступления нормализации лейкоцитов в крови

Применяется с профилактической и лечебной целью при проведении курса рентгено-радиотерапии и при лечении препаратами, способствующими развитию лейкопении.

Antidotum metallosum. Противоядие при отравлении солями тяжелых металлов (щелочной 0,5% раствор сероводорода).

Rp. Antidoti metallosum 100,0

DS. Принять внутрь всю порцию

Следует через 10 минут промыть желудок

Unithiolum. Унитиол (Б).

Rp. Sol. Unithiolo 5% 5,0

D. t. d. N. 20 in ampullis

S. Вводить под кожу или в мышцы по 1 мл на 10 кг веса больного 3 раза в день в течение 3—7 суток

Применяется при острых и хронических отравлениях препаратами мышьяка, ртути, висмута и другими солями тяжелых металлов (кроме свинца).

Dicaptolum. Дикаптол. Выпускается в ампулах по 1 мл.

Rp. Sol. Dicaptoli 1,0

D. t. d. N. 20 in ampullis

S. Вводить по 1 мл в ягодичную мышцу через каждые 4 часа в течение суток. На 2-й, 3-й и 4-й день вводят три раза в день по 1 мл; на 5-й и 6-й — по 1 мл в день

Применяется при остром и хроническом отравлении мышьяком, при всех формах отравления арсенобензолом; при появлении дерматита, агранулоцитоза, желтухи сальварсанной. При всех видах отравления золотом, ртутью, висмутом и кадмием и др. тяжелыми металлами, кроме свинца.

Лечение проводится только с разрешения и под наблюдением врача.

Mosatilum. Мозатил. Выпускается в ампулах по 5 мл.

Rp. Sol. Mosatili 5,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить по 5 мл в мышцы 1—2 раза в день

Применяют при воспалительно-экссудативных процессах, различных кровотечениях, а также при отравлениях солями тяжелых металлов.

Teturamum. Тетурам (s. Antabus. Антабус). (Б).
Применяют внутрь для лечения хронического алкоголизма. Выпускается в порошке и таблетках по 0,1—0,15—0,25.

Rp. Teturami 0,15 (0,25)

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. Принимать первый день в 8 часов утра и в 6 часов вечера по 0,5; на 2-й и 3-й день утром и вечером по 0,25; на 4-й день утром 0,25 и на 5-й день утром 0,15, как и в последующие 4 недели; затем дозу уменьшают до 0,1 и дают ее еще в течение 2 недель. Далее в течение месяца в первой половине дня (через день) дают больному тетурам, а через 3—4 часа 20—30 мл 40° алкоголя (водки)

Лечение тетурамом хронических алкоголиков проводят после обследования больного в специализированных психоневрологических лечебницах под строгим наблюдением врача.

Противопоказан при выраженных болезнях сердца, легких, печени, почек, при диабете, базедовой болезни и при тяжелых заболеваниях центральной нервной системы.

Rp. Sol. Cupri sulfurici 0,5% 200,0

DS. Для полоскания рта перед курением табака с целью создания неприятного металлического вкуса, вызывающего отвращение к табаку

8. ХЛОР И КИСЛОРОДОДАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Calcium hypochlorosum. Известь хлорная.

Calcaria chlorata. Известь белильная.

Хранится в сухом прохладном темном нежилом помещении.

Сухую известь хлорную применяют для дезинфекции мочи, кала, мокроты.

В 0,2—5% концентрациях в виде хлорноизвесткового молока — для обеззараживания помещений, посуды и ветоши в отделениях больных брюшным тифом, паратифом, дизентерией, холерой, скарлатиной, дифтерией, гриппом, а 10 и 20% — при сибирской язве, туберкулезе, для дезинфекции отхожих мест как дезинфицирующее и устраняющее запах средство. При полиомиелите к выделениям больного прибавляют по объему $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ хлорной извести и после перемешивания и часового стояния выливают в канализационную систему или дворовую уборную.

Chloraminum В. Хлорамин Б.

Rp. Sol. Chloramini 0,05% 200,0

DS. Для обмывания ран, глаз (1—3% и даже 5% раствор для обеззараживания предметов ухода, выделений)

Рекомендуют при инфекциях кишечной группы и при туберкулезе, при полиомелите—для дезинфекции помещения, белья, игрушек и пр. 3—5% раствор.

Pantocidum. Пантоцид. Выпускается в таблетках по 0,12 с содержанием 48% активного хлора.

Rp. Tabulettae Pantocidi N. 100

DS. По 1—2 таблетки на 0,5—0,75 л воды; через 15 минут происходит ее обеззараживание

Hydrogenii peroxudati diluta. Раствор перекиси водорода.

Rp. Sol. Hydrogenii peroxudati dilutae 3% 100,0

DS. Для обмывания гнойных ран, тампонады носа (при кровотечениях) — 5—10% его растворы для полосканий

Применяют при ангине, язвенном стоматите и для спринцеваний.

Rp. Sol. Hydrogenii peroxudati dilutae

Spiritus vini rectific. aa 10,0

MDS. По 5—10 капель в ухо

Применяют при гнойном отите.

Solutio Hydrogenii peroxudati concentrata. Раствор перекиси водорода концентрированный. Perhydrolum. Пергидрол (Б).

Rp. Perhydroli 0,5

Ol. Bergamottae 1,0

Aquae Amygdalarum amaraum 5,0

Succi Citrici (сок лимона)

Lanolini aa 20,0

M. f. linimentum

DS. Крем для лица

(пропись В. В. Николаева)

Rp. Perhydroli 0,5
Ol. Amygdalar. dulc.
Cerae albae \overline{aa} 10,0
Cetacei 15,0
Aquae Rosae ad 50,0
M. f. linimentum
DS. Крем для лица

Rp. Perhydroli
Camphorae tritae
Acidi salicylici \overline{aa} 0,5
Lanolini
Vaselini \overline{aa} 10,0
M. f. unguentum
DS. Втирать в кожу лица на ночь

Применяется при угрях, веснушках.

Kalium hypermanganicum. Перманганат калия.

Kalium permanganicum. Калий марганцовокислый.

Rp. Sol. Kalii hypermanganici 0,05% 200,0
(1000,0)
DS. Для промывания ран, глаз, полоска-
ний

Применяется для спринцевания, промывания желудка при отравлениях морфином 0,02% раствор; для ванночек гнойного отделения, для обмывания ночной посуды, мяса, рыбы как дезодорирующее, устраняющее зловонный запах готовят 0,02—0,05% раствор. Для лечения ожогов, особенно II степени, покрывают пораженную кожу марлевыми салфетками, сложенными в 6 слоев и смоченными в 0,02—0,05% растворе перманганата калия, и держат их влажными, не снимая в течение 5—6 дней при систематическом (через 4—5 часов) круглосуточном их увлажнении тем же раствором. Сверху покрывают вощеной бумагой, ватой, обвязывают марлей. Детей сажают в ванну с 0,02% раствором перманганата калия (проф. С. Р. Миротворцев). На 6-й день снимают влажную повязку и покрывают пораженные участки 5% или 10% синтомициновой эмульсией.

Rp. Sol. Kalii hypermanganici 3% (5%) 1000,0
DS. 1. Смазывать кожу при ожогах II и III степени.
2. Для приготовления более слабых растворов.
3. Впрыскивать по 2—3 мл 1% раствор 2—3 раза в день под кожу в окружность укуса ядовитых змей

9. ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ ФЕНОЛА, ФОРМАЛЬДЕГИДА,
КРАСИТЕЛИ, ФУРАЦИЛИН

Phenolum purum. Фенол чистый.

Acidum carbolicum crystallisatum. Карболовая кислота кристаллическая (Б). 0,1 (0,3).

Rp. Sol. acidi carbolici 2% (5%) 500,0 (1000,0)
DS. Для дезинфекции инструментов, а также для обеззараживания выделений и жилых помещений при инфекциях кишечной группы, при скарлатине, дифтерии, гриппе

Rp. Phenoli 4,0
Glycerini 20,0
MDS. По 10 капель 2—3 раза в день в ухо в теплом виде

Применяют при воспалении среднего уха.

Rp. Acidi carbolici 1,0
Chloroformii 3,0
MDS. Положить на вате в дупло больного зуба

Rp. Acidi carbolici
Acidi salicylici
Mentholi aa 2,0
Spiritus vini 70° ad 100,0
MDS. Для обтирания кожи (при зуде)

Resorcinum. Резорцин.

Rp. Resorcini 0,2
Spiritus vini 95° 5,0
Aquae destillatae 15,0
MDS. По 2—5 капель в ухо

Применяется при отите.

Rp. Resorcini 4,0
Ol. Ricini 2,0
Spiritus vini 70° ad 200,0
MDS. Для обтирания кожи головы

Применяется при перхоти.

Rp. Resorcini 2,0
Sulfuris praecipitati 3,0
Ichthyoli
Vaselini
Lanolini $\bar{a}\bar{a}$ 15,0
M. f. unguentum
DS. Намазать на пораженную кожу

Применяется при себорее, грибковых поражениях кожи.

Hexilresorcinum. Гексилрезорцин. В 0,5—1% концентрациях образуются коллоидные растворы.

Rp. Hexilresorcini 5,0 (10,0)
Aquae destillatae 1000,0
MDS. Для дезинфекции белья, посуды и мокроты туберкулезных больных (по В. И. Вашкову)

Guajacolum carbonicum (s. Duotalum). Гваяколовый эфир угольной кислоты или дуотал 0,3—0,5.

Rp. Guajacoli carbonici 0,3
Natrii bicarbonici 0,2
Codeini phosphorici 0,01
M. f. pulvis
D. t. d. N. 12 in capsulis amylaceis
S. По 1 капсуле 2—3 раза в день

Применяется при бронхите, бронхоэктазии.

Folia Uvae ursi. Листья толокнянки или медвежьих ушек.

Rp. Decocti folii Uvae ursi 20,0 : 300,0
DS. Принимать по 1 столовой ложке 6 раз в день

Применяется при цистите, пиелите.

Thymolum. Тимол 0,5 (3,0).

Rp. Thymoli 1,5
Mentholi 0,15
Glycerini 5,0
Spiritus vini ad 50,0
MDS. По 2 чайные ложки на $\frac{1}{2}$ стакана воды для полоскания

Применяется при ангине.

Salolum (s. Phenylum salicylicum). Салол (салицилово-фениловый эфир). 0,3—0,5.

Rp. Saloli 0,5
Extr. Belladonnae 0,01
M. f. pulvis
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку на прием 2—3 раза в день

Применяется при гастроэнтероколите.

Салол — слабый антисептик, при длительном употреблении его, особенно при высокой температуре тела, иногда наблюдается образование в кишечнике так называемых салоловых камней, которые могут вызвать боли в животе и явления непроходимости кишечника.

Pix liquida Pini. Деготь сосновый.

Rp. Picis liquidae
Saponis kalini \overline{aa} 25,0
Spiritus vini 70° ad 100,0
MDS. Втирать в пораженные участки
кожи

Применяется при чесотке.

Rp. Picis liquidae 10,0
Sulfuris praecipitati 5,0
Vaselini ad 50,0
M. f. unguentum
DS. Втирать в пораженные участки кожи

Применяется при чесотке.

Oleum Rusci. Деготь березовый.

Rp. Ol. Rusci
Pastae Zinci \overline{aa} 25,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать пораженную кожу

Применяется при экземе, лишае.

Unguentum Wilkinsoni. Мазь Вилькинсона.

Состав: карбоната кальция 10 ч., серы очищенной 15 ч., дегтя жидкого 15 ч., мази нафталанной 30 ч., мыла зеленого 30 ч., воды 4 ч.

Rp. Ung. Wilkinsoni 100,0

DS. Втирать на ночь в пораженные участки кожи в течение 6 дней. На 7-й день принять ванну и сменить белье

Применяется при чесотке.

Rp. Ung. Wilkinsoni

Pastae Zinci \overline{aa} 50,0

MDS. Смазывать кожу

Применяется при экземе, грибковых заболеваниях кожи.

Ol. Cadinum. Деготь можжевеловый.

Rp. Ol. Cadini 5,0 (Picis liquidae, Ol. Rusci)

Xerofornii 3,0

Ol. Ricini 100,0

M. f. linimentum

S. Для тампонады ран

Применяется при вяло гранулирующих ранах, язвах и для невысыхающей повязки при перевозке раненых. Мазь А. В. Вишневского.

Ichthyolum. Ихтиол (s. Ammonium sulfoichthyolicum. Аммониевая соль сульфокислот-сланцевого масла).

Rp. Ichthyoli 15,0

Glycerini

Aquae destillatae \overline{aa} 20,0

MDS. Для смачивания тампонов

Применяется в гинекологической практике.

Rp. Ichthyoli 0,3

Kalii iodati 0,2

Extr. Belladonnae 0,02

Ol. Cacao 2,0

M. f. suppositorium

D. t. d. N. 6

S. Утром и вечером по 1 свече в прямую кишку

Применяют при простатитах и парапроктитах, геморрое.

Rp. Ichthyoli 10,0

Camphorae 2,0

Ol. Terebinthinae 25,0
Lanolini ad 50,0
M. f. unguentum
DS. Втирать в кожу суставов

Применяют при артритах.

Albichtholum. Альбихтол. Маслянистая жидкость.
Действует сходно с ихтиолом, но не загрязняет белье.

Rp. Albichtholi 3,0
Naphthalani 30,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать пораженную кожу

Применяют при экземе.

Rp. Albichtholi 10,0
Glycerini 50,0
MDS. Для смачивания тампонов

Применяют в гинекологической практике.

Rp. Albichtholi 0,3
Extr. Belladonnae 0,02
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 10
S. По 1 свече 2 раза в день

Применяется при геморрое, трещинах заднего прохода.

Unguentum Naphthalani. Мазь нафтализованная. **Naphthalanum.** Нафталан.

Rp. Ung. Naphthalani 100,0
DS. Смазывать пораженную кожу

Применяется при экземе, хронических артритах, радикулитах, пролежнях.

Rp. Naphthalani 40,0
Sulfuris praecipitati
Picis liquidae aa 15,0
Saponis viridis 30,0
M. f. unguentum
DS. Смазывать пораженную кожу

Применяется при чесотке.

Rp. Naphthalani 0,3
Ol. Cacao 3,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 10
S. По 1 свече в прямую кишку 2 раза в день

Применяется при парапроктитах.

Formalinum. Формалин.

Formaldehydum solutum 40%. Раствор формальдегида 40%.

Rp. Formalini 10,0
Spiritus vini 96° 40,0
Aquaе destillatae 50,0
MDS. Протирать кожу ног (подошв) на ночь

Применяется при потливости.

Urotropinum. Уротропин (s. Hexamethylentetraminum. Гексаметилентетрамин). По 0,5—1,0 внутрь; 40% по 5—10 мл в вену.

Rp. Urotropini 0,5
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Применяется при пиелите, цистите.

Rp. Sol. Urotropini 40% 10,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 10 мл в вену

Показания те же.

«Urobosalolum». «Уробесалол».

Состав: уротропин, экстракт красавки и салол.

Rp. Urotropini
Saloli aa 0,25
Extr. Belladonnae 0,015
D. t. d. N. 10 in tabulettis
S. По 1 таблетке 3 раза в день

Применяется как антисептикум при энтероколите.

Calcex. Кальцекс 0,5 (комплексная соль уротропина с хлористым кальцием).

Rp. Calcex 0,5

D. t. d. N. 10 in tabulettis

S. По 1 таблетке 3—4 раза в день

Применяется при гриппе в начале заболевания.

Methylenum coeruleum. Метиленовый синий. Применяется в дозе 0,1—0,2.

Rp. Methyleni coerulei 1,0

Spiritus vini 70° 50,0

MDS. Смазывать пораженную кожу

Применяется при пиодермии, рожистом воспалении, ожогах.

Rp. Methyleni coerulei 0,5

Sol. Glucosi 25% 50,0

D. t. d. N. 3 in ampullis

S. Вводить в вену

Применяется при отравлении окисью углерода.

Viride nitens (s. Brilliantgrün). Бриллиантовый зеленый. Золотисто-зеленый порошок.

Rp. Viridis nitentis 0,5

Spiritus vini 70° 50,0

MDS. Смачивать кожу

Применяется при пиодермии, сикозе; 0,3% водный раствор при блефарите; для смазывания изъязвлений в полости рта.

Rivanolum (Acricidum). Риванол (Б). Желтый порошок 0,05 (0,15).

Rp. Sol. Rivanoli 0,1% 500,0

DS. Для промывания ран, глаз, для полоскания горла

Применяют в виде примочек при пиодермии, сикозе.

Трифлауин. Трифлауин.

Flavacridinum hydrochloricum. Флавакридин хлористоводородный (Б). Оранжево-красный порошок. По 0,2 (0,8).

Rp. Sol. Трифлауини 0,1% 500,0

DS. Для промывания ран, для полосканий

Yatrenum. Ятрен (Б). Порошок желтого цвета
1,0 (3,0).

Rp. Yatreni 0,5
D. t. d. N. 10 in capsulis gelatinosis
S. Принимать по 1 капсуле 3 раза в день
после еды

Применяют при амёбной дизентерии, колитах, циститах.

Chinosolum. Хинозол.

Rp. Sol. Chinosoli 0,1% 200,0
DS. Для промывания ран

Rp. Chinosoli
Acidi borici aa 0,25
Ol. Cacao
M. f. globulus
D. t. d. N. 10
S. Влагалищные шарики

Применяют как противозачаточные; дезинфицирующие

Fugacilinum. Фурацилин (Б).

Rp. Sol. Fugacilini 1 : 5000 10,0
DS. По 2 капли в глаз 2 раза в день

Применяют при конъюнктивитах; растворами той же концентрации промывают раны, лечат ожоги, пролежни, газовую гангрену.

Aloosutenum. Алооцимен. Выпускается в виде готового водно-спиртового коллоидного раствора в ампулах по 5 мл. (0,025% алооцимена и 2,5% этилового спирта.)

Rp. Aloosuteni 5,0
DS. Глазные капли или примочка

Применяют при кератитах различной этиологии: язвенных, герпетических скрофулезных и иритах и иридоциклитах. При ожогах слизистой оболочки и роговицы глаза, при аллергических поражениях кожи.

Micoseptinum. Микосептин — мазь, состоящая из 5% ундециленовой кислоты и 20% ундециленовокислого цинка и 75% мазевой основы.

Rp. Ung. Micoseptini 30,0
DS. Наносить на пораженные участки кожи 2 раза в день

Применяют при кожных микотических заболеваниях, микотических экземах.

Undecinum. Ундецин. Unguentum Undecinum. Ундециновая мазь.

Состав: 10% ундециленовой кислоты, 10% медной соли ундециловой кислоты, 5% парахлорфенилового эфира глицерина и 75% мазевой основы.

Rp. Unguenti Undecini 50,0 (100,0)

DS. Смазывать пораженную кожу 2 раза в день в течение 1—2 недель

Назначается при грибковых поражениях кожи.

Nitrofunginum. Нитрофунгин. Выпускается во флаконах по 25 мл жидкости.

Rp. Nitrofungini 25,0

DS. Пораженные места смазывают или протирают 2—3 раза в день до исчезновения симптомов заболевания

При появлении признаков раздражения применяют разбавленный раствор дистиллированной водой 1:1. Перед употреблением взбалтывать.

Применяется при грибковых заболеваниях кожи, особенно при эпидермофитии, трихофитии и грибковой экземе.

Sanogin-Analerginum. Санорин-аналергин (Б). Выпускается в виде капель во флаконах по 10 мл.

Rp. Sanogin-Analergini 10,0

DS. Вводить по 1 капле в конъюнктивальный мешок глаза, или по 2—3 капли в каждую половину носа 3—4 раза в день

Применяется при кератитах, конъюнктивитах, ринитах.

10. ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ И ИНСЕКТИЦИДНЫЕ СРЕДСТВА

Extractum Filicis magis aethereum. Экстракт мужского папоротника эфирный (Б). Густая масса зеленого цвета: максимальная доза 8,0 на прием. Лечебная 4,0—6,0, которая применяется однократно. Если лечение экстрактом папоротника оказалось безуспешным, то повторять его можно не раньше чем через 15 дней.

Rp. Extr. Filicis maris aetherei 0,5
D. t. d. N. 12 in capsulis gelatinosis
S. Выпить натошак в течение получаса $\frac{1}{2}$ —1 стакан 1% прохладного раствора двууглекислой соды, а затем принять за 30 минут все капсулы, запивая тем же раствором соды. Через 2 часа солевое слабительное 20,0—30,0 сульфата магния растворить в $\frac{1}{2}$ стакана воды и запить 1—2 стаканами воды

Применяется при ленточных глистах.

Rp. Extr. Filicis maris aetherei 6,0
Melis depurati 25,0
MDS. Принять в течение часа

Показания те же.

Filixanum. Филіксан (Б).

Rp. Filixani 0,5
D. t. d. N. 10 (20) in tabulettis
S. Принять однократно 10—15 таблеток в течение 30 минут, запивая 1% раствором двууглекислой соды

Применяется при тенидозах.

Ввиду возможного побочного действия (тошнота, рвота, понос, головная боль, ослабление сердечной и дыхательной деятельности, ухудшение зрения) лечение экстрактом мужского папоротника и филіксаном нужно проводить под наблюдением врача, желательно в условиях стационара.

Противопоказания: беременность, язвенная болезнь, острые желудочно-кишечные заболевания, малокровие, активная форма туберкулеза, декомпенсация сердца, болезни печени, почек.

Cortex Granati. Кора гранатника.

Rp. Decocti corticis Granati 50,0 200,0
DS. Принять натошак, спустя час солевое слабительное

Применяется при всех ленточных глистах.

Extr. Granati fluidum. Экстракт из коры гранатника.

Rp. Extr. Granati fluidi 50,0
DS. Принять натошак

Показания те же.

Semina Cucurbitae decorticata. Семена тыквы очищенные. По 300,0 на прием.

Rp. Sem. Cucurbitae decorticatae 200,0
Melis depurati 40,0
MDS. Принять в течение часа, через
3—4 часа слабительное

Применяется при ленточных глистах.

Flos Cinae. Цитварная полынь. По 2,0—5,0 до 10,0 на день.

Rp. Flores Cinae 50,0
DS. Применять по $\frac{1}{2}$ —1 чайной ложке
3 раза в день 3 дня подряд за час до
еды в смеси с медом, сиропом, ва-
реньем или кашей

Применяется при круглых глистах аскаридах.

Santoninum. Сантонин (Б). 0,1 (0,4).

Rp. Santonini 0,05
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. Принимать по 2 таблетки натошак
3 раза подряд с промежутком в 1 час,
а еще через 1 час солевое слабительное

Применяется при круглых глистах, аскаридах. Лечение длится 2 дня.

Rp. Santonini 0,1
Pulv. rad. Rhei 0,5
M. f. pulvis
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку через час 2 раза в день
по утрам, 3 дня подряд

Показания те же.

Rp. Santonini 0,08
Ol. Cacao 2,0
M. f. suppositorium
D. t. d. N. 6
S. Вводить в прямую кишку 2 раза в день

Применяется при острицах.

Rp. Santonini
Calomelanos $\bar{a}\bar{a}$ 0,1
Pulv. rad. Rhei 0,5
M. f. pulv.
D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку натошак 3 раза подряд
с промежутком в 1 час

Применяется при круглых глистах, аскаридах, при дехлорированной диете. Лечение длится 2 дня.

Sancaphenit. Санкафен (Б). Выпускается в таблетках, содержащих 0,016 сантонина, 0,0065 каломели и 0,016 фенолфталеина.

Rp. Tabulettae Sancapheni N. 20
DS. Принимать натошак по 5 таблеток 2 раза подряд с $\frac{1}{2}$ —1-часовым промежутком. Вечером очистительная клизма. На 2-й день лечение повторить, на ночь солевое слабительное

Применяется при аскаридах.

Carboneum tetrachloratum. Четыреххлористый углерод (Б). Жидкость с запахом. Высшая доза — разовая и суточная — 3 мл.

Rp. Carbonei tetrachlorati 1,0
D. t. d. N. 3 in capsulis gelatinosis
S. Принять все капсулы сразу подряд, запивая водой. Через 5 минут солевое слабительное

Применяется при анкилостомидозе, тениидозе, аскаридозе и энтеробиозе.

Возможное побочное действие: тошнота, головокружение, желтуха.

Противопоказания при применении четыреххлористого углерода: беременность, гипертиреоз, болезни печени и почек.

Heptylresorcium. Гептилрезорцин (Б).

Rp. Heptylresorcini 0,1
D. t. d. N. 12 in tabulettis
S. Принять все таблетки натошак, не разжевывая

Применяется при аскаридозе, трихоцефалезе и анкилостомидозе.

Лечение проводится под наблюдением врача при постельном режиме. Применять гептилрезорцин не рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при пониженном питании.

Oleum Chenopodii. Хеноподиевое масло (Б). Употребляется по 2,0 (вместе с касторовым маслом или в желатиновых капсулах, запивая 30% раствором сернокислой магнезии — 100—150 мл) для взрослого. Детям по 1 капле на 1 год жизни, но не более 10 капель.

Rp. Ol. Chenopodii 2,0

Ol. Ricini 40,0

MDS. Через 2 часа после легкого завтрака (углеводное питание) больной принимает всю порцию за один раз

Применяется при аскаридозе, анкилостомидозе. Иногда бывают осложнения: тошнота, боли в животе, брадикардия. В этих случаях рекомендуются промывание желудка, слабительные и стимуляторы сердечной деятельности.

Противопоказания: болезни печени, почек, язвенная болезнь, беременность, истощение, преклонный возраст, заболевания нервной системы.

Лечение производится в условиях стационара. Повторное назначение хеноподиевого масла проводится не раньше чем через 1—2 месяца.

Thymolum. Тимол 0,5 (3,0).

Rp. Thymoli 0,5

D. t. d. N. 6 in oblatiis

S. Принять в течение 30—50 минут

Применяют при трихоцефалезе, энтеробиозе.

Piperazine sulfuricum. Пиперазин сульфат. Выпускается в порошках, таблетках по 0,2 и 0,5.

Rp. Piperazini sulfurici 0,5

D. t. d. N. 16 in tabulettis

S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды

Ребенку 1 года разовая доза по 0,2 два приема в день; 2—3 лет по 0,2 три приема в день; 4—6 лет по 0,5 два раза в день; 7—9 лет по 0,5, три раза; от 10 до 14 лет по 1,0 два раза в день; детям 15 лет и взрослым по 1,0 три — четыре раза в день (при аскаридозе лечение проводится два дня подряд при обычном пищевом режиме, а после слабительное — солевое, пурген, ревеня). При энтеробиозе — в тех же дозах по 3—5 дней с перерывами по 7 дней. Всего 2—3 цикла.

Piperazinum adipinicum. (Piperascatum. Пипераскат).
Пиперазин адипинат. По 0,2—0,5—1,0 в порошках и таб-
летках.

Rp. Piperazini adipinici 0,5 (1,0)

D. t. d. N. 9

S. Принимать по 1 порошку 3 раза в день
после еды 3 дня подряд, а после слаби-
тельное

Применяют при аскаридозе.

Piperazinum hexahydratum. Пиперазин гексагидрат.
Выпускается в виде раствора в сахарном сиропе.

Rp. Piperazini hexahydrati 30

Sirupi simplicis ad 100,0

MDS. Принимать по 1 столовой ложке
2 раза в день (ребенку 8 лет)

Применяется при аскаридозе, энтеробиозе у взрослых и детей;
см. Пиперазин сульфат.

Ditrazinum. Дитразин. По 0,1—0,2 на прием до 0,6 в
сутки.

Rp. Ditrazini 0,2

D. t. d. N. 10

S. По 1 порошку 3 раза в день. Вечером
в дни приема слабительное

Применяют при аскаридозе, острицах.

Pentachlorinum. DDT. Пентахлорин. ДДТ.

Rp. Pentachlorini 100,0

D. in scatula

S. Распыляют по 25,0 ДДТ на 1 м² в ме-
стах пребывания вшей, клопов, таракан-
нов, блох, мух, москитов, комаров, кле-
щей, моли, муравьев и других па-
разитов

Hexachloranum. Гексахлоран. Препарат обладает рез-
ким неприятным запахом.

Rp. Hexachlorani 100,0

D. in scatula

S. Применяется для уничтожения насекомых

См. Пентахлорин; применяется также для борьбы с комарами в заболоченных местностях—в виде аэрозолей, водных суспензий.

Pulvis Pyrethri. Порошок пиретрум.

Rp. Pulveris Pyrethri 100,0

D. in scatula

S. Применяется для опыления белья, постельных принадлежностей, волосистой части тела

Применяют для уничтожения паразитов; см. Пентахлорин.

Repudinum. Репудин. Выпускается во флаконах по 150 мл. Сохраняется в защищенном от света месте и вдали от огня.

Rp. Repudini 150,0

DS. Жидкостью смазывают руки, лицо и другие открытые части тела; пропитывают капюшоны, косынки, сетки, чулки, перчатки, оконные и дверные занавески, постельное белье

Применяется как отпугивающее средство от комаров, москитов, мошек и других насекомых. Продолжительность действия 3—6 часов.

Препарат ткани не портит и пятен не оставляет; при попадании на слизистые оболочки глаз, раны, ссадины вызывает жжение, смывается мылом.

VII. ПРОПИСИ СЫВОРОТОК И ВАКЦИН¹

(составлено по данным Государственной фармакопеи,
VIII издания)

SERA. СЫВОРОТКИ

Serum antitbotulinicum. Сыворотка противоботулиническая. В 1 мл 1000 АЕ (АЕ — антитоксическая единица).

Rp. Seri antitbotulinici 50 000 АЕ

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить по 10 000—15 000 АЕ внутримышечно с профилактической целью; с лечебной целью — внутривенно или внутривенно по 25 000—50 000 АЕ через 5—10 часов до исчезновения клинических явлений

Serum antidiphthericum. Сыворотка противодифтерийная — диаферм.

Rp. Seri antidiphtherici 10 000 АЕ

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить внутримышечно через 12—24 часа по 10 000—30 000 АЕ (по Безредке)

¹ Подробности использования в лечебных профилактических целях сывороток и вакцин приводятся в наставлениях и инструкциях, которые прилагаются к упаковке каждого препарата.

Serum antidysentericum. Сыворотка противодизентерийная. В 1 мл 600 АЕ.

Rp. Seri antidysenterici 5000 — 10 000 АЕ
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводить внутримышечно по 10 000—20 000 АЕ и более в 1—3-й день заболевания

Sera antigangraenosa. Сыворотки против газовой гангрены — диаферм (смесь сывороток: antiperfringens, antivibriosepticus, antihistolyticus по 100, АЕ, antioedematiens 1000 АЕ в 1 мл).

Rp. Serorum antigangraenosum 30 000 АЕ
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Ввести в подогретом виде внутримышечно или внутривенно 30—100 мл сыворотки в 100—400 мл стерильного физиологического раствора (по Безредке)

Serum antiscarlatinosum antitoxicum. Сыворотка противоскарлатинозная антитоксическая — диаферм. В 1 мл 250 АЕ.

Rp. Seri antiscarlatinosi antitoxici 20 000 АЕ
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Вводить внутримышечно (реже внутривенно) по 20 000—50 000 АЕ и более не позднее 3—4-го дня болезни

Serum antitetanicum. Сыворотка противостобнячная — диаферм. В 1 мл 1500—3000—20 000 АЕ.

Rp. Seri antitetanici 1500 (3000—20 000 АЕ)
D. t. d. N. 30 in ampullis
S Вводить внутримышечно по 3000 АЕ в профилактических целях; в лечебных целях—по 50 000—200 000—400 000 АЕ и более (внутримышечно, внутривенно, внутривенно) в течение 3—5 дней, через 7—10 дней повторить. Детям 1500—2000 АЕ (по Безредке)

Serum antistaphylococcicum antitoxicum. Сыворотка противостафилококковая антитоксическая (титр не установлен).

Rp. Seri antistaphylococci antitoxici 50 мл
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. Вводить внутримышечно или внутривенно по 5—10—25 мл и более по мере необходимости

Serum antimeningococcicum. Сыворотка противоменингококковая.

Rp. Seri antimeningococcici 10 мл
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. Вводить внутримышечно, внутривенно или в спинномозговой канал по 10—20—50 мл в первые дни болезни

Serum antimorbillogum. Сыворотка противокоревая.

Rp. Seri antimorbillogum 30 мл
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. Ввести внутримышечно (не позднее 5—7-го дня с момента контакта) 30—80 мл

Сухая лошадиная противогриппозная сыворотка, смешанная с норсульфазолом. Выпускается во флаконах по 2,0—20,0.

Применяется для лечения и профилактики вирусного гриппа типов А-1, А-2, В и D. Вводят сыворотку в носовые ходы 2—3 раза в день путем вдыхания, втягивания в обе половины носа, начиная с 1—2-го дня болезни, продолжают 2—3 дня. Для профилактики гриппа сыворотку вводят повторно с интервалами в 5—7 дней в течение всего периода гриппозной вспышки.

Gamma-globulinum. Гамма-глобулин 3 (1,5) мл соответствуют 30 мл противокоревой сыворотки. Срок годности 1 год.

Rp. Gamma-globulini 3,0
D. t. d. N. 2 in ampullis

S. Ввести 3 мл внутримышечно в верхний наружный квадрант ягодицы (не позднее 5—7-го дня с момента контакта)

Применяют при кори, скарлатине в целях профилактики.

При полиомиелите в профилактических целях взрослым вводят по 6 мл.

При полиомиелите лечебная однократная доза для детей 2 лет 12—18 мл в сутки (0,5—1 мл на 1 кг веса ежедневно до снижения температуры тела).

Для детей старших лет доза увеличивается.

Vaccina. Вакцины

Vaccinum brucellosum. Вакцина бруцеллезная. В 1 мл содержится 2 млрд. микробных тел. Срок годности 1 год.

Rp. *Vaccini brucellosi* 1,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить подкожно, внутримышечно или внутривенно от 10 млн. до 10 млрд. микробных тел

Проводят курс лечения — 10 впрыскиваний или вливаний в возрастающих дозах с интервалами в 2—4 дня.

Vaccinum gonococcicum. Вакцина гонококковая. В 1 мл содержится от 200—500 млн. до 1 млрд. микробных тел. Срок годности 1 год (гретая) или 6 месяцев (формалиновая).

Rp. *Vaccini gonococcici* 1,0 (или 100 мл флакон)

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 0,2—1 мл под кожу через 4—6 дней

Vaccinum pertussicum. Вакцина коклюшная. В 1 мл содержится 10 млрд. микробных тел. Срок годности 2 года.

Rp. *Vaccini pertussici* 2,0

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить под кожу, внутримышечно по 0,3—0,5—1 мл (в зависимости от возраста) через каждые 2—3 дня. При повторных введениях дозы увеличиваются в 1½—2 раза

Vaccinum gabiei. Вакцина антирабическая. Хранить при температуре от 5 до 8° в темном месте (Филипса и Ферми).

Rp. Vaccini gabiei 2,0
D. t. d. N. 30 in ampullis
S. Вводить под кожу живота по 1—3 мл 1—2 раза в день (до 20—30 прививок по назначению пастеровских пунктов). Перед употреблением встряхивать

Vaccinum scarlatinosum compositum. Вакцина скарлатинозная комбинированная. В 1 мл 2000 кожных доз токсина и 1 млрд. убитых скарлатинозных стрептококков. Срок годности 2 года.

Rp. Vaccini scarlatinosi compositi 1,0
D. t. d. N. 20 in ampullis
S. По 1 мл под кожу пятикратно

Vaccinum staphylococcicum. Вакцина стафилококковая. В 1 мл 1 млрд. микробных тел. Срок годности 2 года.

Rp. Vaccini staphylococcici 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 0,2—1 мл подкожно с интервалами от 4 до 12 дней

Vaccinum streptococcicum. Вакцина стрептококковая поливалентная. В 1 мл 1 млрд. микробных тел. Срок годности 2 года.

Rp. Vaccini streptococcici 1,0
D. t. d. N. 6 in ampullis
S. По 0,1—0,3—1 мл подкожно. Перед употреблением встряхивать

Vaccinum tuberculosis BCG. Вакцина туберкулезная БЦЖ. Срок хранения 15 дней при температуре от 2 до 10°. Хранить в темном месте.

Rp. Vaccini tuberculosis BCG 2,0

D. t. d. N. 20 in ampullis

S. Принимать внутрь по 1—2 мл с грудным молоком троекратно с 48-часовыми промежутками. При накожной вакцинации кожу наружной поверхности плеча дезинфицируют спиртом, наносят 3 капли вакцины, через которые производят скарификацию кожи; через 1—2 минуты накладывают на кожу салфетку, смоченную вакциной в виде компресса; через час снимают

Vaccinum BCG siccum. Сухая вакцина БЦЖ по 1—3 дозы в ампулах. Срок годности при температуре не выше 8° 1 год.

Rp. Vaccini BCG sicci dosis unum

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Одну дозу вакцины развести в 1 мл кипяченой воды, смешать с небольшим количеством грудного молока и немедленно дать ребенку через рот за 30 минут до кормления — 3 раза через день на 3—5—7-й день от рождения

Vaccinum tularemiae. Вакцина туляремийная. В 1 мл содержится 25—50 млн. микробных тел.

Rp. Vaccini tularemiae 3,0

D. t. d. N. 6 in ampullis

S. Вводить под кожу по 0,1—1 мл по мере надобности

Vaccinum typho-paratyphosum A et B — тривакцина (тиф и паратиф А и Б). Срок годности 2 года.

Rp. Vaccini typho-paratyphosi 1,0

(или 50—100 мл во флаконе)

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить под кожу по 0,5—1—1 мл с интервалами в 7—10 дней. Детям вводят меньшую дозу, соответственно их возрасту

Vaccinum typho-paratyphosum B. Дивакцина тиф и паратиф Б. В 1 мл 1,5 млрд. тел. Срок годности 2 года.

Rp. Vaccini typho-paratyphosi B 1,0 (5 мл)
(или 50 мл во флаконе)

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. Вводить под кожу по 0,5—1—1 мл с интервалами в 7—10 дней по мере необходимости. Детям вводят меньшую дозу, соответственно их возрасту

Pentavaccinum. Пентавакцина. В 1 мл содержится 1 млрд. тифозных, 250 млн. паратифозных и 750 млн. дизентерийных микробных тел. Срок годности 2 года.

Rp. Pentavaccini 1,0 (или флакон на 50—100 мл)

D. t. d. N. 10 in ampullis

S. По 0,5—1 мл под кожу троекратно с интервалами в 7—10 дней. Детям в зависимости от возраста $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ дозы взрослого

Polyvaccinum. Поливакцина НИИСИ. Срок годности при температуре не ниже 10° 1 год.

Rp. Polyvaccini 10,0

DS. Ввести 2 мл под кожу однократно
Перед употреблением встряхивать

Anatoxinum diphthericum. Дифтерийный анатоксин. В ампулах по 1, 5, 10 и 30 мл. Срок годности 3 года (нативный).

Rp. Anatoxini diphtherici 3,0

D. t. d. N. 20

S. Вводить строго подкожно под нижним углом лопатки двукратно по 1,2 мл с интервалами в 20—30 дней (или троекратно по 1 мл с теми же интервалами)

Применяют в целях профилактики при дифтерии.

Vaccinum variolae. Оспенный детрит. Выпускается в капиллярах по 10—20 доз или в сухом виде с растворителем. Хранится при температуре от 2 до 6°.

Rp. *Vaccini variolae* doses 20

DS. Кожу плеча обтереть спиртом, нанести 3 капли детрита на расстоянии 2 см и через них сделать линейные поверхностные разрезы от 0,5 до 1 см длины и дать высохнуть

**VIII. ВЫСШИЕ РАЗОВЫЕ ДОЗЫ ЯДОВИТЫХ И
СРЕДСТВ**
(по Государственной

Наименование	Возраст	
	до 6 месяцев	от 6 месяцев до 1 года
Acidum hydrochloricum dilutum	1 капля 1%	1 капля
Acrichinum	0,0125	0,0125
Adonisidum	1 капля	3 капли
Adrenalinum hydrochloricum solutum (0,1%)	0,1—0,2 мл	0,25 мл
Antipyrinum	Не назна- чается	0,05
Atropinum sulfuricum	0,0002	0,0002
Bijochinolum	0,3—0,5 мл	0,8 мл
Bromuralum	0,05	0,1
Chloratum hydratum	0,1	0,15
Codeinum	Не назначается	
Codeinum phosphoricum	То же	0,002
Coffeinum	» »	0,025
Coffeinum natrio-benzoicum	0,05	0,05
Dioninum	Не назначается	
Diuretinum	0,05	0,01
Ephedrinum hydrochloricum	0,005	0,005
Extractum Belladonnae	Не наз- начается	0,0025
Extractum Filicis aethereum	Не назначается	
Extractum Opii siccum	Не назначается	
Folium Digitalis	0,005	0,01
Gitalenum	2 капли	2 капли
Herba Adonidis vernalis	Не назначается	
Liquor arsenicalis Fowleri	То же	
Lobelinum hydrochloricum	0,0025	0,0025
Luminalum	0,01	0,02
Medinalum	0,03	0,075
Mercusalum	0,1 мл	0,2 мл
Morphinum hydrochloricum	Не назначается	
Novarsenolum	0,03—0,15	0,05—0,15
Opnoponium	Не назначается	
Osarsolum как противоглистное	Не назна- чается	
Paraverinum hydrochloricum	Не назна- чается	0,005
Pulvis Doveri	Не назначается	
Pyramidonum	0,025	0,05
Radix Ipecacuanhae	0,01	0,01

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ (фармакопее VIII издания)

Возраст				
2 года	от 3 до 4 лет	от 5 до 6 лет	7 лет	от 8 до 14 лет
2 капли 1 % 0,025	3 капли 1,5% 0,04	5 капель 1,5% 0,05	7 капель 2% 0,075	8—10 капель 2% 0,1
3 капли 0,3 мл 0,1	5 капель 0,4 мл 0,15	6 капель 0,5 мл 0,2	7 капель 0,6 мл 0,25	8—15 капель 0,6—1 мл 0,25—0,3
0,0002 1 мл 0,15 0,15 0,002 0,003 0,04 0,06 0,003 0,15 0,006 0,003	0,00025 1,25 мл 0,2 0,2 0,004 0,005 0,05 0,08 0,005 0,2 0,008 0,004	0,0003 1,25 мл 0,25 0,25 0,005 0,006—0,008 0,06 0,1 0,006 0,25 0,012 0,005	0,0004 1,5 мл 0,3 0,3 0,006 0,01 0,075 0,15 0,0075 0,3 0,015 0,0075	0,0005 1,5—2 мл 0,3 0,3—0,5 0,06—0,01 0,015—0,02 0,075—0,1 0,15—0,2 0,0075—0,01 0,4—0,5 0,015—0,025 0,01—0,015
1,0 Не назна- чается 0,02	1,5—2,0 0,03	2,5—3,0 0,01 0,04	3,5 0,015 0,05	4,5—5,0 0,015—0,02 0,05—0,075
3 капли 0,15	4 капли 0,2	6 капель 0,25	7 капель 0,3	От 8 до 14 капель 0,3—0,5
1 капля 0,003 0,03 0,1 0,25 мл 0,001 0,05—0,2 0,002	1 1/2 капли 0,004 0,04 0,15 0,3 мл 0,0015 0,1—0,3 0,004	2 капли 0,006 0,06 0,2 0,5 мл 0,0025 0,1—0,3 0,006 0,08 0,02	2 1/2 капли 0,0075 0,07 0,25 0,75 мл 0,003 0,1—0,3 0,007 0,09 0,02	3 капли 0,01 0,1 0,3 1 мл 0,003—0,005 0,1—0,3 0,008—0,01 0,1—0,19 0,03
0,01 0,05 0,05 0,01	0,015 0,1 0,1 0,015	0,1 0,1 0,02	0,15 0,15 0,02	0,15—0,25 0,2—0,3 0,025

Продолжение

Возраст				
2 года	от 3 до 4 лет	от 5 до 6 лет	7 лет	от 8 до 14 лет
0,2 на 1 кг веса на		сутки		
0,00025 2 капли 2 капли	0,0003 3 капли 4 капли	0,0005 3 капли 6 капель	0,0006 4 капли 7 капель	0,00075—0,001 4—6 капель 8—15 капель
1 капля 0,1	По 1/2 капли на 1 год жизни		5 капель 0,25	5—6 капель 0,3
	2 капли 0,15	3 капли 0,02		

ных средств (Б), указанных в данном пособии, рассчитаны для в зависимости от доз для взрослых, приблизительно из следующего

также и для лиц, перешедших 60-летний возраст.

**IX. СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В НЕКОТОРЫХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ¹
(В МИЛЛИГРАММАХ НА 100 Г)²**

Наименование продуктов	А	В ₁	В ₂	РР	С
Хлеб ржаной	—	0,15	0,13	0,45	—
Хлеб пшеничный белый	—	0,10	0,07	0,67	—
Крупа гречневая	—	0,50	—	4,4	—
Крупа ячневая	—	0,20	0,15	2,5	—
Крупа овсяная	—	0,60	0,14	1,0	—
Горох	—	0,72	0,15	2,4	—
Чечевица	—	0,50	0,21	1,8	—
Говядина	0,01	0,10	0,19	4,2	—
Баранина	—	0,17	0,15	5,8	—
Свинина	—	0,40	0,16	2,7	—
Печень говяжья	15,0	0,40	1,61	22,0	31,6
Курица	—	0,16	0,16	6,9	—
Судак	—	0,04	0,11	2,3	—
Сазан	—	0,02	0,14	2,8	—
Треска	—	0,04	0,05	2,3	—
Молоко	0,05	0,05	0,19	0,10	1,0
Масло коровье (сливочное и топленое)	0,6	—	—	—	—
Сыр	0,45	0,03	0,45	0,1	—
Яйца (1 штука)	0,65	0,07	0,16	0,12	—
Картофель	Следы	0,10	0,05	0,9	10,0
Капуста квашеная с рассолом	—	0,02	0,03	0,3	20,0
Капуста квашеная, хранившаяся без рассола	—	0,02	0,03	0,3	—
Капуста белокочанная	Следы	0,06	0,05	0,4	30
Капуста цветная	Следы	0,11	0,10	0,6	70
Морковь	9	0,06	0,06	0,4	5
Лук репчатый	0,03	0,03	0,04	0,2	10
Помидоры	2	0,06	0,04	0,5	40
Салат	0,12	0,04	0,08	0,2	7
Яблоки	0,1	0,04	0,03	0,2	7
Вишня	0,3	0,05	0,06	0,4	15
Виноград	—	0,06	0,04	0,2	3
Слива	0,1	0,06	0,04	0,5	5
Земляника садовая	—	0,03	0,06	0,3	60
Смородина черная	0,7	0,06	—	—	300
Смородина красная	—	0,07	—	—	30
Апельсины	0,3	0,08	0,03	0,2	40
Лимоны	0,40	0,04	—	0,1	40
Шиповник (очищенные плоды)	4	—	—	—	4 500
Дрожжи пивные сухие	—	5	4	40	—

Продолжение

Наименование продуктов	A	B ₁	B ₂	PP	C
Дрожжи пекарские прессованные	—	0,45	2	28	—
Дрожжи пекарские сухие	—	1,8	8	112	—

¹ По данным Межведомственной комиссии по витаминам (1958 г.).

² В тексте содержание витаминов показано в миллиграмм-процентах (мг%), что как раз и равно числу миллиграммов в 100 г продукта.

ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ

Приложение
к приказу по Министерству
здравоохранения СССР от 21
января 1959 г. № 24.

1. Рецепты должны выписываться разборчиво и четко на форменных бланках единого образца, желательного отпечатанных типографским способом (приложение 1).

2. На одном рецептурном бланке прописывается только одно лекарство, содержащее ядовитое вещество, и не более двух лекарств в остальных случаях.

3. Рецепты выписываются чернилами, исправления в рецептах не допускаются.

4. При необходимости экстренного отпуска лекарства больному врач пишет на видном месте рецепта сверху бланка: *Cito!* (быстро) или *Statim* (немедленно).

5. На всех без исключения рецептах должны быть следующие обязательные обозначения последовательно:

а) штамп медицинского учреждения с обозначением адреса учреждения и номера телефона (на рецепте частнопрактикующего врача указывается фамилия, домашний адрес врача и номер его телефона);

б) инициалы и фамилия больного (для детей и лиц старше 60 лет указывается возраст);

в) дата выдачи рецепта (число, месяц, год);

г) фамилия и инициалы врача (разборчиво) или штампик с обозначением его фамилии;

д) состав лекарств, т. е. латинское наименование ингредиентов и их количество. Сокращение обозначений, близких по наименованию ингредиентов, не позволяющих установить, какое именно лекарственное средство прописано, не допускается;

е) обозначение лекарственной формы и другие указания фармацевту (по принятому сокращению);

ж) способ применения лекарства (на русском или местном языке). При этом запрещается ограничиваться общими указаниями «внутреннее», «известно» и т. д., а необходимо указать способ применения с обозначением дозы и в необходимых случаях времени приема. Например. «по одной таблетке 3 раза в день за 1/2 часа до еды» и т. д.

з) личная подпись врача.

6. Рецепты на лекарства, содержащие ядовитые вещества списка А (и этиловый спирт), должны иметь, кроме обозначений, перечисленных в п. 5, печать медицинского учреждения (круглую или

треугольную) или личную печать врача, если рецепт выписывается частнопрактикующим врачом. Рецепты на лекарства, в состав которых входят наркотические вещества, оформляются согласно особым указаниям Министерства здравоохранения СССР.

7. При необходимости повторить больному выписанное лекарство врач обязан указать об этом в рецепте на видном месте, скрепив эту надпись своей подписью. При выписывании копии рецепта (сигнатуры), это указание заверяется подписью рецептара аптеки. Для повторения лекарства, содержащего наркотическое вещество или этиловый спирт, врач должен выписать больному новый рецепт.

8. Прописывая ядовитое или сильнодействующее вещество в дозе, превышающей высший однократный прием, врач обязан написать дозу этого вещества прописью и поставить восклицательный знак. При несоблюдении врачом этого требования фармацевт аптеки обязан уточнить у врача дозу по телефону или письменно (в запечатанном конверте) и лишь после получения ответа отпустить прописанное лекарство в соответствующей дозировке.

9. Рецепт на лекарство, содержащее ядовитое или сильнодействующее вещество, действителен в течение не более 30 дней со дня его выдачи. По истечении указанного срока рецепт считается недействительным и аптекой не принимается.

10. Средний медицинский персонал не пользуется правом прописывания лекарства, содержащих ядовитые и сильнодействующие вещества, за исключением:

а) фельдшеров — заведующих самостоятельными медицинскими пунктами, а также работающих (временно) на врачебных должностях, которые могут прописывать для больных за своей подписью (с указанием на рецепте своей должности) лекарства, содержащие ядовитые и сильнодействующие вещества в количествах, не превышающих высших доз;

Примечание. Список фельдшеров, работающих на указанных должностях, должен быть доведен органами здравоохранения до сведения всех аптек района.

б) фельдшеров и акушеров, которые могут для оказания экстренной медицинской помощи больным прописывать за своей подписью с указанием своего медицинского звания лекарства, содержащие ядовитые и сильнодействующие вещества в дозах, не превышающих высших доз, по прилагаемому списку (приложение 2);

в) зубных врачей со средним медицинским образованием, которые могут выписывать за своей подписью ядовитые и сильнодействующие вещества, применяемые в стоматологическом кабинете (без права выдачи их пациентам на руки), по прилагаемому списку (приложение 3).

11. Врач (фельдшер, акушерка, зубной врач) несет личную ответственность за неправильно выписанный им рецепт.

12. Рецепт, не отвечающий хотя бы одному из требований настоящих правил или содержащий несовместимые лекарственные вещества, считается недействительным, и лекарство по нему не изготавливается; врач, выдавший такой рецепт, или главный врач лечебного учреждения обязан обеспечить своевременное возобновление требуемого для больного рецепта.

13. При поступлении в аптеку неправильно выписанного рецепта с него снимается копия в двух экземплярах. Подлинник рецепта погашается аптекой отметкой на рецепте «рецепт недействительный».

лен» и возвращается больному. Один экземпляр копии немедленно направляется главному врачу лечебного учреждения, откуда поступил рецепт, или руководителю местного органа здравоохранения в случае выдачи рецепта средним медперсоналом или частнопрактикующим врачом. Второй экземпляр копии хранится в аптеке отдельно от прочих документов в течение 1 года.

14. Органы здравоохранения и руководители медицинских учреждений обязаны во всех случаях выписывания рецептов с нарушением настоящих правил применять строгие меры воздействия к виновным в этом лицам.

Приложение 1
к правилам выписывания рецептов на лекарства для амбулаторных больных.

Образец
рецептурного бланка (размер 85×150 мм)

Штамп
медицинского
учреждения

Ф. И. О. и возраст больного _____

Дата _____

Ф. И. О. врача _____

Латинское наименование лекарств и их количество _____

Обозначение лекарственной формы и способа применения _____

М. П.
Подпись врача _____

Приложение 2
к правилам выписывания рецептов на лекарства для амбулаторных больных.

Список

ядовитых и сильнодействующих веществ, разрешенных к отпуску из аптек по рецептам фельдшеров и акушеров

Кофеин и его соли

Красавка и ее препараты

Наперстянка (листья) и ее препараты

Нитроглицерин
Риванол
Серебро азотнокислое в растворах не свыше 2%
Спорынья и ее препараты
Стиптицин
Фурацилин

Приложение 3
к правилам выписывания ре-
цептов на лекарства для амбу-
латорных больных.

Список

ядовитых и сильнодействующих веществ, разрешенных к отпуску
из аптек для стоматологических кабинетов по рецептам
зубных врачей со средним медицинским образованием

Адреналин 0,1% раствор (в оригинальной упаковке и ампулах)
Азотная кислота (в чистом виде)
Амилнитрит (в ампулах)
Антиформин (в оригинальной упаковке)
Йодоформ (в порошке, пастах, эмульсиях)
Кофеин бензойно-натриевая соль (в ампулах)
Кокаин (в чистом виде и пастах)
Мышьяковистый ангидрид (в пастах с содержанием до 50%)
Новокаин (в чистом виде, растворах до 4% и ампулах)
Ртуть металлическая
Серебро азотнокислое (в кристаллах и растворах)
Серная кислота (в чистом виде)
Трипафлавин (в растворах)
Трихлоруксусная кислота (в чистом виде)
Фенол жидкий (в чистом виде и в смеси с другими веществами)
Хлористый цинк (в растворах до 15%)
Хлороформ (в чистом виде)
Хлорэтил (в ампулах)
Эфир этиловый (в чистом виде)

Примечание. Перечисленные препараты разрешается хра-
нить в стоматологическом кабинете в количествах, не превышаю-
щих 5-дневной потребности, за исключением следующих препара-
тов:

Кокаин — не более 0,5 г вещества на одного зубного врача
Мышьяковистый ангидрид — не более 2,5 г на одного зубного
врача
Ртуть металлическая — не более 30 г на одного зубного врача.
Серебро азотнокислое — не более 5 г на одного зубного врача.
Все ядовитые и сильнодействующие препараты должны хра-
ниться под замком в отдельном шкафу.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

- Аничков С. В. и Беленький М. Л. Учебник фармакологии. М.—Л., 1954.
- Архангельский В. Н. Глазные болезни. М., 1957.
- Богданов И. Л. Противоэпидемический и лечебный режим в стационарах для больных полиомиелитом. Киев, 1959.
- Вашков В. И. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация. М., 1956.
- Гольдман М. М., Жучков Н. Д., Субханбердин С. Х. Под редакцией И. И. Сиверцева. Лекарственные препараты. Алма-Ата, 1959.
- Григорьев С. М., Аничков М. Н. Кураре и курареподобные препараты в хирургии. М.—Л., 1957.
- Гукасян А. Г. Запоры и их лечение. М., 1959.
- Домбровская Ю. Ф. Заболевания органов дыхания у детей. М., 1957.
- Жмакин К. Н. Рецептура акушерско-гинекологической клиники I МОЛМИ имени И. М. Сеченова. М., 1960.
- Калашников В. П. Руководство по рецептуре. М.—Л., 1954.
- Кербиков О. В., Озерецковский Н. И., Попов Е. А., Снежневский А. В. Учебник психиатрии. М., 1958.
- Кушелевский Б. П. Очерки по антикоагулянтной терапии. М., 1958.
- Лекарственные препараты (сборник аннотаций). Составил И. С. Инденбаум, научный руководитель Г. Н. Першин. М., 1959.
- Лекарственные препараты (краткие аннотации) под редакцией И. Ф. Урванцева. Минск, 1960.
- Лихачев А. Г. Болезни уха, горла и носа. М., 1958.
- Машковский М. Д. Лекарственные средства. М., 1958.
- Мясников А. Л. Гипертоническая болезнь. М., 1954.
- Петровский Г. А. Клиническая фармакология. Киев, 1956.
- Рысс М. М. Витамины. М.—Л., 1955.
- Сепп Е. К., Цукер М. Б., Шмидт Е. В. Нервные болезни. М., 1954.
- Соколов М. И. и Павлов П. В. Справочник по применению бактериальных и вирусных препаратов. М., 1951.
- Справочник врача скорой и неотложной помощи, 1960.
- Стручков В. И. Очерки по общей и неотложной хирургии. М., 1959.
- Тареев Е. М. Внутренние болезни. М., 1957.
- Черкес А. И. Фармакотерапия. Киев, 1955.
- Шерешевский Н. А. Клиническая эндокринология. М., 1957.

КРАТКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ¹

Абсцессы (или раны)

Биомицин 163
Витамины А 140
Витамины В₁ 140
Витамины В₂ 141
Витамины С 143
Глюкоза 120
Грамицидин 166
Йод 123
Йодоформ 126
Красители 209
Колимицин 166
Мазь Вишневского 206
Мазь окситетрациклиновая 164
Марганцовокислый калий 202
Микосептин 210
Никотиновая кислота 144
Нитрат серебра 192
Новоциллин 161
Паста Лассара 191
Пенициллин 160
Перекись водорода 201
Рутин 147
Саназин 170
Синтомициновая эмульсия 165
Спирт 8
Сульфаниламиды 172, 173
Тетрациклин 164
Фурацилин 210
Хлорид натрия 122
(см. ожоги, отморожения, столбняк)

Абсцесс легкого

Антибиотики 160—167
Витамины А 140
Витамины В₁ 140
Витамины В₂ 141

Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143
Витамин D 145
Мед 121
Новарсенол 180
Рутамин 147
Рыбий жир 145

Агранулоцитоз

Витамин В₁ 140
Витамин В₂ 141
Витамин В₆ 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143
Натрий нуклеиновокислый 155
Пентоксил 155
Тезан 156
Фолиевая кислота 142

Алкоголизм хронический

Аминазин 13
Стрихнин 37
Тетурам 199

Аменорея (дисменорея)

Маточные средства 82
Половые гормоны 134
Токоферол 146

Ангина

Аспирин 28
Биомицин 163
Квасцы 189
Марганцовокислый калий 202

¹ В терапевтическом указателе названы важнейшие препараты.

Новоциллин 161
Норсульфазол 173
Пенициллин 160
Перекись водорода 201
Риванол 209
Спиртовой компресс 8
Стрептомицин 172

Анемия

Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 142
Витамин В₆ 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143
Гемостимулин 151
Камполон 153
Коамид 154
Мед 121
Препараты железа 150
Препараты мышьяка (неорганические) 152
Ферковен 154
Фитин 128
Фолиевая кислота 142

Аритмия

Аскорбиновая кислота 143
Боярышник 76
Бромиды 31, 32
Валерьяна 72
Камфара 71
Капли Зеленина 67
Карбохолин 43
Новокаин-амид 88
Платифиллин 50
Сердечные гликозиды 61
Хинидин 179

Атеросклероз

Аскорбиновая кислота 143
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 142
Глютаминовая кислота 116
Йод и его препараты 123—125
Мед 121
Морская капуста 125

Тиреоидин 130
Хлористый натрий 122
Холин-хлорид 143

Артрит (см. Ревматизм)

Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 129
Анальгин 26
Атофан 30
Бодяга порошок 96
Бутадион 27
Випразид 102
Горчичники 99, 100
Жаропонижающие 24
Йодистый калий 125
Кортизон 137
Летучая мазь 96
Нафталан 207
Салицилаты 24, 28, 29
Скипидар 96
Спиртовой компресс 8
Спирт горчичный 100
Уродан 31

Аскаридоз (см. Противоглистные)

Астма бронхальная

Адреналин 56
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 129
Альфадрил 81
Апрофен 75
Атропин 46
Антастман 58
Антиастмокрин 129
Антигистамин 79
Беллоид 49
Гексабензат 52
Димедрол 80
Дийохин 53
Изадрин 58
Камфара 71
Кортизон 137
Мезатон 57
Мерпанит 50
Метацин 51
Новокаин 87
Омнопон 18
Папаверин 21
Пентамин 52

Платифиллин 50
Солутан 49
Теофедрин 58
Тропацин 49
Эуспиран 59
Эуфиллин 35
Эфедрин 57

Атония желудка,
кишечника

Витамин В₁ 141
Витамин С 143
Горькая настойка 102
Карбохоллин 43
Мед 121
Полынная настойка 102
Прозерин 44
Слабительные 108
Стрихнин 37
Хлорид натрия 122

Ахилия желудка

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин С 143
Желудочный сок 138
Кислота соляная разведенная 115
Настойка горькая 102
Никотиновая кислота 144
Панкреатин 138
Пепсин 138
Перопапаза 139
Хлорид натрия 122 (см. Анемия)

Атония матки (при родах)

Пахикарпин 53
Питуитрин 129
Прозерин 44
Хинин 177

Базедова болезнь

Бетазин 131
Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141
Витамин С 143

Дийодтирозин 130
Инсулин 132
Йод 123, 125
Мерказолил 131
Метилтиоурацил 130
Хинидин 180

Болезнь Аддисона
Дезоксикортикостерон-ацетат 138
Кортизон 137
Кортин 138

Болезнь бери-бери

Витамин В₁ 141

Болезнь Боткина
(инфекционный гепатит)

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143
Витамин К 146
Глюкоза 120
Инсулин 132
Камполон 153
Мед 121
Метионин 196
Никотиновая кислота 144

Болезнь Паркинсона
(паралич дрожательный)

Аскорбиновая кислота 143
Витамин В₆ 142
Глюкоза 120
Депаркин 81
Димедрол 80
Динезин 14
Мелликтин 55
Скополамин 47
Тропацин 49

Бессонница

Снотворные 8—13
Валерьяна 72

Бешенство

Вакцина антирабическая 221

Бленнорея

Альбуцид-натрий 173
Витамины В₂ 141
Желтая ртутная мазь 185
Марганцовокислый калий 202
Пенициллин 160
Протаргол 193
Санорин-аналлергин 211
Серебро азотнокислое 192
Синтомицин 164, 165
Сульфат цинка 192
Тетрациклин 163
Фурацилин 210

Блефарит

Альбуцид (сульфацил) 173
Бриллиантовый зеленый 209
Витамины В₂ 141
Ртутная желтая мазь 185
Синтомициновая эмульсия 165
Стрептоцид (для присыпки) 172
Тетрацициновая мазь 164

Ботулизм

Сыворотка противоботулиническая 218

Брадикардия

Атропин 46
Витамины В₁ 141
Витамины В₂ 141
Витамин С 143
Капли Зеленина 67
Кофеин 32
Настойка и экстракт красавки 47, 48
Фитин 128
Чай крепкий 33
Эфедрин 57

Бронхит

Анальгин 26
Аспирин 28

Биомицин 163
Дионин 21
Доверов порошок 18
Капли нашатырно-анисовые 106
Коденин 20
Кутизон 197
Мед 121
Отхаркивающие средства 104
Пенициллин 160
Стрептомицин 167

Бруцеллез

Вакцина бруцеллезная 221
Биомицин 163
Левомецетин 165
Норсульфазол 173
Синтомицин 164, 165
Стрептомицин 167
Тетрациклин 163

Веснушки

Белая осадочная ртуть 184, 185
Висмут основной азотнокислый 187
Камфара 71, 185
Пергидрол 185, 201
Салициловая кислота 30, 185

Воздушная болезнь

Аминазин 13
Анестезин 90
Аскорбиновая кислота 143
Аэрон 49
Валидол 73
Витамины В₆ 142
Димедрол 80
Кофеин (под кожу) 33
Мединал 9
Мятная вода 97
Мятные капли 97

Волчанка

Витамины В₂ 141
Витамин D 145
Кортизон 137
Кризанол 171
ПАСК 169

Стрептомицин 167
Фтывазид 168, 169

Газовая гангрена

Бициллин 162
Викасол 146
Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143, 144
Витамин D 145
Витамин Р 146
Витамин РР 144
Витаминизированный рыбий жир 145
Колимицин 166
Марганцовокислый калий 202
Пенициллин 160
Перекись водорода 201
Рутамин 147
Сульфаниламиды 172
Сыворотка против газовой гангрены 219
Фурацилин 210

Гастрит

Анестезин 90
Атропин 46
Бикарбонат натрия 117
Желудочный сок 138, 139
Кальций углекислый 120
Камполон 153
Кислота соляная 115
Окись магния 118
Пепсин 138
Экстракт красавки 47

Геморрой

Альбихтол 207
Анестезин 90
Дерматол 189
Ихтиол 206
Ксероформ 188
Свинцовая примочка 194
Слабительные 108
Экстракт красавки 47

16 Врачебные прописи

Гепатит

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143, 144
Витамин К 146
Глюкоза 120
Желчегонные 112—114
Инсулин 132
Камполон 153
Мед 121
Никотиновая кислота 144
Перопаназа 139
Фолиевая кислота 142
Холин-хлорид 143

Гипертиреоз (см. Базедова болезнь)

Гингивиты

Борная кислота 116
Бриллиантовый зеленый 209
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143
Витамин Р 146
Марганцовокислый калий 202
Квасцы 189
Медь сернокислая 191
Настой травы зверобоя 93
Отвар коры дуба 92
Пенициллин 160
Перекись водорода 201
Ромашка 93
Рутамин 147
Рутин 147
Танин 91
Экстракт корневища змеевика 92

Глисты (см. Противоглистные)

Гипертоническая болезнь

Антипирин 24
Апрессин 60
Аспирин 28
Витамин В₂ 141, 142
Витамин Р 146
Гексабензат 52
Гексаметон 52

Гексоний 52
Гендон 15
Дибазол 75
Дийохин 53
Диуретин 34
Жидкий экстракт боярышника 76
Изадрин 58
Йодистый калий 125
Карбохолин 43
Люминал 10
Магний сернистый 7
Настойка эукоммии 78
Нитранол 74
Нитроглицерин 73
Новокаин 87
Омелен 79
Омнопон 18
Папаверин 21
Пиявки 150
Редергам 60
Резерпин 15
Сайодин 125
Снотворные (небольшие дозы) 8
Теобромин 34
Эрготоксин 59
Эуфиллин 35

Гипертонический криз

Анальгин 26
Аспирин (большие дозы) 28
Ванны горчичные ножные 100
Дибазол 75
Магниева соль глутаминовой кислоты 117
Омнопон 18
Папаверин 21
Пиявки 150
Сульфат магния 7
Хлоралгидрат (средние дозы) 11

Гипотоническая болезнь

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Дезоксикортикостерон-ацетат 138
Дуплекс 153
Женьшень 41
Камфара 71
Китайский лимонник 41
Кордиамин 39

Кортин 138
Кофени 32
Мед 121
Мезатон 57
Мышьяк (неорганические соединения) 152
Паптокрин 41
Стрихнин 37
Фенамин 40
Чай крепкий 33
Эфедрин 57
Эхинопсин 38

Глаукома

Армин 45
Бензамон 45
Карбохолин 43
Пилокарпин 45
Прозерин 44
Физостигмин (эзерин) 44
Фосфакол 45

Гонорея

Бициллин 162
Вакцина гонококковая 221
Марганцовокислый калий 202
Пенициллин 160
Синтомицин 164, 165
Стрептомицин 167
Сульфаниламиды 172
Тетрациклин 163

Грибковые поражения кожи

Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин С 143, 144
Витамин РР 144
Колимицин 166
Микосептин 210
Нитрофунгин 211
Паста Лассара 191, 192
Резорцин 203
Ундециновая мазь 211

Грипп

Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Жаропонижающие 24
Кальцекс 209
Кутизон 197
Норсульфазол 173
Салицилаты 28, 29
Пенициллин 160
Противогриппозная сыворотка 220

Грудная жаба (стенокардия)

Амилнитрит 73
Анадол 23
Анальгин 26
Апрофен 75
Аспирин (большие дозы) 28
Атропин 46
Валидол 73
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Ганглерон 53
Горчичник 99, 100
Даукарин 78
Дибазол 75
Дифацил 76
Диуретин 34
Камфара 71
Капли Зеленина 67
Кардиовален 69
Кислород
Люминал 10
Миоль 77
Мед 121
Ментол 97
Нитроглицерин 73
Новокаин в вену 87
Омелен 79
Омнопон 18
Падутин 77
Палаверин 21
Пиявки 150
Промедол 22
Редергам 60
Спирт 95° на язык 8
Теобромин 34
Тнофен 75
Эрготоксин 59

Декомпенсация сердца

Аскорбиновая кислота 143
Ацетат калия 119
Глюкоза 120
Диакарб 175
Диуретин 34
Камфара 71
Кислород 40
Мед 121
Меркузал 185
Никотиновая кислота 144
Новурит 185, 186
Сердечные глюкозиды 61—70
Синтофиллин 36
Стрихнин 37
Теофиллин 35
Хлористый аммоний 105
Эуфиллин 35

Диабет несахарный

Адиурекрин (питуитрин) 129

Диабет сахарный

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Глобин-цинк-инсулин 132
Диаборал 133
Инсулин 132
Липокаин 133
Надизан 134
Никотиновая кислота 144
Растинон 133
Рутамин 147
Трипротамин-цинк-инсулин 132

Дизентерия

Биомицин 163
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Глюкоза 120
Дисульформин 174
Левомецетин 165
Саназин 170
Синтомицин 164
Стрептомицин 167
Сульгин 175
Сульфодимезин 172, 173

Сыворотка противодизентерий-
ная 218
Тетрациклин 163
Фенол 203
Фталазол 174
Хлорная известь 200
Эметин 105
Ятрен 210

Д и ф т е р и я

Витамины В₁ 141
Витамины В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Глюкоза 120
Дифтерийный анатоксин 224
Кофеин 32
Новоциллин 161
Норсульфазол 173
Пенициллин 160
Саназин 170
Сульфодимезин 172, 173
Сыворотка противодифтерий-
ная 218
Фенол 203
Хлорная известь 200

З а п о р ы

Слабительные 108 (см. Атония же-
лудка, кишечника)

З у б н а я б о л ь (кариес зубов)

Анальгин 26
Дикаин 89
Камфара 72
Карболовая кислота 203
Кокаин 89
Ментол 72, 97
Мышьяковистая кислота 152
Пирамидон 25
Флюорид натрия 122
Хлоралгидрат 11, 72
Хлороформ 6

З у д к о ж н ы й

Альфадрил 81
Аминазин 13
Анальгин 26
Анестезин 90

Антигистамин 79
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Диазолин 81
Димедрол 80
Дипразин 81
Кальций хлористый 119
Карболовая кислота 203
Люминал 10
Ментол 97

И з ж о г а (см. Гастрит)

И н с у л ь т
(кровонизлияние в мозг)

Валерьяна 72
Камфара 71
Кислород 40
Люминал 10
Оmnopон 18
Пирамидон 25
Рутамин 147
Рутин 147

И н ф а р к т м и о к а р д а

Адонизид 66
Аспирин 28
Атропин 46
Валидол 73
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Камфара 71
Кислород 40
Мед 121
Морфин 19
Нитроглицерин 73
Оmnopон 18
Пиявки 150
Средства, замедляющие свертываемость крови (антикоагулянты). См. схему лечения больных с острым инфарктом миокарда стр. 148, 149

И с т е р и я

Аскорбиновая кислота 143
Валерьяна 72
Бромиды 31, 32
Бром с кофеином 31
Микстура Бехтерева 65

И ш и а с

Анальгин 26
Апизатрон 101
Аспирин 28
Випразид 102
Випракутан 101
Витамин В₁ 141
Горчичники 99, 100
Летучая мазь 96
Метилловый эфир салициловой кислоты 29
Пирамидон 25
Порошок бодяги 96
Скипидар 96
Спирт камфарный 72
Спирт муравьиный 100

Карбункул (см. Абсцесс)

Кашель (см. Бронхит)

Климактерий ранний

Аклиман 83
Акрофоллин 135
Антиамнетиические средства 150—154
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин С 143, 144
Климактерин 136
Микрофоллин 135
Падутин 77
Половые гормоны и их синтетические заменители 134

К о к л ю ш

Альбомицин 164
Биомицин 163
Вакцина коклюшная 221
Витамин В₀ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Левомецетин 165
Мед 121
Пертуссин 106
Рыбий жир 145
Саназин 170
Синтомицин 164
Стрептомицин 167
Тетрациклин 163 (см. Бронхит)

К о л и к и (кишечные, почечные, печеночные)

Анальгин 26
Атропин 46
Бензацин 50
Дийохин 53
Мерпанит 50
Омнопон 18
Папаверин 21
Платифиллин 50
Промедол 22
Солутан 49
Экстракт красавки 47
Эуфиллин 35

К о л и т

Висмут основной азотнокислый 187
Левомецетин 165
Дисульфурмин 174
Синтомицин 164
Сульгин 175
Таннальбин 92
Фталазол 174
Черника сушеная 93
Экстракт красавки 47
Ятрен 210

К о л л а п с

Адреналин 56
Камфара 71
Карбоген 40
Кордиамин 39
Кофеин 32
Стрихнин 37
Эфедрин 57

Конъюнктивит (см. Бленноррея)

К о р ь

Альбомицин 164
Биомицин 163
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Гамма-глобулин 220
Левомецетин 165

Рутамин 147
Санорин-аналергин 211
Стрептомицин 167
Сыворотка противокоревая 220

Крапивница

Альфадрил 81
Анестезин 90
Антигистамин 79
Диазолин 81
Димедрол 80
Кальций 119
Кортизон 137
Паратиреоидин 131
Эфедрин 57

Кровотечения

Антианемические средства 150
Аскорбиновая кислота 143
Викасол 146
Витамин Р 146
Глюкоза 120
Хлорид натрия 122
Жидкий экстракт крапивы 146
Кальций 119
Квасцы 189
Омнопон 18
Раствор Гингера — Локка 121
Рутин 147
Серебро азотнокислородное 192
Средства, ускоряющие свертывание крови 146
Стиптицин 83 (см. Анемия)

Кровотечения маточные
(см. Кровотечения)

Маточные средства 82
Питуитрин 129
Прегнин 136
Прогестерон 136
Тестостерон 137

Кровотечения носовые

Антипирин в растворе 24
Витамин Р 146
Перекись водорода 201
Раствор хлорного железа 190
Стиптицин 83
(см. Кровотечение)

Ксерофтальмия

Витамин А 140
Каротин 140
Каротон 140
Рыбий жир 145

Куриная слепота
(см. Ксерофтальмия)

Лейкозы

Антианемин 154
Допан 156
Камполон 153
Коамид 154
Кортизон 137
6-Меркаптопурин 155
Мнелосан 157
Новэмбихин 156
Раствор мышьяковистокислого калия 153
Уретан 156

Лейкопения (см. Агранулоцитоз)

Лейшманноз

Акрихин 175, 176
Солюсурмин 196

Лимфогранулематоз

Допан 156
Новэмбихин 156

Лишай опоясывающий

Анальгин 26
Бромиды 31, 32
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Левомицетин 165
Мазь амидохлорной ртути 184
Мазь Вишневского 206
Новокаин (в вену) 87
Паста Лассара 191
Синтомициновая эмульсия 165

Лучевая болезнь

Аминазин 13
Аскорбиновая кислота 143
Витамины А 140
Витамины В₂ 141, 142
Витамины В₆ 142
Витамины В₁₂ 143
Витамины Р 146
Димедрол 80
Каферид 198
Мед 121
Меркамин 198
Никотиновая кислота 144
Нуклеиновокислый натрий 155
Пентоксил 155
Рутамин 147
Рутин 147
Тезан 156
Этизин 80

Люмбаго (см. Ишиас)

Лямблиоз

Акрихин 175, 176

Малокровие (см. Анемия)

Малярия

Аскорбиновая кислота 143
Противомалярийные 175 (см. Анемия)

Мастит

Биомицин 163
Кислородотдающие средства 201—202
Новоциллин 161
Пенициллин 160
Синтомицин 164, 165
Сульфаниламиды 172
Фурацилин 210
Эмульсия синтомициновая 165 (см. Абсцесс)

Менингит

Антибиотики 160
Витамины В₁ 141

Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Противотуберкулезные средства 167—171
Сульфаниламиды 172
Сульфит тирозина 171

Мерцательная аритмия (см. Аритмия)

Миастения

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Галантамин 44
Дезоксикортикостерон-ацетат 138
Мед 121
Прозерин 44
Стрихнин 37 (см. Анемия)

Мигрень

Валидол 73
Витамин С 143, 144
Витамин Р 146
Жаропонижающие 24
Кофеин 32
Люминал 10
Мединал 9
Ментол-эфир-спирт (наружное) 99
Сосудорасширяющие 73

Миокардит острый

Адонизид 66
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Камфара 71
Кислород 40
Кофеин 32
Мед 121
Стрихнин 37
Пирамен 26
Пираминал 26
Эфедрин 57

Микседема

Тиреоидин 130

Мозоль

Молочная кислота 30, 116
Салициловая кислота 30

Морская болезнь
(см. Воздушная болезнь)

Мышечная дистрофия

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин С 143, 144
Глюкоза 120
Глутаминовая кислота 116
Динатриевая соль аденозинтри-
фосфорной кислоты 74
Кислород 40
Мед 121
Никотиновая кислота 144
Пахикарпин 53
Прозерин 144
Стрихинин 37
Токоферол 146

Насморк острый

Аспирин 28
Борная кислота 116
Кокаин 89
Норсульфазол 173
Пенициллин 160
Стрептомицин 167
Сульфазин 173
Сухая противогриппозная сы-
воротка 220
Эфедрин 57

Невралгия

Ализатрон 101
Аспирин 28
Випразид 102
Випракутан 101
Вирапин 101
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143, 144
Горчичник 99, 100
Жаропонижающие 24

Летучая мазь 96
Метилловый эфир салициловой кис-
лоты 29
Никотиновая кислота 144
Новокаиновая блокада 87
Порошок бодяги 96
Салицилаты 24, 28, 29
Скипидар 96
Спирт горчичный 100
Спирт муравьиный 100
Спиртовой компресс 8
Хлороформ 6

Неврастения, неврозы

Бромиды 31, 32
Бром с кофеином 31
Валерьяна 72
Валидол 73
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Гендон 15
Микстура Бехтерева 65
Резерпин 15
Фаулеров раствор мышьяка 152
Фитин 128

Неврозы сердечно- сосудистой системы

Адонизид 66
Бромиды 31, 32
Валерьяна 72, 73
Валидол 73
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Камфара 71
Микстура Бехтерева 65
Настойка ландыша 67

Нефрит острый

Адонизид 66
Викасол 146
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин Р 146
Витамин С 143
Глюкоза 120
Кальций 119
Листья толокнянки 204

Мед 121
Никотиновая кислота 144
Новоциллин 161
Пенициллин 166
Рутамин 147
Рутин 147
Синтомицин 164
Сульфаниламиды 172
Тетрациклин 163
Уротропин 208

Новообразования

Литиверруцин 158, 159
Витаминные препараты 140
Допан 156
Колхамин (Оман) 156
6-Меркаптопурин 155
Миелосан 157
Неоцид 158
Новэмбихин 156
Сарколизин 157
(см. Анемия)

Обморок

Валерьяна 172
Горчичник 99, 100
Камфара 171
Коразол 39
Кордиамин 39
Кислород 40
Кофеин 32
Нашатырный спирт (растирание,
вдыхание) 95

При ожогах крепкими кислотами применяют растворы щелочей (сода, мыльная вода) или присыпку мелом, зубным порошком. При ожогах щелочами: поверхность орошают слабым раствором уксусной кислоты или 2% раствором борной кислоты.

Ознобления

Аскорбиновая кислота 143
Мазь Вишневского 206
Никотиновая кислота 144
Рыбий жир 145
Синтомициновая эмульсия 165

Ожоги кожи

Азотнокислое серебро 192
Алооцимен 210
Анестезин 90
Биомицин 163
Бикарбонат натрия 117
Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143
Витамин Р 146
Витадерм 140
Глюкоза 120
Димедрол 80
Камфара 71
Каротин 140
Каротон 140
Колимицин 166
Кофеин 32
Лидаза 139
Мазь Вишневского 206
Марганцовокислый калий 202
Метиленовый синий 209
Микроцид 167
Новокаин 87
Новоциллин 161
Омнопон 18
Отвар коры дуба 92
Паста Лассара 191
Пенициллин 160
Рутамин 147
Рутин 147
Синтомициновая эмульсия 165
Спирт 8
Стрептоцид 172
Сыворотка противостолбняч-
ная 219
Танин 91
Фурацилин 210

Опрелость (см. Пiodермия)

Остеомелит

Антибиотики 160
Витамин А 140

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143, 144
Витамин РР 144
Витамин D 145
Йодоформная эмульсия 126
Красители 209
Микроцид 167
Колимицин 166
Марганцовокислый калий 202
Перекись водорода 201
Сульфаниламиды 172

Отеки

Аскорбиновая кислота 143
Диакарб 175
Диуретин 34
Калий уксуснокислый 119
Кислород 40
Кофеин 32
Меркузал 185
Новурит 185, 186
Промеран 186
Сердечные гликозиды 61
Синтофиллин 36
Эуфиллин 35
(см. Декомпенсация сердца)

Отек ангионевротический

Альфадрил 81
Антигистамин 79
Бромиды 31, 32
Валерьяна 72
Диазолин 81
Димедрол 80
Дипразин 81
Кальций 119
Люминал 10
Рутамин 147
Этизин 80

Оспа натуральная

Антибиотики 160
Оспенный детрит
(для профилактики) 224
Сульфаниламиды 172

Отморожения

Бициллин 162
Витадерм 140
Витамины А 140
Витамины В₁ 141
Витамины В₂ 141, 142
Витамины С 143, 144
Витамины Р 146
Инсулин 132
Камфара 71
Каротин 140
Кордиамин 39
Кофеин 32
Мазь Вишневского 206
Микроцид 167
Новоциллин 161
Паста Лассара 191
Пенициллин 160
Синтомициновая эмульсия 165
Спиртовая повязка 8
Чай крепкий 32, 33
Эфедрин 57

Отравление грибами — поганка бледная, мухомор и др.

Апоморфин 103
Атропин 46
Глюкоза 120
Коразол 39
Кофеин 32, 33
Промывание желудка водной
взвесью угля
Искусственное дыхание
Чай крепкий, кофе.

Отравление мышьяком

Витамин В₁ 141
Витамин С 143
Дикаптол 199
Тиосульфат натрия 194
Унитиол 199

Отравление солями тяжелых металлов

Antidotum metallorum 198
Витамин В₁ 141
Витамин С 143, 144

Дикалтол 199
Мозатил 199
Никотиновая кислота 144
Тиосульфат натрия 194
Ушитоил 199

Отравление бензолом,
бензином, керосином

а) При отравлении парами:

Свежий воздух
Искусственное дыхание
Карбоген 40
Камфара 71
Кофени 32
Пирамидон 25

б) При отравлении через рот,
кроме вышеуказанного:

Апоморфин 103 (или вызывание
акта рвоты надавливанием дву-
мя пальцами на слизистую зева
и спинку языка)

Молоко горячее
Слабительные 108, 111
Уголь 95
Чай крепкий, кофе 32, 33

Отравление окисью
углерода, угарным и
светильным газом

Взрывными газами (см. Электро-
травма)

Панариций (см. Абсцесс)

Пароксизмальная
тахикардия (см. Аритмия)

Парезы, параличи

Аминазин 13
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Галантамин 44
Дибазол 75
Кондельфин 55

Магниева соль глутаминовой
кислоты 117
Прозерин 44
Секуринин 38
Стрихнин 37
Тропацин 49
Эхинопсин 38

Парапроктит острый (см.
Абсцесс)

Паркинсонизм (см. Болезнь
Паркинсона)

Пеллагра

Витамин В₆ 142
Никотиновая кислота 144

Перитонит

Антибиотики 160
Камфара 71
Кофеин 32, 33
Сульфаниламиды 172

Пiodермия

Белая осадочная ртуть 184
Бриллиантовый зеленый 209
Бициллин 162
Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Витамин РР 144
Колимицин 166
Марганцовокислый калий 202
Метиленовый синий 209
Микроцид 167
Окись цинка 191
Паста Лассара 191
Пенициллин 160
Риванол 209
Синтомицин 164
Синтомициновая эмульсия 165
Стрептоцид белый в мельчайшем
порошке 172

Пиелит (см. Нефрит)

Пневмония

Антибиотики 160
Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143, 144
Глюкоза 120
Камфара 71
Кислород 40
Левомецетин 165
Наперстянка 61
Отхаркивающие 104
Сульфаниламиды 172
Эфедрин 57

Подагра

Адренокортикотропный гормон 129
Атофан 30
Витамин В₁ 141
Вутадион 27
Кортизон 137
Уродан 31
Урозин 31

Полиневрит

Анальгин 26
Аспирин 28
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143, 144
Галантамин 44
Дибазол 75
Пирамидон 25
Прозерин 44
Сердечные средства
(см. Ишиас)

Полиомиелит

В остром периоде вводят
одновременно:

Пенициллин 160
Стрептомицин 167
Гамма-глобулин 220
Сульфит тирозина 171
Прозерин 44
Витамин В₁ 141

Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₁₂ по 500—1000 γ в сут-
ки в течение 15—20 дней 143
Глюконат кальция 119
В раннем восстановительном пе-
риоде:
Галантамин 44
Глутаминовая кислота 116
Аденозинтрифосфорная кислота
(АТФ) 74
Аскорбиновая кислота 143
Дибазол 75
Димедрол 80
Карбохолин 43
Хлорамин 201
Хлорная известь 200

Поражение
электротоком, молнией
(см. Электротравма)

Псориаз

Аскорбиновая кислота 143
Альфадрил 81
Бромиды 31, 32
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин D 145
Деготь 205
Мазь белая ртутная 184
Натрий мышьяковокислый 153
Сера 195
Синтомициновая эмульсия 165
Тиосульфат натрия 194

Пороки сердца (см.
Декомпенсация сердца)

Пролежни (см. Абсцесс)

Радиккулит

Витамин В₁ 141
Жаропонижающие 24
Порошок бодяги 96
Салицилаты 24, 28, 29
(см. Ишиас)

Раны (см. Абсцесс)

Рахит

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143
Витамин D 145
Препараты фосфора 128
Рыбий жир витаминизированный 145

Рвота (см. Воздушная болезнь)

Ревматизм

Адренокортикотропный гормон 129
Ализартрон 101
Аскорбиновая кислота 143
Биомицин 163
Бутаднон 27
Випразид 102
Випракутан 101
Вирапин 101
Дегидрокортизон 138
Жаропонижающие 24
Кортизон 137
Летучая мазь 96
Масло камфарное 71
Пенициллин 160
Пирабутол 27
Пирамидон 25
Порошок бодяги 96
Реопирин 25, 27
Салицилаты 24, 28, 29
Скипидар 96
Спирт камфарный 72
Спирт муравьиный 100
Сульфаниламиды 172
Хлороформ 6

Ринит острый

Адреналин 56
Аспирин 28
Кокаин 89
Мезатон 57
Ментол 97
Пенициллин 160
Протаргол 193
Противогриппозная сыворотка 220
Санорин-аналергин 211
Сульфаниламиды 172
Эфедрин 57

Рожистое воспаление

Аспирин 28
Левомецетин 165
Метиленовый синий 209
Новоциллин 161
Пенициллин 160
Синтомициновая эмульсия 165
Сульфаниламиды 172
Террамицин 164

Себорея

Аскорбиновая кислота 143
Белая осадочная ртуть 184
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Колимицин 166
Резорцин 203
Салициловая кислота 30
Сера 195
Синтомициновая эмульсия 165
Стрептоцидная мазь 172

Сепсис

Антибиотики — Пенициллин в
больших дозах 160, 161
Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143
Глюкоза 120
Кислород 40
Мед 121
Сульфаниламиды 172
Сердечные средства 61, 71

Сикоз

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143
Колимицин 166
Красители 209
Мазь стрептоцидная 172
Нитрофунгин 211
Сера 195
Синтомициновая эмульсия 165

Сибирская язва

Биомицин 163
Мазь окситетрациклиновая 164
Новарсенол 180
Пенициллин 160, 161
Перекись водорода 201
Пирамидон 25
Сердечные средства, 32, 33, 61, 71
Синтомициновая эмульсия 165
Стрептомицин 167
Сыворотка противосибиреязвенная
Тетрацилин 164
Хлористый аммоний 105
Хлорная известь 200

Сифилис

Висмут — (бийохиноль 186. Бисмо-
верол 186, 187. Битиурол 187)
Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143
Витамин РР 144
Йод 123, 125
Мышьяк (органические препара-
ты) 180, 181
Новоцилин 161
Пенициллин 160, 161
Ртуть 182, 183

Скарлатина

Биомицин 163
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143
Витамин Р 146
Гамма-глобулин 220
Новоцилин 161
Пенициллин 160, 161
Рутамин 147
Рутин 147
Сульфаниламиды 172
Сыворотка противоскарлатинозная
антитоксическая 219
Фенол 203
Хлорная известь 200

Солнечный удар

Кислород 40
Камфара 71

Кофеин 32, 33
Нашатырный спирт (растирания,
вдыхание) 95
Пирамидон 25
Пираменин 26
Чай крепкий 33
(см. Обморок)

Сотрясение мозга

Глюкоза 120
Камфара 71
Кислород 40
Морфин 19
Прозерин 44

Спазмофилия

Витамин D 145
Кальций 119
Люминал 10
Паратиреоидин 131
Хлоралгидрат 11
Спру
Витамин В₆ 142
Витамин В₁₂ 143
Фолневая кислота 142

Степнокардия (см. Грудная
жаба)

Столбняк

Адолизид 66
Барбамил 9
Димедрол 8
Люминал 10
Омнопон 18
Сульфат магния 7
Сыворотка противостолбняч-
ная 219
Тиопентал 7
Хлоралгидрат 11

Стоматиты (см. Гингивиты)

Сывороточная болезнь

Альфадрил 81
Антигистамины 79
Диазолин 81
Димедрол 80

Дипразин 81
Кальций 119
Этизин 68
Эфедрин 57

Тенидоз (см. Противоглистные)

Тетания (см. Спазмофилия)

Тиреотоксикоз (см. Базедова болезнь)

Тиф брюшной

Адонизид 66
Викасол 146
Витамины В₁ 141
Витамины В₂ 141, 142
Витамины В₆ 142
Витамины С 143, 144
Витамины Р 146
Глюкоза 120
Камфара 71
Кофеин 32, 33
Левомецетин 165
Пирамеин 26
Пирамидон 25
Синтомицин 164, 165
Стрихин 37
Фенол 203
Хлорная известь 200
См. схему лечения больных брюшным тифом и тиф-паратифом А и В, стр. 166

Тиф возвратный

Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин С 143
Глюкоза 120
Камфара 71
Новарсенол 180
Осарсол 181
Пенициллин 160, 161
Сердечные глюкозиды 61

Тиф сыпной

Адонизид 66
Биомицин 163

Витамины В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамины В₆ 142
Витамин С 143
Глюкоза 120
Камфара 71
Левомецетин 165
Рутамин 147
Синтомицин 164, 165
Тетрациклин 163

Тошнота (см. Воздушная болезнь)

Трахома

Биомицин 163
Витамины В₂ 141
Витамин С 143
Левомецетин 165
Медь лимоннокислая 190
Медь сернокислая 191
Синтомицин 164, 165
Сульфацил 173
Тетрациклин 164
Тетрациклин 163
Цианид ртути 182

Трихомонадный кольпит

Амниарсон 181
Осарсол 181
Трихомонацид 197

Трихоцефалез (см. Противоглистные)

Тромбозы, тромбофлебиты

Мазь Вишневского 206
Паста Лассара 191
Пенициллин 160, 161
Пиявки 150
Сердечные средства 32, 33, 61, 71
Синтомициновая эмульсия 165
Средства, замедляющие свертывания крови 148

Туберкулез

Вакцина туберкулезная БЦЖ 222,
223

Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143, 144
Витамин D 145
Витамин К 146
Гексилрезорцин 214
Противотуберкулезные средства
167—171
Хлорная известь 200 (см. Анемия)

Туляремия

Биомицин 163
Вакцина туляремиальная 223
Левомицетин 165
Стрептомицин 167
Тетрациклин 164
Тетрациклин 163

Угри

Белая осадочная ртуть 184, 185
Висмут основной азотнокислый
185, 187
Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Камфара 185
Никотиновая кислота 144
Паста Лассара 191
Пергидрол 185
Салициловая кислота 185
Сера 195
Синтомициновая эмульсия 165

Удар тепловой (см. Солнечный удар)

Укусы комаров, москитов, мошек

Эфирное масло эвкалипта 99
Нашатырный спирт 95
Репудин 217
Спирт 70° 8

Укусы насекомых, пчел и др.

Димедрол 80
Нашатырный спирт 95
Спирт 70° 8
Свинцовая примочка 194
Чай крепкий, кофе 33

Укусы ядовитых змей

Перетяжка конечности выше места укуса
Специфическая антитоксическая сыворотка
Вырезывание места укуса
Кровососные банки на месте укуса
Прижигание крепкой щелочью

Уремия

Аскорбиновая кислота 143
Глюкоза (внутривенно после кровопускания) 120
Люминал 10
Хлоралгидрат (в клизме) 11, 12

Ушибы

Жидкость Бурова 190
Марганцовокислый калий 202
Свинцовая примочка 194
Сыворотка противостолбнячная (при наличии ссадин) 219

Флегмона, фурункулез (см. Абсцесс)

Холецистит

Анальгин 26
Апрофен 75
Аскорбиновая кислота 143
Атропин 146
Бензацин 50
Витамин А 140
Желчегонные 112—114
Искусственная карлсбадская соль 111
Мед 121
Мерпанит 50

Оmnopон 18
Папаверин 21
Пенициллин 160, 161
Перопаназа 139
Пирамидон 25
Платифиллин 50
Промедол 22
Сернокислая магнезия 111
Экстракт красавки 47

Ц и н г а

Аскорбиновая кислота 143
Витамин Р 146
(см. Гингивиты)

Цирроз печени (см. Гепатит)

Цистит (см. Нефрит)

Ч е с о т к а

Деготь 205
Мазь Вилькинсона 205
Натрий серноватистокислый 195
Сера 195
Синтомициновая эмульсия 165

Ш и з о ф р е н и я

Аминазин 13
Барбамил 9
Глутаминовая кислота 116
Инсулин 132
Камфара 71
Люминал 10
Нембутал 8
Пиридрол 41
Резерпин 15
Сульфат магния 7
Сульфит тирозина 171

Ш о к

Адреналин 56
Аминазин (при артериальном давлении не ниже 60 мм) 13
Атропин 46
Витамин В₁ 141
Витамин С 143
Витамин Р 146
Глюкоза 120

Димедрол 80
Камфара 71
Карбоген 40
Коразол 39
Кофеин 33
Лобелин 39
Мезатон 57
Новокаин (в вену) 87
Оmnopон 18
Плегомазин 14
Эфедрин 157

Э к з е м а

Бромиды 31, 32
Борная кислота 116
Витадерм 140
Витамин А 140
Витамин В₁ 141
Витамин В₂ 141, 142
Витамин В₆ 142
Витамин В₁₂ 143
Витамин С 143, 144
Деготь 205
Димедрол 80
Жидкость Бурова 190
Кальций 119
Колимицин 166
Ксероформ 188
Метиленовый синий 209
Микосептин 210
Нанофин 54
Натрий мышьяковокислый 153
Нафталан 207
Нитрофунгин 211
Окись цинка 191
Паста Лассара 191
Свинцовая примочка 194
Сера 195
Синтомициновая эмульсия 165
Террамицин 164
Тиосульфат натрия 194
Этизин 80

Э к л а м п с и я

Аминазин 13
Аскорбиновая кислота 143
Барбамил 9
Бромид натрия 31
Витамин В₆ 142
Гексенал 6
Гексоний 52

Магний сернокислый 7
Оmnopон 118
Пентамин 52
Тиопентал 7
Хлоралгидрат 11

Экстрасистолия (см. Аритмии)

Электротравма

Глюкоза 120
Горчичники 99, 100
Дыхание искусственное
Камфара 71
Карбоген 40
Кислород 40
Коразол 39
Кофеин 32
Лобелин 39
Нашатырный спирт 95
Чай крепкий, кофе 33
(см. Ожоги, Шок)

Эмболии (см. Тромбозы)

Эндартериит облитерирующий

Ангиотрофин 75
Апрофен 75
Ацетилхолин 43
Витамин В₁ 141
Гексоний 52
Гепарин 148
Дипрофен 75
Карбохолин 43
Мед 121
Никотиновая кислота 144
Новокаин (внутриартериально) 87
Пахикарпин 53
Пенициллин 160, 161
Редергам 60
Спазмолитин (Дифацил) 76
Тетамон 51
Тетрациклин 163

Эндокардит

Адонизид 66
Адренокортикотропный гормон
129

Биомицин 163
Валерьяна 72
Витамины В₁ 141
Витамины В₂ 141, 142
Витамины В₁₂ 143
Витамин Р 146
Витамин С 143, 144
Глюкоза 120
Мед 121
Новоциллин 161
Пенициллин (в больших дозах)
160, 161
Салицилаты 24, 28, 29
Сульфаниламиды 172
Тетрациклин 164
Тетрациклин 163

Энтеробиоз (см. Противоглистные)

Эпилепсия

Адонизид 66
Бромиды (в больших дозах) 31,
32
Валерьяна 72
Гексамидин 16
Глутаминовая кислота 116
Дифенин 16
Люминал 10
Магниева соль глутаминовой
кислоты 117
Скополамин 47
Триметин 16
Хлоракон 16
Хлоралгидрат 11, 12

Язвенная болезнь желудка

Атропин 46
Бензацин 50
Витамин В₁ 141
Витамин С 143, 144
Витамин К 146
Гексабензат 52
Гексаметон 52
Гексоний 52
Дийохин 53
Мерпанит 50
Натрий двууглекислый 117
Папаверин 21

Пентамин 52
Пепульсан 51
Платифиллин 50
Тропацин 49
Экстракт красавки 47

Язвы варикозные
(см. Абсцесс)

Язвы роговицы

Атропин 46
Витамины В₂ 141, 142
Желтая ртутная мазь 185
Карбохолин 43

Пилокарпин 45
Синтомициновая эмульсия 165
Сульфацил 173
Тетрацициновая мазь 164
Цинк сернокислый 192

Ячмень

Альбуцид 173
Борная кислота 116
Желтая ртутная мазь 185
Марганцовокислый калий 202
Отвар коры дуба (для промыва-
ния) 92
Синтомициновая эмульсия 165

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ¹

- Авикулярен 85
Адалин 13
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) 74
Адиурекрин 129
Адонизид 66
Адреналин хлористоводородный 56
Адренкортикотропный гормон (АКТГ) 129
** Аклиман 83
Акрихин 175, 176
Акрицид 209
** Акрофоллин 135
Активированный уголь 95
Александрийский лист 109
Аллохол 113
Аллоцимен 210
Алоэ 110
Алтейный корень 105
Альбихтол 207
Альбомицин 164
Альбуцид-натрий 173
** Альфадрил 81
Амилнитрит 73
Аминазин 13
Аминарсон 181
Амитал-натрий 9
Аммоний хлористый 105
Анадол 23
Анальгин 26
Ангиотрофин 75
Анестезин 90
Анисовое масло 99
Анис обыкновенный — плод 106
Антабус 199, 200
** Антастман 58
Антианемин 154
Антиастмокрин 129
Антиверруцин 158, 159
** Антигистамин 79
Антипирин 24
** Ализатрон 101
Апоморфин хлористоводородный 103
Апрессин 60
Апрофен 75
Аравийская камедь 94
Армин 45
Аскорбиновая кислота 143
Аскофен 28
Аспирин 28
Асфен 28
Атебрин 175, 176
Атофан 30
Атролин сернокислый 46
Ауреомицин 163
Ацетат калия 119
Ацетат свинца 193
Ацетилхолин хлористый 43
Аэрон 49
Багульник — трава 108
Барбамил 9
Барий сернокислый 120
Белая глина 190
** Беллоид 49
Бензамон 45
Бензацин 50
Бензоат натрия 104
Бензогексоний (гексоний Б) 52
Бессмертник — цветы 113
Бетазин 131
Бигумаль 176, 177
Бикарбонат натрия 117
Билигност 127
Билитраст 126

¹ Импортные препараты обозначены звездочками (**), а импортные препараты, аналогичные отечественным, но с другим названием — обозначений не имеют.

Биомидин солянокислый 163
Бифохинол 186
Бисмоверол 186, 187
Битиурол 187
Бициллин 162
Бло — драже 151
Бодяга — порошок 96
Борная кислота 116
Бриллиантовый зеленый 209
Бромид калия 32
Бромид натрия 31
Бромурал 13
Бутамид 133
Бутадион 27
Вакцина антирабическая 221
» бруцеллезная 221
» гонококковая 221
» коклюшная 221
Вакцина скарлатинозная комбинированная 222
» стафилококковая 222
» стрептококковая поливалентная 222
» туберкулезная БЦЖ 222, 223
» туляремийная 223
Валерьяновая настойка 72
Валидол 73
Веронал 9
Викасол 146
Виноградный сахар 120
** Випразид 102
** Випракутан 101
** Вирапин 101
Висмут основной азотнокислый 187, 188
Витадерм 140
Витамин А 140
» В₁ 141
» В₂ 141, 142
» В₆ 142
» В₁₂ 143
» С 143, 144
» D 145
» D в масляном растворе 145
» D в спиртовом растворе 145
» E 146
» К 146
» Р 146
» РР 144
Витаминизированный рыбий жир 145

Витаминол 145
Вода горькоминдальная 99
» лавровишневая 99
» перечной мяты 97
» свинцовая 194
Восстановитель 93, 191, 193, 196
Галантамин 44
Галлат висмута основной 188
Гамма-глобулин 220
Ганглерон 53
Гастрин 154
Гваяколовый эфир угольной кислоты 204
Гексабензат 52
Гексаметон (хлорид) 52
Гексамидин 16
Гексахлоран 216
Гексенал 6
Гексилрезорцин 204
Гексоний 52
Гемостимулин 151
Гендон 15
Гепарин 148
Гептилрезорцин 214
Гидрокодон фосфорнокислый 20
Гидрат окиси алюминия 190
Гирудин 150
Гистамин 79
Гитален 62
Гитоксин 63
Глина белая 190
Глинозем 190
Глицерофосфат кальция 128
** Глобин-цинк-линулин 132
Глюкоза 120
Глюконат кальция 119
Глютаминовая кислота 116
Гоматропин бромистоводородный 47
Горицвет 65
Горчичник 99, 100
Горькая настойка 102
Горькая соль 111
Горькоминдальная вода 99
Грамицидин 166
Даукарин 78
Дегидрокортизон 138
ДДТ 216
Деготь березовый 205
Деготь можжевельниковый 206
Деготь сосновый 205

- ** Д. Г. Эрготоксин 60
- Дезоксикортикостерон-ацетат 138
- Дельсемин 55
- ** Деларкин 81
- Дерматол 188, 189
- Дехолин 112
- Диборал 133
- ** Диазолин 81
- Диакарб 175
- Дибазол 75
- Дивакцина (тиф и паратиф Б) 223
- Дигален-нео 62
- Дигидрострептомицин сульфат 168
- ** Дигидроэрготамин 59
- ** Дигидроэрготоксин 60
- Дигипурен 64
- Дигитазид 64
- Дигитоксин 63
- Дигицилен 63
- Дийодтирозин 130
- Дийохин 53
- Дикаин 89
- ** Дикаптол 199
- Дикумарин 148
- Диланизид 65
- Дилантин 16
- Димедрол 80
- Динатриевая соль аденозинтри-
фосфорной кислоты 74
- Динезин 14
- Дионин 21
- Диодон 127
- Диоцид 184
- Динаркон 24
- Диплацин 54
- Дипразин 81
- Дипрофен 75
- Дисульформин 174
- Дитилин 56
- Дитразин 216
- Диуретин 34
- Дифацил 76
- Дифенин 16
- Дифтерийный анатоксин 224
- Диэтилстильбэстрол 134
- Доверов порошок 18
- Доламид 23
- Допан 156
- Дориден 12
- Дубильная кислота 91
- Дуотал 204
- Дуплекс 153
- Душица—трава 106
- Желатина 148
- Железо восстановленное 150
 - » молочнокислое закисное 151
- Железо сернистое закисное 151
 - » треххлористое 190
- Желудочный сок 138, 139
- Женьшень 41
- Животный уголь 95
- Жидкий экстракт боярышника 76
 - » » колы 33
 - » » крапивы 146
 - » » крушины 109
 - » » травы тысяче-
листника 147
- Жидкость Бурова 190
- Зверобой — трава 93
- Золототысячник — трава 103
- Изадрин 58
- Изафенин 111
- Известь белильная 200
 - » хлорная 200
- Изоверин 85
- ** Изоланид 63
- Изопромедол 23
- Изотебецид 170
- Изотонический раствор хлористого
натрия 122
- Инсулин 132
- ** Интранаркон 7
- Йод 123
- Йодистый натрий 125
- Йодистый калий 125
- Йодная настойка 123
- Йодогност 127
- Йодолипол 127
- Йодоформ 126
- Йодоформная эмульсия 126
- Инвенол 134
- Ипекакуана 104
- ** Иргапирин 27
- Ихтиол 206
- Кадамизин 129
- Калий бромистый 32
 - » йодистый 125
 - » марганцовокислый 202
 - » уксуснокислый 119
- Каломель 112, 185
- Кальцекс 209
- Кальциевая соль глютаминовой
кислоты 116

- Кальций глицерофосфат 128
 » глюконат 119
 » углекислый 120
 » хлористый 119
 Камполон 153
 Камфара 71
 » бромистая 32
 Камфарное масло 71, 72
 Камфарный спирт 72
 Капли Иноземцева 18
 » Зеленина 67
 » нашатырно-анисовые 106
 » эфирные 5
 Карбоген 40
 Карболовая кислота кристаллическая 203
 Карбонат кальция 120
 Карбохолин 43
 Кардиовален 69
 Кардиотраст 127
 **Кардитоксин 64
 Карлсбадская (карловарская) соль 111
 Каротин 140
 Каротон 140
 Касторовое масло 108
 Каферид 198
 Квасцы 189
 » жженые 189
 Квинэтал 11
 Келлин 77
 Кендозид 69
 Кислота адениловая МАР 75
 » аденозинтрифосфорная 74
 » аскорбиновая 143, 144
 » борная 116
 » виннокаменная 116
 » глютаминовая 116
 » дубильная 91
 » карболовая 203
 » молочная 116
 » никотиновая 144
 » парааминосалициловая (ПАСК) 169
 » салициловая 30
 » соляная разведенная 115
 ** Климактерин 136
 Клубни ятрышника (салеп) 94
 Коамид 154
 Кодеин 90
 » фосфорнокислый 20
 Кокаин хлористоводородный 89
 Колимицин 166
 Колларгол 193
 Колхамин 158
 Конвазид 68
 Конваллатоксин 68
 Кондельфин 55
 Кора гранатника 212
 Кора дуба 92
 Коразол 39
 Коргликон 68
 Кордиамин 39
 Кордигит 64
 Корельборин 70
 Корень ипекакуаны 104
 » сенеги 105
 » синюхи 106
 Корневище змеевика 92
 » и корень кровохлебки 93
 » лапчатника (дубровка) 92
 Корневище и корень девясила 108
 Кортанцил 138
 Кортизон 137
 Кортин 138
 Кофеин 32
 » бензоат натрия 33
 Крахмал 94
 Кризанол 171
 Ксероформ 188
 Кукуруза — рыльца 113
 Курацид 56
 Кутизон 197
 Лагохилус опьяняющий 85
 Ламинария сахаристая 125
 Лантозид 64
 Ларгактил 13
 Ларусан 169
 Левомецетин 165
 Лейкоген 198
 Летучая мазь 96
 Лецитин 128
 Лидаза 139
 Липокаин 133
 Липоцеребрин 128
 Листья сенны 109
 » толокнянки 204
 » шалфея 94
 Лобелин хлористоводородный 39
 Лук морской 70
 Люминал 10
 Ляпис 192
 Магnezия жженая 118
 Магнезиевая соль глютаминовой кислоты 117

- Магний сернокислый 7
 Мазь Вилькинсона 205
 » Вишневого 206
 » летучая 96
 » нафталиновая 207
 » окситетрациклиновая 164
 » ртутная белая 184
 » ртутная желтая 185
 » ртутная серая 183
 » свинцовая 194
 » серная простая 196
 » ундециновая 211
 » цинковая 191
 Масло беленное 49
 » вазелиновое очищенное 110
 » камфары 71
 Масло касторовое 108
 » перечной мяты 97
 » терпентинное очищенное 96
 Масляный раствор димэстрола 134
 » » » фолликулина
 135
 Маточные рожки 82
 Мать-и-мачеха — лист 107
 Мединал 9
 Медицинские пиявки 150
 Медный купорос 191
 Мед очищенный 121
 Медь лимоннокислая 190
 » сернокислая 191
 Мезатон 57
 Мезокаин 88
 Мелликтин 55
 Ментол 97
 Мерказолил 131
 Меркамин салициловокислый 198
 » хлористоводородный 198
 6-меркаптопурин 155
 Меркузал 185
 Мерпанит 50
 Метазид 169
 Метацин 5Г
 Метикортен 138
 Метиландростендиол 137
 Метиленовый синий 209
 Метилкофеин 33
 Метиловый эфир салициловой кислоты 29
 Метилтестостерон 137
 Метилтиоурацил 130
 Метилсульфазин 173
 Метнионин 196
 Метотириин 131
 Мизолин 16
 Миарсенол 180, 181
 Миелосан 157
 ** Микосептин 210
 ** Микрофоллин 135
 Микроцид 167
 Микстура Бехтерева 65
 Милеран 157
 Миоль 77
 ** Мозатил 199
 Мозольная жидкость 30
 Морская капуста 125
 Морфин хлористоводородный 19
 Мука горчичная 100
 Мыло зеленое 205
 Мыльный корень 107
 Мышьяк белый 152
 Мышьяковистая кислота 152
 Мышьяковистый ангидрид 152
 Мышьяковокислый натрий 153
 Мятная вода 97
 Мятные капли 97
 ** Надизан 134
 Нанофин 54
 Наперстянка 61
 Нарколан 7
 Настойка арални маньчжурской 42
 » арники 147
 » барбариса обыкновенного 113
 Настойка боярышника 77
 » валерьяны 72
 » горькая 102
 » заманихи 42
 » зверобоя 93
 » золототысячника 103
 » женьшеня 41
 » йодная 123
 » красавки 48
 » ландыша 67
 » лапчатки 92
 » лимонника китайского 41
 » мятная 97
 » обвойника 70
 » одуванчика 102
 » опия простая 47
 » полыни 102
 » рвотного ореха 38
 » стеркулии платанолистой 42
 » строфанта 66
 » чеснока 78
 » чилибухи 38
 » чистеца буквицетного 85

- Настойка шлемника байкальского 78
 » эвкалипта 98
 » эукоммии 78
 Настойка эфирно-валерьяновая 72
 Настой астрагала пушистоцветкового 79
 » корня валерьяны 73
 » » ипекакуаны 104
 » листьев наперстянки 62
 » » шалфея 94
 » сенны сложный 109
 » спорыньи 82
 » травы горичвета 65
 » » термопсиса 105
 » цветов ромашки 93
 Натриевая соль парааминосалициловой кислоты 169
 Натриевая соль этазола 174
 Натрий азотистокислый 74
 » бензойнокислый 104
 » бромистый 31
 » двууглекислый 117
 » йодистый 125
 » лимоннокислый 150
 » мышьяковокислый 153
 » нуклеиновокислый 155
 » салициловокислый 29
 » серноватистокислый 194, 195
 » сернокислый 111
 Нафталан 207
 Нашатырно-анисовые капли 106
 Нашатырный спирт 95
 Нашатырь 105
 Нембутал-натрий 8
 Неодикумарин 148, 149
 Неоцид 158
 Нериолин 70
 Никотиновая кислота 144
 Нитранол 74
 Нитрат серебра 192, 193
 Нитрит натрия 74
 Нитроглицерин 73
 ** Нитрофунгин 211
 Новарсенол 180
 Новокаин 87
 Новокаин-амид 88
 Новоциллин 161
 ** Новурит 185, 186
 Новэмбихин 156
 ** Ноксирон 12
 Норсульфазол 173
 Окись магния 118
 » ртути желтая 185
 » цинка 191
 Окситетрациклин 164
 Омаин 158
 Омелен 79
 Омнопон 18
 Опий 17
 Осарсол 181
 Осленный детрит 224
 Отвар алтейного корня 105
 » клубней салела 94
 » » сенеги 105
 » коры гранатника 212
 » » дубы 92
 Отвар листьев толокнянки 204
 » цветов бессмертника 113
 Падутин 77
 Панкреатин 138
 Пантокрин 41
 Пантолон 18
 Пантоцид 201
 Палаверин хлористоводородный 21
 Парааминосалициловая кислота (ПАСК) 169
 Паральдегид 11
 Парамин 55
 Паратиреоидин 131
 Паста Лассара 191, 192
 » салицилово-цинковая 191, 192
 Пахикарпин йодгидрат 53
 Пелентан 148, 149
 Пенциллин-кальцевая соль для инъекций 160
 Пенциллин-кальций 160
 Пенциллин кристаллический для инъекций 160
 Пенциллин-натриевая соль для инъекций 160
 Пентабисмол 187
 Пентавакцина 224
 Пентамин 52
 Пентахлорин 216
 Пентоксил 155
 Пепсин 138
 ** Пепульсан 51
 Первитин 40
 Пергидрол 201
 Перекись водорода 201
 Периплоцин 70
 Перманганат калия 202
 ** Перопаназа 139

Пертуссин 106
Пилокарпин хлористоводородный 45
Пилорин 154
Пилюли Бло 151
Пиперазин адипинат 216
 » гексагидрат 216
 » сульфат 215
Пипераскат 216
** Пирабутол 27
Пирамеин 26
Пирамидон 25
Пираминал 26
Пирафен 26
Пиретрум 217
Пиридоксин 142
Пиридрол 41
Пирогаллол 191
Питуитрин 129
Пиявки медицинские 150
Плазмоцид 176
Пластырь свинцовый простой 194
Платифиллин виннокислый 50
Плегوماзин (Р) 14
Плоды черемухи обыкновенной 94
Подорожник большой — листья 107
Поливакцина 224
Полынная настойка 102
Полынь — трава 102
Порошок бодяги 96
 » Боткина шипучий 112
 » Доверов 18
 » древесного угля 95
 » китайского лимонника 41
 » корня ревеня 108
 » листьев наперстянки 61
 » маточных рожков 82
 » морского лука 70
 » солодкового корня сложный 109
 » пиретрума 217
Прегнантол 83
Прегнин 136
Прегнорал 136
Пренитрона 74
Провитамин А 140
Прогестерон 136
Прозерин 44
Пролактин 130
Промедол 22
Промеран 186
Пропазин 14
Простая серная мазь 196
Протаргол 193

Противоядие при отравлении солями тяжелых металлов 198
Пурген 110
Разведенная чистая соляная кислота 115
Раствор ацетата алюминия 190
 » Люголя 124
 » мышьяковистокислого калия 153
 » перекиси водорода 201
 » » » концентрированный 201, 202
Раствор Рингера—Локка 121
 » физиологический хлористого натрия 122
Раствор формальдегида 40% 208
 » хлорида окисного железа 190
Растиная камфара 71
Растинон 133
Рвотный корень 104
** Редергам 60
Резерпин 15
Резорцин 203
** Реопирин 25, 27
** Репудин 217
Рибофлавин 141
Риванол 209
Ромашка — цветы 93
Ронидаза 139
Ртуть амидохлорная 184
 » белая осадочная 184
 » двуйодистая 183
 » двухлористая 184
 » однохлористая 112, 185
 » окись желтая 185
 » оксицианистая 182
 » салициловокислая 183
 » цианистая 182
Рутамин 147
Рутин 147
Рыбий жир 145
Сабур 110
Сайодин 125
Салицилат натрия 29
Салициловая кислота 30
Салол 205
Сальсолин хлористоводородный 77
Салюзид 170
Саназин 170
Санкафен 214
** Санорин-аналергин 211

Сантонин 213
Сарколизин 157
Свинец уксуснокислый 193
Свинцовая примочка 194
Свинцовый пластырь 194
Секуриин азотнокислый 38
Семена тыквы очищенные 213
Сера осажденная 195
» очищенная 112, 195
Серая ртутная мазь 183, 184
Серебро азотнокислое 192, 193
» коллоидальное 193
Сернокислая магнезия 111
» медь 103
» соль хинидина 179
Серпазил 15
Симпатол 57
Синантрин С-1 150
Синтомицин 164, 165
Синтомициновая эмульсия 165
** Синтофиллин 36
Синэстрол 136
Скипидар очищенный 96
Скополамин бромистоводородный 47
Сложный настой сенны 109
» порошок солодкового корня 109
Совканн 89
Сода двууглекислая 117
** Солутан 49
Солюсульфон 196, 197
Солюсурмин 196
Соль карловарская искусственная 111
Соляная кислота 115
Сосновые почки 107
Слизь из семян льна 94
Спазмолитин 76
Спирт винный (этиловый) 8
» горчичный 100
» камфарный 72
» муравьиный 100
Спленин 85
Спорынья 82
Стиптицин 83
Стрептомицин 167
Стрептоцид белый 172
Стрихнин азотнокислый 37
Строфантин 66
Сулема 184
Сульгин 175
Сульфазин 173
Сульфат бария 120

Сульфат магния 7, 111
» медь 103
» натрия 111
» цинка 104, 192
Сульфацил 173
Сульфит тирозина 171
Сульфодимезин 172, 173
Сульцимид 174
Сухой питунтрин 129
Сферофизин бензойнокислый 84
Сыворотка против газовой гангрены 219
» противоботулиническая 218
» противогриппозная 220
» противодизентерийная 218
» противодифтерийная 218
» противокоревая 220
» противоменингококковая 220
» противоскарлатинозная 219
» противостафилококковая антитоксическая 219
» противостолбнячная 219

Тальк 95
Танин 91
Танальбин 92
Тезан 156
Текодин 24
Теобромин 34
Теобромин-салцилат натрия 34
Теофедрин 58
Теофиллин 35
Теоцин 35
Терлингидрат 106
Террамицин 164
Тестостерон-пропионат 137
Тетамон 51
Тетран 164
Тетрациклин 163
Тетридин 12
Тетурам 199, 200
Тиамин-бромид 141
Тибон 169, 170
Тимол 204, 215
Тиомицид 169
Тиопентал 7
Тиосульфат натрия 194, 195
Тиреондин 130

- Тифен 75
 Токоферол 146
 Трава сушеницы болотной 79
 » термопсиса 105
 » черногорки 65
 Тривакцина (тиф и паратиф А и В) 223
 Трилистник 103
 Триметин 16
 Трийотраст 127
 Трипафлавин 209
 Трипротамин-цинк-инсулин 132
 Триумбрен 127
 Трифоль—листья 103
 Трихомонацид 197
 Тромбин 147
 Тропацин 49
 Тубазид 170
- Углекислота 40
 Уголь 95
 Ундециновая мазь 211
 Унитиол 199
 Уретан 156
 Уробесалол 208
 Уродан 31
 Урозин 31
 Уросульфамин 175
 Уротропин 208
 Урутин 147
- Фаулеров раствор мышьяка 152
 Фенадон 23
 Фенамин 40
 Фенатин 40
 Фенацетин 27
 Фенилин 149
 Феноксиметилпенициллин 162
 Фенол чистый 203
 Фенолфталеин 110
 Ферковен 154
 Физиологический раствор 122
 Физостигмин салициловокислый 44
 Филиксан 212
 Фитин 128
 Флавакридин хлористоводородный 209
 Фламин 113
 Флюорид натрия 122
 Фолиевая кислота 142
 Фолликулин 135
 Фонурит 175
 Формалин 208
 Формальдегид 208
- Фосфакол 45
 Фосфат коденна 20
 Фталазол 174
 Фтивазид 168, 169
 Фтористый натрий 122
 Фурацилин 210
- Хеноподиевое масло 215
 Хинидин 179, 180
 Хинин двуххлористоводородный 178, 179
 Хинин сернокислый 179
 » хлористоводородный 177, 178
 Хинозол 210
 Хиноцид 176
 Хлоразин 179
 Хлоракон 16
 Хлоралгидрат 11
 Хлорамин Б 201
 Хлоридин 177
 Хлорид кальция 119
 » натрия 122
 Хлористый аммоний 105
 Хлористый натрий 122
 Хлорная известь 200
 Хлороформ для наркоза 5, 6
 Хлороцид 165
 Хлорпромазин 14
 Хлорэтил 6
 Хлорэтон 12
 Холензим 114
 Холин-хлорид 143
 Хологон 112
 Холосас 114
- Цветы ромашки 93
 Цианид ртути 182
 » » основной 182
 Циклохин 179
 Цимарин 69
 Цинк окись 191
 » сернокислый 192
 Цитварная полынь 213
 Цититон 39
 Цитраль 141
 Цитрат меди 190
 » натрия 150
- Чабрец — трава 107
 Черника — плоды 93
 Четыреххлористый углерод 214
- Шипучий порошок Боткина 112

- Эвипан натрий 6
Эзерин салициловокислый 44
Эйхинин 179
Экмолин 162, 163
Экмоновоциллин 163
Экстракт алоэ 110
» бессмертника сухой 113
» боярышника 76
» водяного перца жидкий 84
» желтушника 69
» калины обыкновенной жидкий 84
» колы жидкий 33
» корневища змеевика 92
» корня синюхи 106
» коры гранатника 212
» крапивы жидкий 146
» красавки сухой 47
» кровохлебки жидкий 93
» крушины жидкий 109
» кукурузных рылец 113
» ландыша сухой 68
» магнолии крупноцветной жидкий 79
» мужского папоротника эфирный 211, 212
» опия сухой 17
» пастушьей сумки жидкий 84
» рвотного ореха 38
» ревеня сухой 108
» сабура сухой 110
» семян гулявника струйчатого жидкий 111
» спорыньи жидкий для инъекций 82
Экстракт сушеницы болотной 79
» тысячелистника жидкий 147
» чилибухи 38
Эксактгин 129
Экстенциллин 162
Элатин 55
Эметин хлористоводородный 105
Эмульсия синтомициновая 165
Эрготал 83
Эрготин 82
Эрготоксин 59
Эревит 146
Эризид 68
Эризимин 69
Эскодол 23
Эстрадиол дипропионат 135
Этазол 174
Этазол-натрий 174
Этаминал-натрий 8
Этизин 80
Этиловый алкоголь 8
Эукодал 24
Эусинтомицин 165
** Эуспиран 59
Эуфиллин 35
Эфедрин хлористоводородный 57
Эфир для наркоза 5
Эфирно-валерьяновая настойка 72
Эфирное масло эвкалипта 99
Эфир со опиртом 5
Эхинопсин 38
Юглон 171
Ятрен 210

ЛАТИНСКИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ¹

- Acetylcholinum chloratum 43
 Acidum adenilicum MAP 75
 — adenosintriphosphoricum (ATФ)
 74
 — arsenicosum anhydricum 152
 — ascorbinicum 143
 — boricum 116
 — carbolicum crystallisatum 203
 — carbonicum 40
 — folicum 142
 — glutaminicum 116
 — hydrochloricum 115
 — lacticum 116
 — nicotinicum 144
 — paraaminosalicylicum (PASK)
 169
 — salicylicum 30
 — tannicum 91
 — tartaricum 116
 **Aclimanum 83
 Acrichinum 175
 Acricidum 209
 **Acrofollinum 135
 Adalinum 13
 Adiurecrinum 129
 Adonisidum 66
 Adrenalinum hydrochloricum 56
 Aëronum 49
 Aethaminalum 8
 Aether pro narcosi 5
 Aethylum chloratum 6
 Aethyzinum 80
 Aethazolum 174
 Albichtholum 207
 Albomycinum 164
 Albucid-natrium 173
 Alcohol aethylicus 8
 Allocholum 113
 Aloë 110
 Aloocymenum 210
 Alphadrilum 81
 Alumen 189
 Alumen ustum 189
 Aluminium hydrooxydatum 190
 Aminarsonum 181
 Aminazinum 13
 Ammonium causticum solutum 95
 — chloratum 105
 — sulfoichthyolicum 206
 Amylium nitrosum 73
 Amylum 94
 Amytal-natrium 9
 Anadolum 23
 Anaesthesinum 90
 Analginum 26
 Anatoxinum diphthericum 224
 Angiotrophinum 75
 Antabus 199
 Antasthmanum 58
 Antianaeminum 154
 Antiasthmocrinum 129
 Antidotum metallorum 198
 **Antihistaminum 79
 Antipyrinum 24
 Antiverrucinum 158
 **Apisathronum 101
 Apomorphinum hydrochloricum 103
 Apressinum 60
 Aprophenum 75
 Aqua Amygdalarum amararum 99
 — Laurocerasi 99
 — Menthae piperitae 97
 — Plumbi 194
 Argentum colloidalе 193
 — nitricum 192
 — proteinicum 193

¹ Импортные препараты обозначены звездочками **, а импортные препараты, аналогичные отечественным, но с другим названием — обозначений не имеют.

Argilla alba 190
Arminum 45
Aspirinum 28
Atebrinum 175
Atophanum 30
Atropinum sulfuricum 46
Aureomycinum 163
Aurum 171
Avicularenium 85

Bacca Pruni racemosae 94
Barbamylum 9
Barium sulfuricum 120
**Belloidum 49
Benzacinum 50
Benzamonum 45
Benzohexonium 52
Betasinum 131
Bicillinum 162
Bigumalum 176
Bijochinolum 186
Bilignostum 127
Bilitrastum 126
Biomycinum hydrochloricum 163
Bismoverolum 186
Bismuthum
— subgallicum 188
— subnitricum 187
— tribromphenilicum basicum 188
Bithiuroolum 187
Bolus alba 190
Brilliantgrün 209
Bromuralum 13
Butadionum 27
Butamidum 133

Caferidum 198
Calcaria chlorata 200
Calcex 209
Calcium carbonicum 120
— chloratum 119
— gluconicum 119
— glutaminicum 116
— glycerophosphoricum 128
— hypochlorosum 200
Calomel 112, 185
Camphora monobromata 32
— trita 71
Campolonum 153
Carbocholum 43
Carbogenum 40
Carboneum tetrachloratum 214
Carbo animalis 95
— Liqni pulveratus 95

Carbolenium 95
Cardiotrastum 127
Cardiovalenum 69
**Carditoxinum 64
Carotinum 140
Carotonum 140
Charta sinapisata 99, 100
Chinidinum sulfuricum 179
Chininum bihydrochloricum 178
— hydrochloricum 177
— sulfuricum 179
Chinocidum 176
Chinosolum 210
Chlorocidum 165
Chloraconum 16
Chloralum hydratum 11
Chloraminum B 201
Chlorazinum 179
Chloretonum 12
Chloridinum 177
Chlorocidum 165
Chloroformium pro narcosi 5
Chlorpromasinum 14
Cholenzimum 114
Cholinum chloratum 143
Chologonum 112
Cholosas 114
Ciclochinum 179
Citralum 141
Coamidum 154
Coainum hydrochloricum 89
Codeinum 20
— phosphoricum 20
Coffeinum 32
— natrio-benzoicum 33
Colchaminum 158
Colimycinum 166
Collargolum 193
Collodium 30
Condolphinum 55
Convallatoxinum 68
Convasidum 68
Corazolum 39
Cordiaminum 39
Cordigitum 64
Corglyconum 68
Cortancylum 138
Cortex Granatum 212
— Quercus 92
Cortinum 138
Cortisonum 137
Corelborinum 70
Crysanolum 171
Cuprum citricum 190

- Cuprum sulfuricum, 103,
 191
 Curacitum 56
 Cutisonum 197
 Cymarinum 69
 Cytitonum 39

 Daucarinum 78
 **Deparkinum 81
 DDT 216
 Dehydrocortisonum 138
 Delseminum 55
 Dermatolum 188
 Desoxycorticosteronum aceticum 138
 Decoctum cortex Quercus 92
 — rad. Althaeae 105
 — Salep 94
 — rad. Senegae 105
 — fol. Uvae ursi. 204
 Decholinum 112
 **D. G. Ergotoxinum 60
 **Diaboralum 133
 Diacarbium 175
 Diaethylstiboestrolum 134
 Diazolinum 81
 Dibazolium 75
 Dicainum 89
 **Dicaptolum 199
 Dicumarinum 148
 Digalen-neo 62
 Digicilenum 63
 Digipurenum 64
 **Dihydroergotoxinum 60
 Dihydrostreptomycinum sulfuricum
 168
 Digitasidum 64
 Digitoxinum 63
 **Dihydroergotaminum 59
 Dijodthyrosinum 130
 Dijochinum 53
 Dilanizidum 65
 Dilantinum 16
 Dimedrolum 80
 Dinarconum 24
 Dinezinum 14
 Diocidum 184
 Diodonum 127
 Dioninum 21
 Diphacilum 76
 Dipheninum 16
 Diplacinum 54
 Diprazinum 81
 Diprophenum 75
 Disulfurinum 174

 Ditolinum 56
 Ditrazinum 216
 Diuretinum 34
 Dolamidum 23
 Dopanium 156
 Doridenum 12
 Duotalum 204
 Duplex 153

 Echinopsinum 38
 Ecmolinum 162
 Ecmovocillinum I 163
 — II 163
 Elatinum 55
 Exacthinum 129
 Extencillinum 162
 Emetinum hydrochloricum 105
 Emplastrum Plumbi 194
 Emulsio Jodo-jodoformiata 126
 — olei Ricini 108
 — Synthomycinum 165
 Ephedrinum hydrochloricum 57
 Ephynalum 146
 Ergotalum 83
 Ergotinum 82
 Ergotoxinum 59
 Erevitum 146
 Erysidum 68
 Erysiminum 69
 Escodolum 23
 Eserinum salicylicum 44
 Euchininum 179
 Eukodalum 24
 Euphyllinum 35
 **Euspiranum 59
 Eusynthomycinum 165
 Evipan-natrium 6
 Extractum Aloës 110
 — Belladonnae 47
 — Bistortae 92
 — Bursae pastoris 84
 — Colae fluidum 33
 — Convallariae mayalis siccum 68
 — Crataegi fluidum 76
 — Descurinae Sophiae fluidum
 111
 — Filicis maris aethereum 211
 — fluidi sanguisorbae 93
 — Frangulae fluidum 109
 — Glycyrrhizae (Liquiritiae)
 — Gnaphalii uliginosi 79
 — Granati fluidum 212
 — Helichrysi arenarii 113
 — herba Millefolii fluidi 147

- Extractum Magnoliae grandiflorae fluidum 79
 — Nucis vomicae siccum 38
 — Opii siccum 17
 — Polygoni hydropiperis fluidum 84
 — Rhei siccum 108
 — Secalis cornuti fluidum pro injectionibus 82
 — Secalis cornutum fluidum 82
 — Stigmatis majdis fluidum 113
 — Strychni siccum 38
 — Urticae fluidum 146
 — Viburni opuli fluidum 84

 Farina sinapis 100
 Ferrocovenum 154
 Ferrum lacticum 151
 — reductum 150
 — sesquichloratum solutum 190
 — sulfuricum oxydulatum 151
 — trichloratum solutum 190
 Filixanum 212
 Flaminum 113
 Flavacridinum hydrochloricum 209
 Folia Menyanthis 103
 — Plantaginis majoris 107
 — Trifolii fibrini 103
 — Uvae ursi 204
 — Farfarae 107
 Folium Salviae 94
 — Sennae 109
 Flores Chamomillae 93
 Flos Cinae 213
 — Helichrysi arenarii 113
 Folliculinum 135
 Fonuritum 175
 Formaldehydum solutum 208
 Formalinum 208
 Furacilinum 210
 Fructus Anisi vulgaris 106
 Fructus Myrtilli 93

 Galanthaminum 44
 Gamma-globulinum 220
 Gangleronum 53
 Gastrinum 154
 Gastrocrinum 154
 Gelatina alba 148
 Gemmae Pini 107
 Gendonum 15
 Gitalenum 62
 Gitoxinum 63
 **Globin-zinc-insulinum 132

 Glucosum 120
 Glycerinum
 Gramicidinum 166
 Guajacolum carbonicum 204
 Gummi-arabicum 94
 Guttae Inosemzovi 18

 Haemostimulinum 151
 Hepalonum 153
 Heparinum 148
 Heptylresorcinum 214
 Herba Absinthii 102
 — Adonidis vernalis 65
 — Centaurii 103
 — Gnaphalii uliginosi 79
 — Hyperici 93
 Herba Ledi palustris 108
 — Origani 106
 — Serpylli 107
 — Thermopidis 105
 Hexabenzatum 52
 Hexachloranum 216
 Hexamethonium 52
 Hexamethylentetraminum 28
 Hexamidinum 16
 Hexenalum 6
 Hexonium 52
 Hexylresorcinum 204
 Hirudo medicinalis 150
 Hirudinum 150
 Histaminum 79
 Homatropinum hydrobromicum 47
 Hormonum adreno-corticotropinum 128
 Hydrargyrum amidato-chloratum 184
 — bichloratum 184
 — bijodatum 183
 Hydrargyrum chloratum mite 112, 185
 — cyanatum 182
 — oxycyanatum 182
 — oxydatum flavum 185
 — praecipitatum album 184
 — salicylicum 183
 Hydrocodonum phosphoricum 20
 Hydrogenii peroxydati diluta 201

 Ichthyolum 206
 Infusum Adonidis vernalis
 — Astragali pubiflori 79
 — flores Chamomillae 93
 — fol. Salviae 94
 — herbae Thermopidis 105
 — rad. Ipecacuanhae 104

- Infusum rad. Valerianae 73
 — Secalis cornutum 82
 — Sennae compositum 109
 Insulinum 132
 **Intranarconum 7
 Invenolum 134
 **Irgapyrinum 27
 Isadrinum 58
 Isapheninum 111
 **Isolanidum 63
 Isopromedolum 23
 Isotebezidum 170
 Isoverinum 85
 Jodoformium 126
 Jodognostum 127
 Jodolipolum 127
 Jodum 123
 Juglonum 171

 Kadamysinum 129
 Kalium aceticum 119
 — bromatum 32
 — chloratum 121
 — hypermanganicum 202
 — jodatum 125
 — permanganicum 202
 Kendosidum 69
 Khellinum 77
 **Klimakterinum 136

 Laevomycetinum 165
 Lagochilus inebrians 85
 Laminaria Saccharina 125
 Lantosidum 64
 Largactilum 13
 Larusanum 169
 Lecithinum 128
 Leucogenum 198
 Linimentum volatile 96
 Lipocainum 133
 Lipocerebrinum 128
 Liquor oluminii acetici 190
 — ammonii anisatus 106
 — ammonii caustici 95
 Liquor arsenicalis Fowleri 152
 — Burovi 190
 — Kalii acetici 119
 — — arsenicosi 152
 — Lugoli 124
 — ferri sesquichloratum 190
 Lobelinum hydrochloricum 39
 Luminalum 10
 Lutocyclinum 136
 Lydasa 139

 Magnesia usta 118
 — sulfuricum 7, 111
 — oxydatum 118
 Magnium glutaminicum 117
 Medinalum 9
 Mel depuratum 121
 Mellictinum 55
 Mentholum 97
 Mercaminum hydrochloricum 198
 — calicylicum 198
 6-Mercaptopurinum 155
 Mercazolilum 131
 Mercusalum 185
 Merpanitum 50
 Mesatonum 57
 Mesocainum 88
 Melacinum 51
 Melazidum 169
 Methioninum 196
 Meticortenum 138
 Methylandrostendiolum 137
 Methylcoffeinum 33
 Methylenum coeruleum 209
 Methylum salicylicum 29
 Methyltestosteronum 137
 Methylthiouracilum 130
 Methylsulfazinum 173
 Metothyrium 131
 **Micoseptinum 210
 Microcidum 167
 **Microfollinum 135
 Morphinum hydrochloricum 19
 **Mosatilum 199
 Mucilago Amyli 94
 — Gummi-arabici 94
 — semen Lini 94
 — tuber Salep 94
 Myarsenolum 180
 Myelosanum 157
 Mysolinum 16
 Myleranum 157
 Myolum 77

 **Nadisanum 134
 Nanophinum 54
 Naphthalanum 207
 Narcolanum 7
 Natrium aethazolum 174
 — adenosintriphosphoricum 74
 Natrium arsenicicum 153
 — bicarbonicum 117
 — benzoicum 104
 — bromatum 31
 — carbonicum

- Natrium chloratum 122
 — citricum 150
 — — pro injectione 150
 — fluoratum 122
 — hyposulfurosum 194
 — jodatum 125
 — nitrosum 74
 — nucleinicum 155
 — salicylicum 29
 — sulfuricum 111
 — thiosulfuricum 194
 Nembutal-natrium 8
 Neocidum 158
 Neodicumarinum 148
 Neriolinum 70
 Nitranolum 74
 Nitroglycerinum solutum 73
 **Nitrofunginum 211
 Norsuliazolum 173
 Novarsenolum 180
 Novembichinum 156
 Novocainum 87
 Novocain-amidum 88
 Novocillinum 161
 **Novuritum 185
 **Noxyronum 12
- Oestradiolum dipropionicum 135
 Oleum Amygdalarum dulcium 202
 — Anisi 99
 — Cadini 206
 — camphoratum ad usum exter-
 num 72
 — Chenopodii 215
 — Eucalypti 99
 — Hyoscyami 49
 — Jecoris Aselli 145
 — — — vitaminisati 145
 — Menthae piperitae 97
 — Ricini 108
 — Rusci 205
 — Terebinthinae 96
 — Vaselini purissimi pro uso in-
 terno 110
 Omainum 158
 Omelenium 79
 Omnoponum 18
 Opium pulveratum 17
 — purum 17
 Osarsolum 181
 Oxytetracyclinum 164
- Padutinum 77
 Pachycarpinum hydrojodicum 53
- Pancreatinum 138
 Pantocidum 201
 Pantocrinum 41
 Pantoponum 18
 Papaverinum hydrochloricum 21
 Paraldehydum 11
 Paramionum 55
 Parathyreoidinum 131
 PASK 169
 Pasta zinci Lassari 191
 — — salicylata 191
 Pelentanum 148
 Penicillinum-calcium 160
 — crystallisatum pro injectionibus
 160
 — — kalium pro injectionibus 160
 — — natrium pro injectionibus
 160
 Pentabismolum 187
 Pentachlorinum 216
 Pentaminum 52
 Pentavaccinum 224
 Pentoxylum 155
 Pepsinum 138
 **Pepulsanum 51
 Perhydrolum 201
 Periplocinum 70
 **Peropanasa 139
 Pertussinum 106
 Pervitinum 40
 Phenacetinum 27
 Phenadonum 23
 Phenaminum 40
 Phenatinum 40
 Phenolphthaleinum 110
 Phenolum purum 203
 Phenoxyethylpenicillinum 162
 Phenylinum 149
 Phosphacolum 45
 Phthalazolum 174
 Phthivazidum 168
 Physostigminum salicylicum 44
 Phytinum 128
 Pilocarpinum hydrochloricum 45
 Pilulae Blaudi 151
 Piperazinum adipinicum 216
 Piperazinum hexahydratum 216
 — sulfuricum 215
 Piperascatum 216
 Piridrolum 41
 Pituitrinum 129
 — siccum 129
 Pix liquida Pini 205

- Plasmocidub 176
 Platyphyllum bitartaricum 50
 Plegomacinum (P) 14
 Plumbum aceticum 193
 Polygala Senega 105
 Polyvaccinum 224
 Praegninum 136
 Praenitrona 74
 Pregnantolum 83
 Pregnoralum 136
 Progesteronum 136
 Prolactinum 130
 Promedolum 22
 Promeranium 186
 Propasinum 14
 Proserinum 44
 Protargolum 193
 Pulvis aërophorus Botkini 112
 — bulbus Scillae 70
 Digitalis 61
 — Doveri 18
 — Liquiritiae compositus 109
 — Pyrethrum 217
 — rad. Rhei 108
 — Schizandrae chinensis 41
 — Secalis cornutum 82
 — Spongilla 96
 Purgenum 110
 Pylorinum 154
 **Pyrabutolum 27
 Pyramidonum 25
 Pyridoxinum 142
 Pyrogallolum 191

 Quietalum 11

 Radix Althaeae 105
 — Ipecacuanhae 104
 — Polemonii 106
 — Rhei 108
 — Saponariae 107
 — Senegae 105
 Rastinonum 133
 **Redergam 60
 **Repudinum 217
 Reserpinum 15
 Resorcinum 203
 Rheopyrinum 25
 Rhizoma Ristortae 92
 — et radix Inulae helenii 108
 — — — Sanguisorbae 93
 — Tormentillae 92
 Riboflavinum 141
 Rivanololum 209

 Ronidasa 139
 Rutaminum 147
 Rutinum 147

 Sajodinum 125
 Sal carolinum factitium 111
 Salolum 205
 Salsolinum hydrochloricum 77
 Saluzidum 170
 Sanazinum 170
 Sancaphenum 214
 **Sanorin-Analerginum 211
 Santoninum 213
 Sapo kalinus 205
 Sarcolycinum 157
 Scopolaminum hydrobromicum 47
 Secale cornutum 82
 Securininum nitricum 38
 Semen Lini 94
 Semina Cucurbitae decorticata 213
 Serpasilum 15
 Serum antitbotulinicum 218
 — antidiphthericum 218
 — antidyentericum 218
 — antigangraenosum 219
 — antimeningococcicum 220
 — antimorbillorum 220
 — antiscarlatinosum antitoxicum
 219
 — antistaphylococcicum antitoxi-
 cum 219
 — antitetanicum 219
 Sinantrinum C-1 150
 Solutio camphorae oleosae 71
 — Domoestrolum oleosa 134
 — Folliculinum oleosae 135.
 — Hydrogenii peroxydati concen-
 trata 201
 — Lugoli 124
 — Natrii chlorati isotonica 122
 — Ringer-Locke 121
 — vitamini D oleosae 145
 Solutio vitamini D spirituosae 145
 Solusulfonum 196
 Solusurminum 196
 **Solutanum 49
 Sovcainum 89
 Spasmolytinum 76
 Sphaerophysinum benzoicum 84
 Spiritus aethereus 5
 — camphoratus 72
 — Sinapis 100
 Spiritus Formicicus 100
 — vini 8

- Spleninum 85
 Stigmata Maydis 113
 Stilo Argenti nitrici 192
 — cupri sulfurici 191
 Streptocidum album 172
 Streptomycinum hydrochloricum
 167
 — sulfuricum 167
 Strophanthinum 66
 Strychninum nitricum 37
 Stypticinum 83
 Succus gastricus 138
 Sulcymidum 174
 Sulfacylum solubile 173
 Sulfazinum 173
 Sulfatum thyrosinum 171
 Sulfodimezinum 172
 Sulfur depuratum 112, 195
 — praecipitatum 195
 Sulginum 175
 Sympatolum 57
 Synoestrolum 136
 Synthomycinum 164
 **Syntophyllum 36
- Talcum 95
 Tanninum 91
 Tannalbinum 92
 Tetamonum 51
 Terpinum hydratum 106
 Terramycinum 164
 Testosteronum propionicum 137
 Tetranum 164
 Tetracyclinum 163
 Tetrudinum 12
 Teturamum 199
 Theobrominum 34
 — natrio-salicylicum 34
 Thecodinum 24
 Theocinum 35
 Theophedrinum 58
 Theophyllum 35
 Thesenum 156
 Thiaminum bromatum 141
 Thiomicidum 169
 Thiopentalum 7
 Thrombinum 147
 Thymolum 204, 215
 Thyreoidinum 130
 Tibonum 169
 Tinctura Absinthii 102
 — Allii sativi 78
 — amara 102
 — Aralii mandchurici 42
- Tinctura Arnicae 147
 — Belladonnae 48
 — Berberis vulgaris 113
 — Convallariae majalis 67
 — Echinopanacis 42
 — Eucalypti 98
 — Eucommiae 78
 — Ginsengi 41
 — Jodi 123
 — Menthae piperitae 97
 — Nucis vomicae 38
 — Opii simplex 17
 — Periplocae 70
 — Schizandrae chinensis 41
 — Scutellariae 78
 — Stachys betonicaeflora 85
 — Sterculia platanifoliae 42
 — Strophanthi 66
 — Strychni 38
 — Taraxaci 102
 Tinctura Valerianae 72
 T-rae Valerianae aetherea 72
 Tiphenum 75
 Trichomonacidum 197
 Trijotrastum 127
 Trimetinum 16
 Triprotamin-zinc-insulinum 132
 Triumbrenum 127
 Tropacinum 49
 Trypaflavinum hydrochloricum 209
 Tubazidum 170
 Tuber Salep 94
- Unguentum Hydrargyri cinereum
 183
 — — oxydati flavi 185
 — — praecipitati albi 184
 — Naphthalani 207
 — oxytetracyclini 164
 — Plumbi subacetici 194
 — Sulfuratum simplex 196
 — Undecinum 211
 — Wilkinsoni 205
 — Zinci 191
 Unithiolum 199
 Urethanum 156
 Urobetalolum 208
 Urodanum 31
 Urosinum 31
 Urosulfanum 175
 Urotropinum 208
 Urutinum 147
 Vaccinum brucellosum 221
 — gonococcicum 221

Vaccinum pertussis 221
— rabiei 221
— scarlatinum compositum 222
— staphylococcicum 222
— streptococcicum 222
— tuberculosis BCG 222, 223
— tularemiae 223
— typho-parathyphosum A et B 223
— typho-parathyphosum B 223
— variole 224
Validolum 73
Veronalum 9
Vicasolum 146
**Vipracutanum 101
**Viprasidum 102
**Virapinum 101
Viride nitens 209
Vitaderm 140
Vitaminolum 145

Vitaminum A 140
— B₁ 141
— B₂ 141
— B₆ 142
— B₁₂ 143
— C 143
Vitaminum D 145
— E 146
— K 146
— P 146
— PP 144

Xeroformium 188

Yalrenum 210

Zincum oxydatum 191
— sulfuricum 104, 192

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
I. Прописи лекарственных средств, влияющих преимущественно на центральную нервную систему	5
1. Ингаляционные и неингаляционные наркотические средства	5
2. Этиловый алкоголь	8
3. Снотворные, нейроплегические и противосудорожные средства	8
4. Обезболивающие, анальгетические средства, группы опия, морфин и его заменители	17
5. Анальгетические, жаропонижающие. Салицилаты. Атофан. Уродан	24
6. Бромиды	31
7. Группа кофенина	32
8. Стрихнин, секуринин, коразол, кордиамин. Цититон, лобелин, карбоген	37
9. Фенамин, первитин, фенатин, китайский лимонник, женьшень, пантокрин	40
II. Прописи лекарственных средств, действующих преимущественно в области окончаний эфферентных нервов	43
1. Лекарственные вещества, действующие преимущественно на м- и н-холинореактивные структуры	43
2. Лекарственные вещества, действующие преимущественно на м-холинореактивные структуры	45
а) м-холиномиметические средства	45
б) м-холинолитические средства	46
3. Лекарственные вещества, действующие преимущественно на Н-холинореактивные структуры	51
а) Ганглиоблокирующие, или ганглионарные средства	51
б) Курареподобные средства, миорелаксанты	54
4. Лекарственные вещества, действующие преимущественно на адренореактивные структуры	56
а) Адреналин и адреномиметические средства	56
б) Адренолитические средства	59
III. Прописи лекарственных веществ, действующих преимущественно на сердечно-сосудистую систему. Маточные, кровоостанавливающие средства	61
1. Сердечные гликозиды. Наперстянка	61
2. Камфара. Валерьяна. Валидол	71
3. Сосудорасширяющие средства	73
4. Гистамин и противогистаминные средства	79
5. Маточные, кровоостанавливающие средства	82
IV. Прописи лекарственных средств, действующих преимущественно в области окончаний чувствительных нервов	87
1. Местноанестезирующие средства	87
2. Вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие и раздражающие средства. Горечи	91

3. Рвотные, отхаркивающие
4. Слабительные, желчегонные

V. Прописи лекарственных средств с преимущественным влиянием на процессы обмена веществ, кроветворения

1. Кислоты и щелочи
2. Соли щелочных и щелочноземельных металлов. Глюкоза
3. Фтор, хлор, йод, рентгеноконтрастные средства. Фосфор
4. Гормоны, ферментные препараты
 - а) Препараты гипофиза, щитовидной железы, препараты, тормозящие функцию щитовидной железы, и препараты паращитовидных желез
 - б) Препараты поджелудочной железы и их синтетические заменители
 - в) Препараты женских и мужских половых гормонов и их синтетические заменители
 - г) Препараты коры надпочечников
 - д) Ферментные препараты
5. Витаминные препараты. Средства, ускоряющие (коагулянты) и замедляющие (антикоагулянты) свертывание крови
6. Средства, влияющие на кроветворение

VI. Прописи лекарственных средств с преимущественно химиотерапевтическим, антисептическим и противопаразитарным действием

1. Антибиотики и противотуберкулезные средства
2. Сульфаниламиды
3. Противомаларийные средства
4. Противосифилитические препараты мышьяка
5. Препараты ртути и висмута с противосифилитическим и антисептическим действием
6. Соли тяжелых металлов с антисептическим характером действия
7. Препараты серы, сурьмы, средства, применяемые при лучевой болезни, и противоядия при отравлениях
8. Хлор и кислородотдающие средства
9. Препараты группы фенола, формальдегида, красители. Фурацилин
10. Противоглистные и инсектицидные средства

VII. Прописи сывороток и вакцин

VIII. Высшие разовые дозы ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств для детей

IX. Содержания витаминов в некоторых пищевых продуктах

Правила выписывания рецептов на лекарства для амбулаторных больных

Указатель литературы

Краткий терапевтический указатель

Предметный указатель

Латинский предметный указатель